




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.467



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.467



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.467



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.467

1.6.467

**CHRONICA HER-
BARVM, FLORVM, SEMINVM, FRV-
CTVVM, RADICVM, SVCCORVM, ANIMALIVM,
atq; eorundem partium, quo nimirum tempore singu-
la eorum colligenda, atq; in vsum adferenda sint**


**Medicum, res ut scitu pharmacopœis
dignissima, ita reipublicæ ma-
ximè necessaria :**

**Authore,
NICOLAO VVINCKLERO FOR-
chemio, Medico, & Halæ Saxuorum
physico ordinario.**

**Cum gratia & priuilegio Imperiali,
ad decennium.**

**AVGVSTÆVINDELICO-
rum, in officina Typographica
Michaëlis Mangeri.**

Anno M. D. LXXI.



IN LIBELLVM D. NICOLAI

V Vinckleri Medici. Epigramma D.
Ioan: Postij, German: Medici,

R Adices, herbas, flores, cum semine fructus
Et Medicus vsus, quæ requirit amplius
Temporibus certis debent, qui pharmaca miscent
Legere: vigorem cum suum diuinitus
Accepere suum: quod quo sub sidere fiat,
V Vincklerus hoc paruo docet volumine:
Assidue ante oculos quod pharmacopœus habebit,
Consulat ut agris melius, & famæ suæ.

REVERENDO

GENERE ET VIRTUTE NOBI-

LI, ET MAGNIFICO VIRO DOMINO ERAS-

mo Newltetero, dicto Sturmer à Schonfeldt, Bambergensis

ac VVirtzburgensis Ecclesiarum Canonico. D.D. Io-

annis Baptista in Haugis, & Gangolff ibidem

præposito, & Decano Collegij Com-

burgensis, Dignissimo Domino

suo obſervando.

S. D.



Onſcripſimus ex varijs historijs herba-
rum, fruticum & arborum inſignium
Chronicon libellum, hoc eſt, foliorum,
florum, ſeminum, fructuum, radicum,
atq; ſuccorum, quo tempore ad uſum medicum ma-
ximè illa colligi, non quod popularis auræ ſtudio
ſuſceperimus, aut aliam quaſi normam conſtituere,
eamq; accuratius enucleare velimus, & veluti Lernæ
capita, in dies magis, atque magis inualeſcentes erro-
res, ſæuientia adulteria, diſſoluere, edocere, emunctius,
atque exactius abſoluere, quum præſertim id eruditif-
ſimus Hermolaus, acutiſſimus Leoniceus, doctiſſi-
mus Marcellus, præſtantiſſimus Ruellius, verſatiſſi-
mus Manardus, aliq; de re medica bene meriti, ſin-
gulari eruditione viri clariſſimi, Braſſauolus, Fuchſius,
Syluius, Matthiolus, & Franciſcus Alexander Ver-
cellenſis, temporis diuturnitate, longaq; experientia,
grauitate, ſapientia, prouidentia & iudicio hac de re

A 2

verbo-

verbosissimè differuerint, turpeq; esset & temerarium
si ingeniosum in alienis libris præstaremus, aliorumq;
labores vendicarem, & veluti post defectam mes-
sem spicilegium facere, aut post restinctam sitim noua
adferre pocula, sed potius ut pharmacopœis gratifica-
remur, alijsq; bonis amicis ad obliuionem senij (ut
Plato inquit) commentarios offerremus, qui in me-
moriâ reuocarent, quo ordine & successione annua,
singula ex viridario essent reponenda, idq; non nisi
maxima necessitate urgente, propter oscitantiam &
negligentiam pharmacopœorum quorundam, qui si-
ne doctrina, sine delectu, sine censura, absq; denique
omni metu & pudore medicorum capiunt, & pro salu-
te inexpectatam mortem interdum offerunt, pleraque
aut omnia ad fraudem & auaritiâ contaminant, cor-
rumpant & peruertant, diuitias honori ante ponunt,
liberum alijs negotijs delegant, atq; relinquunt: quum
à fraudulentis sibi non caueant, exotica ignorent, sac-
culos nominatenus sectentur & conquirant, vitiosis-
que potius consuetudinibus, quàm veritati acquie-
scant: ideoq; non modò segnitiam, sed etiam oppro-
brium illorum accusamus. Quanta enim quæso errata
& incommoda, cæteraq; omnia in medicamentorum
mixture afferunt, si in colligendis simplicibus ipsi ab-
errent: an non spe sua frustrabitur medicus doctus,
qui medicamentis morbum expellere instituit, cum
medicamenta sunt imperfecta aut immatura, aut nimis
vetusta siue exoleta, senioq; squalida: an non vnus
simplici-

simplicis improbitas totam sapenumero compositionem vitiat, vires minuit, abolet, ac nouas acquirit: quæ omnia fieri experimur, cum nec loci situm, cœli statum, qualitatem regionis, bonam educationem, in primis quo tempore matura sint, respicimus: Quæ incommoda animaduertens Galenus lib. 1. antitid: in compositione Theriaces, vbi quærit Chamepityn, Chamedryn, Thlaspi, centaurium, polium montanum Hypericum, aliaq; florida non sole æstiuo siccata, neq; dum fructus eorum adhuc crudi & imperfecti sunt: idem continua speculatione lib. 1. & 3. comp. phar. part. & generalium obseruat, quando eduntur, quando augentur, quando deniq; vigent, quo tempore potissimum eos commodè decerpas & in siccis domunculis repositas custodias, ne à solis radijs vrantur, neq; humiditate à tecto vel muris madefiant. & hoc quidem non temerè. Etenim si sanitatem, qua nihil optatius homini esse potest, tueri debemus, varia innumeraq; genera morborum expellere, ferarum virus euincere, venenorum læthaliū vim demoliri & ad vitam reuocare constituimus, nihil certè erit vtilius, nihil memoratu dignius, nihilq; laudabilius, quàm in defesso studio, huiusmodi negotia excolere, iisdem insudare, quibus aut hominum vafrimonia, aut artis & scientiæ inopia indies periclitamur, magna enim laus & grata hominibus, vnum hominem laborare in ea scientia, quæ sit multis profutura, quæ inquam suum opus illorum

A 3 pericu-

periculis sublevandis imparciantur, gloriam enim
concitat magnitudo negotij gratiam & splendorem,
animi ingenuitas & candor. Qua de causa cum hæc
pars Medicinæ *φαρμακευτική*, utpote saluberrima & præ-
stantissima, nunc à præstigiatoribus publicis & ne-
pharijs corruptoribus obscuretur & dehonestetur, po-
lita loquacitate, inexpiabili scelere, intolerabiliq; di-
scrimine, hortor & admoneo pharmacopœos, qui
Christianam religionem colunt, ut pro salute commu-
ni, pro artis medicæ dignitate, pro omnium statu, &
pro operibus commodi publici, probè sanctèq; pro
viribus suis simplicia medicamenta quærant, videant,
audiant, locisq; proprijs indagent, quum vnaquæq;
stirps natali solo exultet, vigeat, fertilis, efficaxq; pro-
betur, secus verò imbecillis, languida ac sterilis redda-
tur, quum telluris qualitate, cœli constitutione, nutri-
mento, cultura meliora deteriorave non minus eua-
dant, aliosq; cultores moneant instentq;, ne radices,
fructus, semina, flores, herbas, germina & succos ex-
tra annum & menses carpant, imò quod reliquum est
labores sibi commendatos habeant. Edidimus autem
hoc Chronicôn, addita tui nominis mentione Reue-
rende atq; magnifice vir, quia scimus te sapienter &
grauiter de studijs doctrinarum omnium iudicare, ne-
que verò id solum, sed & honesta cogitatio, hanc no-
stram vehementer auxit, tum singularis tua, & cum o-
mnium rerum bonarum cōiuncta sapientia, prudentia,
& dex-

IV
& dexteritas, tum incredibilis in omnes literarum stu-
diosos familiaritas & liberalitas, quo in cursu DEVS
æternus, qui est pater domini nostri Iesu Christi, te
vnâ cum inclyta tua familia conseruet atq; regat, &
quod reliquum est, me totis viribus ama, & inter cæ-
tera scriptoris animum in te maximè propensum am-
plexare, æqui boniq; consule, illi aspira, qui sub tua
clientela, sub tuo patrocínio ad longè maiora promo-
tus, virili, atq; intrepido corde digniora indies magis
aggredi audeat. Vale in Christo. Halæ Suæuorum,
primo die mensis Ianuarij, M. D. LXXI.

QVOTEMPORE

FIAT CONCEPTVS TER-
RÆ NASCENTIVM.

IANVARIO,

Sol in Aquario,

FEBRVARIO,

Sol in Piscibus.

PRIMUM CON-
ceptum terræ na-
scentium, flare
incipiente vento
Fauonio fieri sta-
tuit antiquitas Romana, Pli-
nio teste lib. 2. cap. 47. & lib.
18. cap. 26. quod tempus cir-
citer. 6. Idus Februarij acci-
dit, hoc est, 8. die mensis Fe-
bruarij, ab eo tempore, quo
spirat & fiat per nouem dies,
cœlestis quædam aura, ceu
vitalis calor terræ nascenti-
bus inspiratur, à quo reuiui-
scunt et respirant viuescentia
è terra omnia, hunc genita-
lem spiritum mundi græci
Ζεφυρον, quasi *Ζωήν φοντα*,
quod satis & plantis vitam
adferat, vocant Agricola ve-
rò catulitionem, à verbo ca-
tulire, quod est gestire, & coi-
tum maris appettere, nomi-
nant, sic Plautus, cum meam
uxorem vidi catulientem, &
Laberius ille, catulientem su-
pam scripsit. Mouetur autem
is spiritus mundi siue ventus
Fauonius per 9. fere dies, ab
B æqui-

in aquinoctiali occasu, et signis, Cancro, Scorpione & piscibus, item à coniunctione Lunæ cum Marte, ideoq; hic item ac Aquilonaris turba frigore boreali riget, et similiter atq; Austrina cohors australi humiditate madet, hoc est, humidus ac frigidus, tepidus autem respectu Austri, qui est æstuosus, siccior autem Subsolano, quemadmodum in totum omnes à Septentrione & occidente sicciores sunt, quàm à meridie & Oriente. Ab eo tempore licet mari tantum viuescentia è terra, concipiunt tamen varijs diebus, pro cuiusq; natura. Alia protinus ut animalia q; sæpius in anno pariunt, aliqua tardius, quæ semel duntaxat partum gerunt, estq; ut pariendi, sic & concipiendi tempus varium.

Sed quærat quis, quomodo fiat conceptus terræ nascentium, an eadem sit ratio, quemadmodum in conceptione hominis, in qua solers et prouida natura rerum prospexit sexum, ut nimirum marem & fœminam cõstitueret, et ad tempus separaret, ut eos quandoq; ad generis propagationem inuitaret, ne vniuersum genus intercideret, libidinem præterea quasi stimulum ex seminis ardore utriq; iniecit ut sua semina in

unum conferrent? Respondeo, Sexum propriè dictum stirpibus natura non tribuit, ut per coniunctionem maris & fœminæ generarent, sed in se habent rationem seminalem promiscuam ac confusam, ratione cuius in eis inest potentia & libido ad producendum sibi simile, pro conseruatione suæ speciei, quæ potentia non reducitur in actum, nisi adiutorie extrinseci adiuuantis, videlicet, cœlesti influenza, siue Sole & terra, ex quibus notandum duplicia esse plantarum principia, scilicet, Materialia & Effectiua. Materialia sunt ex quibus immediatè generantur, ut sunt vapores terrei & aquei calore coagulati in loco generationis, ut in terra, q; impura est, & plena occultis seminibus, seu viribus seminalibus in principio suæ conditionis sibi à creatore inditis, iuxta illud Genesis primo. Germinet terra herbam virentem, & facientem semen suum, & lignum pomiferum, faciens fructum iuxta genus suum, cuius semen sit in semetipso super terram. Effectiua sunt quæ sua actione transmutant dictos vapores in substantiam plantarum, sicut sunt qualitates primæ in vaporibus istis adiutæ cœlesti influenza, & maximè calor connaturalis vapo-

vapo-

vapori adiutus calore solis. Hæc duo principia si debito modo concurrant fit conceptio, nō sanē quando semen ipsum per propagationem (qua planta nascitur seminatione prævia) attrahitur & retinetur à terra, sed cum seminis potestas exuscitatur, et insitum sibi munus re ipsa obit, & ad parturiendum impellit, quæ vera dicitur conceptio. Non rarò enim fit, quando terra semen attraxit diu continere non potest, sed biduo aut triduo perit, aut in aliam naturam degenerat, veluti in vtero mola, quæ nec conceptio vera est, huius enim mole opprimitur & laborat natura, perinde ut ventriculus cibo graui & crudo. Quemadmodum igitur vterus fecundus ingenita ui, q̄ alteri nulli parti, est concessa, sopitam seminis uim & delitescentem in eo potestatem excitat, & adagendum extimulat, ut energia fiat & dicatur: ita etiam terra ferax & fecunda exceptum semen suo calore foue, deinde excitat et ad parturiendum impellit, tum temporis semen opus agreditur & suscipit, quod ante nusquā agere potuisset, alioqui enim principium vnum per se in seipso generaret, quod est natura absurdum.

Quæ cum se ita habeant, querere visum est, quo pacto duo principia, nempe influentia cœlestis siue Sol, & terra, quæ longissimè distant, concurrant, & quo pacto influentia illa cœlestis ad terræ nascentia descendat. Respondeo per viam quandam mediam tanquam per aërem, quemadmodum in visione accidit, vbi spiritus visorius, qui est lucidus & fulgidus (etenim ab anima, quæ ipsa est lucida & fulgida, autore Aristi. lib. de sensu & sensato, procedit) aërem attingat, & lumen ipsius cum lumine aëris uniatur, qui aër recipit aliam illuminationem, ob quam redditur aptum instrumentum ad visionem: ita fulgor seu cœlestis influentia, quàm primum supremū aëris terminum contactu afficit, statim vim suam fulgidam & ætheream in aërem tā diu dispergit, & longè lateq; diffundit, donec totum illustrant calorem, excitant, cognatumq; corpus seu instrumentū proprium fecerit ad res tangendas, hunc aërem sic illustratum & fulgore plenum, terre nascentia statim sentiunt, & cōcipiunt proprietatē quandā de essentia etherij luminis. Et quemadmodū ē pfundis cuniculis ceruus serpentem

narium inspiratu allicit, aut
 uterus viri semen, è sua cerui-
 ce attrahit, ita etiam terra, in-
 fluentia cœlesti ista gaudet,
 quam ad se attrahit, itaquam
 uterus genitale semen, aut ut
 quidam volunt, vaporem
 quendam ex terra mitti ad
 occulta foramina terræ, qui
 deinceps intro trahitur, tanta
 vis ergo est huius aeris cœle-
 stis, tantaq; necessitas, ut quæ-
 admodum animus non sine
 anima, ita nec anima sine cœ-
 lesti aere seu influentia viue-
 re potest, quod copiosius in
 physicis demonstratur, tan-
 tum de conceptione terræ
 nascentium dixisse sufficiat.

MARTIO, SOL in Ariete.

AGE verò iam terram
 senten fecundum ita
 concepisse, ut consen-
 tanea quadam moderatione,
 mutua amicitia et complexu
 amborū, vis vnica eademq;
 natura iā facta sit, restat ipsa
 conformatio seu Germina-
 tio. Vis illa in semine latens,
 materiam variè distrahit, ei-
 usq; partes secesnit (non e-
 nim est exquisitè vnum, et ex
 omni parte consimile) certis
 diebus partes seminis tenuio-
 res calidiores, & spiritus ma-
 gis participes intro & in me-
 dium totius molis se recipi-
 unt, crassæ verò & magister-
 renæ ambiunt, & circumcir-
 ca obuallant, ex quibus du-
 rioribus factis, atq; coactis
 incipiunt germinare, foetūq;
 proferre, habita tamen ratio-
 ne seminis prout cuiusq; na-
 tura est. Etenim celerrimè in
 horto satorum germinant, et
 nascuntur ocymum, blitum,
 Napus, Eruca, quæ tertio
 die à satione erumpunt,
 Anethum quarto, Lactuca
 quinto, Raphanus sexto,
 Hyeme decimo, Cucumeres
 sexto, uel septimo die à satio-
 ne, Hordeum septimo, Atri-
 plex octauo. Legumina om-
 nia erumpunt quarto die, vel
 cum tardissimè septimo, Le-
 gumina

SEV CONFORMATIO FIAT.

gumina in aegypto tertio die,
raba à decimo quinto ad vi-
gesimum, Cepæ 19. aut 20.
Gethium decimo aut 12.
Contumacius coriandrum.
Cunila quidem & Origanū
post trigelimum diem, om-
nium autem difficillimè A-
pium, quadragelimo enim
die celerimè aut 50. maiori
ex parte emergit. Et quod
mirum de colutea, quæ post
Arcturi occasum germinat,
primo vnicaulis triennio ma-
ximè, spargitur deinde in ra-
mos, quartoq; anno arbore-
scit. Similiter & Lotus & æ-
gilops herbæ, quæ non nisi
post annum è semine suo na-
scuntur. Aliquid præterea ad
II. germinationem, & seminum
ætas confert, quoniam recen-
tiora maturius gignuntur in
porro, Gethio, Cucumere,
Cucurbita. Ex vetere autem
celerius proueniunt Apium,
bera, cardanum, cunila, ori-
ganum, Coriandrum. Mi-
rum in betæ semine: non e-
nim totum eodem anno gi-
gnit, sed aliquid sequente,
aliquid tertio, itaq; ex copia
seminis modicè nascitur: Se-
men optimum aniculum, bi-
num deterius, trinum pessi-
mum, ultra sterile, Plinio lib.
18. cap. 24. attestante,

Hæc quæ diximus cau-
sam potissimum intrinsecā
respiciunt. Quæ uerò extrin-

Qualitas
terræ.

secus Germinationem pro-
mouent, primò est qualitas
terræ, deinde Stercoratio, ter-
tiò temporis ratio, quod ma-
gna ex parte syderibus est
connexum.

Quod ad solum itaq; per-
tinet, sciant studiosi haud mi-
nimū interesse, semina, ut la-
tiorē germinationem, fru-
ctumq; uberiores, deterio-
remq; faciant, cuiusmodi so-
lo mandentur. ceu enim ute-
rus fœcundus ingenta ui so-
pitam seminis uim & delite-
scentem in eo potestatem ex-
citat, et ad agendum extimul-
lat: ita etiam terra ferax &
fœcunda exceptum semen
suo calore fouet, excitat &
ad germinandum impellit,
ea autem est quæ mediocrem
ex omnibus temperaturam
obtinere, nempe, quæ nec im-
modico frigore, ut in hyeme
densior facta, nec humoris
affluentia, extinguit nec sic-
cior alimenti ubertatem in-
hibet, nec calidior semen
ipsum ardore torret & exu-
rit. In summa omnis immo-
derata ablit intemperies præ-
sertim fuge terrā cariosam,
ut Cato uno verbo vitia de-
terminauit, quam neq; plau-
stro, neq; pecore impellas, ea
enim nihil differt à ligni ca-
rie, quæ est arida, fistulosa,
scabra, canescens, exesa &
pumicosa, quæ siue atate, siue

B 3 natu

QVO TEMPORE GERMINATIO

natura ita est, infœcunda ad omnia & imbecilla habetur. Quæ verò modicè intemperata terra est, optimè commodeq; generat ac conformat, si coeant cum intemperatîs pari exuperantia in contrarium vergentibus, sese enim temperant, & certa ratione moderantur. Cum similibus autem commiscetur, ne quicquàm valent producere. Terram teneram, quæ vocatur pulla optima erit, & operi satior, illa enim temperatè vbertatis, illa mollis facilisq; culturæ est, nec madida nec sitiens, illa post vomerem nitescens. & ut Cicero lux doctrinarum altera, scribit, eam terram, quæ vnguenta potius, quàm quæ Crocum sapiat, optimam esse, qualis est in noualibus casa vetere sylua, quæ consensu laudatur. Et in frugibus quidem ferendis eadem terra ytilior intelligitur esse, quoties intermissa cultura quieuit: quod in vineis non fit. Illa certè odorem sic refert, veluti cum à siccitate continua terra immaduit imbre, halitum diuinum, seu vnguentosum è sole conceptum emittit, fœlix igitur hæc terra quæ

succi plena est, & veluti exubere alit omnia, vnumquodlibet tamen iuxta seminis aut plantæ naturam, ut Hippocrates in libro de natura hominis scribit. Semina & stirpes terram vbi subierint, id quod in terra secundum ipsorum naturam est, sibi attrahunt, siue acidum, siue dulce, siue amarum, siue salsum, siue aliud quippiam diuersum, primum autem quod sibi naturali humiditate, siue similitudine coniunctum est, attrahunt, tum cætera deinceps arripiunt.

Hunc igitur modum semina nedum, plantæ in terra cum seruent, opere præritum est, ut genera terrarum addiscantur, hoc est, quibus qualitatibus maxime redundant, ut quælibet planta in locum proprium, & sibi familiarem reponatur, quo liberius vita fruatur, siquidem constat non eadem omnibus conuenire, nec vbique optima prouenire. In agro cassò & læto frumentum feri iubet Cato. Si verò nebulosus sit ager idem, Raphanum, milium, panicum in frigido & aquoso prius serendum, postea

SEV CONFORMATIO FIAT.

itea in calido. In solo autem rubricoso, vel pullo, vel arenoso, si non sit aquosum, Lupinum. In creta & rubrica & aquosiore agro Adoreum. In Sicco et non herbofo, nec umbrofo triticum. In solo valido fabam. Vitium verò quàm minimè in aquoso herbidoq; Siliginem & triticum in loco aperto æditoq; qui sole quàm diutissimè torreatur. Lentem in fruticoso, & rubricoso, qui non sit herboidus. Hordeum in nouali, & in aruo quod restibile possit fieri. Cytisus & Cicer in tenuiore terra, quæ non multò indigent succo. In pingui autem terra, quæ cibi sunt maioris, ut olus, triticum, siligo, linum: Et sic de reliquis, quam terram quod liuet amat, studiosis cognoscendi relinquitur.

Est & sterco ratio subinde agricolis non negligenda, quæ suscipitur, ut terra terra emendetur, fertilisque fruge campus reddatur. Sic Milium, Panicum, Rapa, Napus, nisi in sterco rato agro non se-

rantur. Non sterco rato frumentum potius quàm hordeum serito. Item in noualibus, tametsi in illis fabam seriri volunt, eandem vbiunque quàm recentissimè sterco rato solo.

De Sterco ratione præceptum hoc erit obseruandum. Ager si non sterco ratur, alget. Si nimium sterco ratur est, adurit: satiusque est id sapere quàm supra modum facere. Quo calidius solum est, eo minus sterco ris ratio est. Plura de Sterco ratione lege Plinium lib. 17. & 18.

Hæc etsi legitimè omnia se habeant, ut promptius in proprio solo quam alieno germinet, attamen nisi etiam tempus respiciant, quod maximè syderibus est connexum, pleraque infœcunda aut sterilia videntur, licet terra semen attraxit, diuque continuit, mole tamen opprimitur & laborat natura, præsertim quando influenza cœlestis, quam plato frequentius ignem, ut interdum calorem appellauit, ab Aristotele Spiritus dictus, vel

QVO TEMPORE GERMINATIO

vel naturalis calor, non accesserit. hac enim influenza vnâ cum spiritu & calore omnia continentur ac fouentur, quorum appulsu vita inest, quorum excessu mors irruit. Quanquam uerò in stirpibus minus aperta & euidentis est spiritus & caloris inspectio, eas tamen non minus quam animantes hoc saluari calore et influenza cōseruari, omnemq; omnium salutem hinc oriri perspicuū fiet, qui naturæ opera effectusque existimabit. Hac influenza uiuit papauer, cicuta, mandragora, & vniuersum stirpium genus frigidarum.

Cæterum hoc non ignorandum, quod influenza illa cœlestis seu calor naturalis ratione temporis sit mutabilis. alia enim influenza Veris tempore, alia æstate, alia Autumno, alia deniq; hyeme influit, ut id Hippocrates ex commutatione calidi nostri demonstrauit. Quæ influenza cū aut maior aut minor, firmiter aut infirmior esse appareat, non mirum etiam si opera naturæ aliquando manifestiora aut obscuriora videntur. Hyeme etenim ob frigus corpora contingens, calorem cum sanguine & spiritu in animantibus, et terræ nascentibus intrò repellit in profundum, forisq; cutis

& terræ spiracula adstringens, caloris substantiam coarctat & ita coërcet, ut nihil eius aut minimum possit effluere & germinare: nisi si quæ sua natura ita fortia sint ut suo germinatu sæpe niues perforant, ut de Elleboro Herophilus antiquissimus medicus scribit, qui fortissimo duci adæquabat. Concitatis enim intus omnibus, ipsum in primis exire dicebat Plinio lib. 25. cap. 5. attestante.

Æstas.

Æstate contra, quoniam ambientis feruor corporum spiramenta laxat, & interiores spiritus tum humores foras elicit, necesse est substantiæ caloris plurimum in consinem aërem diffuere, atque dissipari, exiguum uerò intus contineri, hoc tempus licet magis sit commodum ad germinationem, quàm hyems, præsertim post Canis ortum qui fit nostro Hemisphærio 30. aut 31. Iulij mensis, minus tamen cōmodum quàm Ver & autumnus, quæ tempora moderationem quandam inuehunt, hoc est, non offendunt, nec temperaturam excedunt, proinde ad germinationem omnia tunc terræ nascentia prosperant, magis tamen uere, quàm autumno, siquidē Ver omnium partium anni pars est longè salu-

Ver.

Hyems.

SEV CONFORMATIO FIAT.

saluberrima & beatissima, si
natiua modò rationem in-
tuearis. Neq; frigidius a quo
humidiusq; licet bruma, ne-
que calidius siccusq; ut a-
estas, neq; in aequalitate mole-
stum quemadmodum au-
tumnus, sed temperatione &
summè clementia aptissimū
tempus ad germinationem,
quod incipit die Martij de-
cimo, ad pleiadum vsq; ex-
ortum sub 20. diem Aprilis,
si Solarem ortum capias: sin
eum quum à sole emicat, sub
Maij diem sextum, quo tem-
pore incipiunt germinare
(inquam) & reuircere mō-
tes, prata, segetes, campi, vi-
neta, horti, sylua, collium fle-
xus, valles, planicies, opaca,
& luci. Eo tamen discrimi-
ne, ut quæ ex eodem sint ge-
nere, siue ea calida, siue frigi-
da, siue humida, siue sicca,
prius in palustribus, mox in
campestribus, nouissimè in
syluis germinant, per se au-
tem pyri syluestres quàm ce-
tera. Præterea notandum
quod syluestria satius tar-
dissimè erumpere solēt, ete-
nim omnis cura fertilitatem
adiicit, fertilitas senectam,
ideoq; præfloreant talia &
prægerminant, atq; in totum
præcotta sunt, quoniam om-
nis infirmitas cælo magis est
obnoxia. verum quo ordine

hortentia omnia germinant
id ex natura seminis cogno-
scendum, de qua paulò su-
pra monuimus.

Inter Arbores syluestres
primo Fauonio germinat
Cornus, proximè Laurus,
pauloq; ante æquinoctium
Tilia, Acer, Ornus, Carpi-
nus, Cotinus, qui frutex tan-
tum est in Apennino monte.

Inter palustria primas te-
net populus, Ulmus, Salix,
Alnus, Platanus, Myrica,
siue Tamarix, Nuces.

Campestria & quæ mon-
tes amant, sunt ceteræ arbo-
res uere cepturo, ut Aquifo-
lium, Terebinthus, Paliurus,
Castanea, Glandes, Buxus,
Iuniperus, Cedrus, Larix,
Teda, Abies: serotino au-
tem germine malus, tardissi-
mè suber.

Autum-
nus.

Autumno cum pauca re-
stat substantia caloris, ob
eam quæ æstate fit disper-
sionem, & inæqualitatem in-
fluentia, pleraq; ad ruinam
defluunt, & in perniciem ve-
niunt, exhausto enim pabu-
lo, calor unà restinguitur,
non quidem per se, sed per
accidens, & alterius interie-
ctu. Nempè humidi primo-
geniti, nihil enim quod ge-
nitum est, & natura constat,
primum & per se sui exitum
molitur, sed quam longissi-

C me

QVO TEMPORE GERMINATIO

me prorogari, & in rerum natura consistere peroptat. Quo circa non alia est ortus nostri, alia interitus causa, sed quaecunq; nos genuit, & moderatur, ea tandem extremum vitae diem morte conficit. Hic annuus ordo cum seruetur, non mirum cur autumnus pauca germinent, & adulescant, & eo magis quæ ad finem autumnus hyemisq; ingressum, ante Brumam sata sunt: hacq; de causa præcipiunt, quod circa Brumam non sit serendum: quoniam hyberna semina, cum ante Brumam sata sint septimo die germinant. Si post brumam uix 40. die. Sunt qui tempus unum serendi præscribunt, ut Hesiodus, à Vergiliarum occasu. Vergilius autem triticum & far à Vergiliarum occasu seri iubet. Hordeum inter æquinoctium autumnus & Brumam: Viciam uerè, fæsculos & lentem Boote occidente, quod sydus Romæ occidit circa 7. Decembris. Sunt qui ante Vergiliarum occasum seri iubent, uidelicet in arida terra, & calidis prouintijs. Aliqui in frigidis locis, ab æquinoctio autumnus, in calidis serius, ne ante hyemem luxurient. Et cum hoc tempus Autumnus valde sit laboriosum & cu-

riosum, quidam uere potius serendum esse putant, quàm malè in autumnus, atque ubi fuerit necessum inter ventum Fauonium & æquinoctium vernale.

Hactenus de germinatione, qua parte nimirum anni ea sit aptissima & commodissima. Restat ut de partu pauca dicamus,

APRILI

APRILI, SOL
in Tauro.

Veluti cæteris animantibus, statutum partus gerendi & pariendi tempus est, idem & plantis & arboribus lege naturæ decretū, ut post germinationem aut conformationem (quæ specie atq; forma est adornata) pariant. pariunt verò cum flos erumpit, qui ruptis constat vtriculis, veluti in rosa videre licet, quæ primò inclusa granoso cortice germinat, quo mox intumescente, & in virides alabastros fastigiato, paulatim rubescens, dehiscit ac sese pandit, donec expellam solidamq; perfectionem consequitur, & in actum erumpit, non aliter quàm ex seminis materia in vterum emissa, homo tandem procreatur, cuius species quædam & forma præcellerat in semine.

Et quemadmodum animalibus non idem imprægnationis cursus, quædam enim omni tempore coeunt & pariunt, ut gallinæ (præterquam duobus mensibus hyemis brumalibus) Columbæ decies anno pariunt, quædam & undecies, Hirundines &, merulæ & palumbi, & turtures bis anno pariunt.

Cæteræ aues ferè semel: ita et plantæ frutices et arbores, fecunditate aut sterilitate gaudent. Etenim sunt quæ toto anno flore exhilarantur, ut Condrylla et Aphace, quæ ambo picæ nominantur à Plin. lib. 21. cap. 16. Quædam bis & ter florem ostendunt, ut apium, poerum, gethyum, & Scylla quæ tria tempora sationū monitrat. Plin. lib. 21. cap. 13. autore. Quædam semel tantum, & florēt, aut per mensem aut longius. Sunt quæ vere tantum florent, quædam æstate, quædam Autumno, quædam hyeme, quo tempore parturire dicuntur.

Porro notandum inter ea quæ florent, quædam statim in germinatione florere, proferatq; in eo, sed maturescunt tardè, ut vites. Quædam serotino germinatu florent maturantq; celeriter, sicuti morus, quæ nouissima urbanarum arborum germinat, nec nisi exacto frigore, ob id dicta sapientissima arborum, sed cū incœpit in tantum vniuersa germinatio erumpit, ut vna nocte peragat, unà cum strepitu. Quædam floribus duntaxat coronantur, ut Genista, Spartū, Rhododendron & zizipha, quæ & Cappadocia, Plinio vocatur.

C 2 Que

QVO TEMPORE PARTVS FIAT.

Quædam intra se pariunt aut florent, ut Lappa, in qua flos nascitur non euidens, sed intus occultus, Plinio attestante lib. 21. cap. 17. ceu animalia quædam quæ in se pariunt, ut idem autor scribit, de conceptu & partu vipera. Similiter quæ oua pariunt: Multa verò sunt quæ non pariunt, sed duntaxat germinant, ceu inter arbores Ilex, picea, pinus, quæ nullo flore exhilarantur, natalesque pomorum recursum annuos uerli colore nuntio promittunt. Inter herbas nec florent Dryopteris, Filix tam mas quam fœmina. Hemionitis tam mas, quam fœmina, nec semen, nec caulem gignit, similiter & asplenon, nec caulem, nec semen, nec florem, habet. Præterea Epimedium, quod nec florem nec fructum fert, Adiantum & Nardus montanus, nec flores, nec caules, neque fructus ferunt. Nunquam floret Acinon herba, quam alio nomine Plinius Epipetron vocat.

Quædam folijs duntaxat coronantur & perpetuo vident, de quibus infra monēbimus.

Hactenus annum ordinem ut pulcherrimum paucis ostendimus, quem in a plantarum, frutices, Arbores, &

earum semina, quæ in hortis proueniunt & crescunt, feruant immutabilem, nisi quod subinde etiam morbos sentiant, & in aliam naturam degenerent. Sic ocimum senecta degenerat in Serpyllum, & Silymbrium in calamintham. Et ex semine Brassicæ veteris rapa fiunt, atque inuicem. Et necatur Cuminum ab imodorfo, nisi repurgetur. Et ocimum sub canis ortu palle cit: Omnia verò acellu malieri flauescunt. Bettiolarum quoque genera innascuntur. Napis Culices, Raphano eruce. & vericuli, item Lactucis & oleri utrisque hoc amplius limaces & cochliæ. Sic de similibus, de quibus omnibus eadem est ratio, ceu in animalibus, quæ propter morbum naturali cursu impediuntur, ut non meliora grandioraque fiant, sed cito ut imbecilla pereant. Quæ contemplatio licet ad medicos etiam spectet ut delectum medicamentorum habeant, attamen ne limites transgrediar ad institutum me nunc conuertam. Estque hoc, ut simplicia medicamenta quo tempore nemini colligenda sint, explicem rem veluti magis necessariam & utilem, ad usum communis vite, siquidem instru

QVO TEMPORE PARTVS FIAT.

instrumenta ea sunt, sine quibus nemo tutò aut rectè mēderi potest, si viribus destituantur, hoc est, si aut nimis recentia, aut vetusta fuerint, de quibus alijs in locis studiosi admonēbūt.

Locus natalis.

APRILI, SOL
in Tauro.

C 3 MAIO

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS
Natalis.

MAIO, SOL
in Geminis.

In vm-
brolis &
opacis.

A Grostis siue gramen,
Germani, Graß/ ex
Dioscoridelib.4. cap.
26. multiplex est, ut etiam
ex Plinio lib.29. cap.19. ge-
niculatis serpit ramulis, à
quibus radices spargit dul-
ces, articulis præcinctas.

Syluis &
iuxta ar-
bores ve-
tustas.

Alleluia, quibusdam Oxy-
triphylon, latinis trifolium
acetosum, Germanis, sawer-
fice / oder buchampffer / non-
nullis panis cuculis appel-
latur, idq; eò quod quum
Coccyx cuculat erumpit,
nèpè Aprili & Maio mense.

Sepibus
et dume-
tis.

Alliaria, germani ab odo-
re quem refert, knoblochfraut/
vocant, folia cum primum
erumpunt rotunda spectan-
tur violæ similitudine, post-
quam verò adoleuerint, per
ambitum in serræ modum
lancinata visuntur.

Parietib⁹

Alfene, quibusdam anthyl-
lion, nonnullis Myosota vo-
catur, quoniam folia muscu-
lorum aures imitantur, plu-
ra eius reperiuntur genera,
germani, Hünederdeim vocat.

Vineis et
aruis.

Anagallis mas florem ha-
bet phæniceum, Germani,
gauchheyl das mendein vo-
cât: officinis Morsus Calling.

Vineis &
aruis.

Anagallis fœmina florem
habet cæruleum, Germani,
gauchheyl das weible.

LOCVS
Natalis.

MAIO, SOL
in Geminis.

Agris co-
latur.

Anemone, ut græcis ita la-
tinis pariter & Italis, nomen
à flore habet, qui nunq̃ se a-
perit, nisi vento spirante. plu-
ra Anemonis obierunt ge-
nera, vnum satium, cuius
multæ species, quæ floribus
distinguuntur, alia enim phœ-
niceum florem profert, alia
candidum, aut lacteum, aut
purpureum, quæ oēs ut flori-
bus distinctæ sint, ita etiã fo-
lijs & radicibus. Alterum est
sylvestre, quod longè differt
à papauere erratico, præterea
à pulsatilla: Omnia genera
Maio mense florent.

Nascitur
in collib⁹
& sa-
bulosis.

Inter len-
tes et iux-
ta sepes.

Montib⁹
præcipuè
in Creta
insula.

Pratis sic-
cis & in-
cultis.

Pratis.
Hortis.

Incultis
iuxta se-
mitas.

Aparine, germanis flebfraut/
nusquã non prouenit, sed præ-
sertim ut Theophrast. scribit.

Apios q̃ & Ilchas appella-
tur, radicem vomitoriam ha-
bet, ut testatur Dioscorides
lib.4. cap.170. longè distas à
pseudapio, de quo postea in
Iunio mense dicemus.

Betonica purpurea, germa-
ni, braun betonien, nascitur
in pratis.

Bellidis plura quanq̃ nu-
merentur genera, tria tamen
communitè obseruantur.

Bellis maior, Germanis,
Gens blumen.

Bellis minor hortensis,
monat blümle.

Bellis minor sylvestris,
flein zeytlosen. Bulbus

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	MAIO, SOL in Geminis.	LOCVS Natalis.	MAIO, SOL in Geminis.
In syluis & vm- brosis.	Bulbus syluestris, Fuchfio feldtzwibel/nascitur nō pro- cul à Tubinga iuxta mona- sterium Bebenhufen.	In paries tibus la- pidū cu- mulis ru- derib⁹q; nascitur.	Chelidonium maius alijs hirundinaria, quod aduentu hyrundium exurgat & eo- rum discessu emarcescat: vel quia suorum pulloꝝ affe- ctibus tali succurrant hyrun- dines, Germani vocant schel- fraut.
Colitur fistilibus	Caltha siue Calendula, Germani, Rm gelbblumen / floribus speciosis, croceis sin- gulis ferè mensium calendis Maio incipiente, vsq; in au- tumnū florida est.	Pratis & in vijs v- biq; sca- turiens.	Consolida media herba triuialis est, flore purpureo, capitulis penè Stachados, ra- mulis humi repentibus, Ger- mani, gulden gunzel.
Hortis plātatur. Montib⁹ opacis et iuxta se- pes.	Caryophyllata à Caryo- phylli odore, quem manife- stum eius radices spirāt, duo eius genera, vnum satium siue hortense, alterum sylue- stre, Germani, Benedict wurz vocat.	Pasim in hortis colitur.	Cerofolium, planta fragi- lis ac tenera, senis ab vno pe- diculo emergentibus folijs, vulgaris petro selini modo p ambitum incilis, vmbellā in summo caule gerit albis flosculis ornata, tota plan- ta dulcis est, Germani, fertfel fraut.
Propeop- pida na- scitur, & agrisnūc colitur.	Chrysanthemum, aut cal- tha nonnullis bupthalmos, herba est tenera, fruticosa la- tius proferens caules, & mul- tifida folia. nec est ranunculi species Fuchfij, flore luteo, vehementer splendens.	Syluis & vmbros- sis.	Cynocrambe, id est, brassi- ca canina, Germani, Hunde- feel.
Pingui solo pro- uenit, iu- xta sepes in vm- brosis.	Clematides daphnoidis, nonnullis vinca peruinca di- citur, folia exeunt per inter- ualla pari vtrinq; exortu lau- ri minora flore caruleo, & nunquā folijs exuta specta- tur, Germani vocant, Win- tergrün oder Syngrün.	In plani- tie et col- libus.	Elleborum seu veratrum nigrū ex Dios. lib. 4. ca. 134. Melampodion appellatur, ob pastore Melampum, qui eo primum vsus est. triplex in flore varietas conspicitur, primum purpureo, alterum candido, tertium herbaceo. Vniuersa genera veratri ni- gri, Martio & Aprili mensi- bus florent, legenda Maio & initio aestatis.
Solo vli- ginoso frequens est.	Chelidonium minus, alijs Scrofularia minor quibusdā testiculus sacerdotis, Fuch- sius ad Malacocissi speciem retulit, Germanis, Präffen- hödle oder seygwartz.		Quan-

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	MAIO, SOL in Geminis.	LOCVS Natalis.	MAIO, SOL in Geminis.
In Colli- bus & a- spersis lo- cis iuxta Halam Suauoru plurimu reperitur	Quamquam non desunt, qui Veratrum herbaceum Consiliginem esse opinan- tur, eo argumento ducti, qd omnem morbi uim, si in au- riculam quadrupedum inse- ratur radix perforata ferro prius aure, eximat, quæ ta- men opinio falsa est cum ea- dem radix Veratri, id quod Consiligo, prestare potest, autor est Plin. lib. 25. cap. 5.	Iuxta se- pes.	Geranium quartum flori- bus purpureis, ex quibus ca- pitella rostrata gruini capi- tis instar prodeunt.
Arido so- lo gau- det.	Eruca sylvestris vulgaris admodum planta est Germa- ni widen senfft / incipit flore- re Maio, & durat per integrũ serẽ mensem.	Pratis motosis & saxo- sis.	Geranium quintum flori- bus cæruleis: hæc & aliæ spe- cies officinis gruaria herba, autacus moschata, siue ro- strum gruis & Cyconia di- cuntur.
In mace- rijs & se- pibus.	Erigeron gracè, Senecio alijs. Germanis, grindstrauf oder Creutzwurtz / virescit to- to anno & quolibet serẽ mē- se floret. Est & aliud genus Senecionis, quod germani florem Sancti Iacobi appel- lant, quod non nisi Iulio & Augusto colligimus,	Montos sis locis. Colligen- da hæc herba est Maio, Iu- lio & Iu- lio men- sibus.	Herba paris vno 'constat caule, rotundo duorum pal- morum altitudine, è cuius medio erumpunt folia, eo- dem ambitu, crucis instar patentia, sanguineæ virgæ si- millima, Germani vocant Wolfsbeere. longè differens ab Aconito pardalianchi Dio- scoridis, quæ radicem habet effigie Scorpionis.
Segetib⁹.	Fumaria prima, germani, Erdtrauch.	Pratis a- menis & vliginos sis.	Hediopnois maior, non- nullis Dens Leonis, alijs Dens Caninus, quibusdam caput Monachi, aliquibus Rostru porcinum, plerisque Ambu- beia vocatur, nec non Tara- xicon, Germani, Großreile- traut / folijs Cichoraceis fre- quenter lanciniatis in sagit- tæ modum, caule palmari, rotundo, glabro, cancauo, lacteο succo pragnante, na- scitur.
Syluis.	Fumaria altera, quam pro pistolochia quidam pingūt.	Locis hu- midis & sylvosis.	Lilium conuallium, Ger- mani Mayenblumen.
Campe- stribus.	Geranium floribus pur- pureis, germanis, Storcken- schnabel.		Myr-
Vmbros- sis.	Geranium floribus sub purpureis.		
Dumetis locis.	Geranium tenuifolium purpureis floribus.		

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	MAIO, SOL in Geminis.	LOCVS Natalis.	MAIO, SOL in Geminis.
In hortis & pratis nonnullis	Myrrhis, Germanis, Wild- derforfel appellatur, caule, folijsq; simillima est cicuta. radix odorata cibo non in- suavis, nascitur passim.		et radicibus, nihil aut parum discriminis habeant, tamen in floribus manifestè differre videntur, flores habet diuersi si coloris, videlicet purpu- reum, candidum viridè, ac ni- gricatem inferiori parte pla- nè fuci effigiem exhibent.
Hortis colitur.	Nasturtium herba hortis familiaris & frequens, Maio & Iunio florida.	Inter le- gumina nasci cō- stat, nē pē canna- bimlinū, & in vijs secus a- grorum lepes.	Orobanchis, à strangulan- do legumina cognomētum habet. cauliculus est subru- ber, hirsutus tener sine folio, pinguis, flore sub albido, aut in luteum vergente, quibus- dam hæc Herba tora voca- tur, quod vacca ea degusta- ta, statim taurum adeant.
Nascitur in cultis locis cir- ca tinera & prata.	Nasturtium sylvestre, Ga- leno alio nomine lepidium. iberis appellatur, officina non agnoscunt, Germani, Gauch vllimen / oder Wilders fress.	Agris in cultis & inter se- getes Maio mēse re- quiruntur	Ornithogalum cauliculus est tener, candicans, tenuis, sesquipedalis, tribus aut qua- tuor in cacumine mollibus agnatis, à quibus flores pro- deunt foris herbacei, & cum se pandunt, lactei visuntur.
In pratis luxuriās in petro- lis & sa- bulosis frequens	Orchis, alijs Cynosorchis, latinis testiculus caninus mas: folijs latioribus, Ger- mani, Knaben fraut/ puerulis ob florem in ceruleo purpu- reum exepitatus, Orchis mas, angustifolijs, & maculosis, floribusq; purpureis constat.	Praten- sis est herba.	Ophioglosson aut lingua serpentina, herba arietina, folio vnico, pingui, digiti lō- gitudine, paruo, plantagini aquaticæ vocatæ non dissi- mile, pediculo herbaceo, ex huius inferiore sinu prode- unte. Maio mense irumpit, & statim post fugax euane- scit.
Pratis & campe- stribus.	Orchis fœmina maior. Orchis fœmina minor, om- nia hæc genera Maio & Iu- nij principio carpuntur. Orchis serapias mas, siue Triorchis, à tribus testiculis denominationem habet, Ger- mani, Ragwurz / florem ha- bet purpureum, & parum peralbicantem.	Montes amat.	Ophris, Germanis, durch wachs/ oder zwey blat. D Prunel-

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	MAIO, SOL in Geminis.	LOCVS Natalis.	MAIO, SOL in Geminis.
Pratis gaudet.	Prunella, germani prau- elln/Matthiolus consolidam minorem petasitis Fuchsj, quam Matthiolus pro Tus- silagine maiori pingit ger- mani vocant, pestilenzwurtz.	Incultis & pratis.	Sanguisorba maior & mi- nor, germani, Trachenblut fraut vocant.
Monto- sa herba.	Polygonatum, officinis sigillum sanctae Mariae vel Solomonis. Germanis weiß wurtz / folijs laurilatoribus & lauioribus, sapore mali cotonei, aut punici, cū qua- dam adstrictione.	Pratis a- menis.	Tragopopus, siue barba hir- ci, duorum est generum, v- num floribus luteis quod na- scitur.
Limitib ⁹ humidis	Ranunculus luteus, Ger- manis, gelber hanensfuß. Gra- cis Βαργαξιον dicitur.	Campe- stribus & incultis.	Alterum floribus purpu- reis, quod non nisi mense Iu- nio incipit florere. Colitur apud nos in hortis & fictili- bus. primo anno cum seri- tur non floret, sed sequenti.
Montib ⁹ et asperis locis.	Ranunculus purpureus. Ranunculus lanuginosus, gefülter hanensfuß.	Palustri- b ⁹ & cā- pis nasci- tur.	Verbasum odoratum, Schlüsselblumen.
Syluis.	Ranunculus aureus, wilder goldgelber hanensfuß.		Verbasum non odoratum. Vitex, quam vulgus agnū castum appellat, duplex est, vna candida, quod videlicet florem candidum cum pur- pureo mixtum habeat, altera nigra, quae tantum purpu- reum habet florem, Germani Schaffmullen.
Humidis locis.	Ranunculus candidus, weiß- ser hanensfuß.		
Pratis sa- bulosis et montib ⁹ foli ex- positis.	Satyrium, officinis testis vulpinus aliqui trifolium, Germani, Stendelwurtz / of- ficinae non agnoscunt. Satyrium Erythronium siue Erithracion, siue rub- rum. Satyrium Basilicum fœ- mina, alij palmam cristi Ger- mani Creutzblumen.		
Nemori- bus.	Scordium vrsinum, Ger- mani, waldknobloch. Saxifraga maior & alba, Germani, weißen steinbrech.		

IVNIO

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS
Natalis.

IUNIO, SOL
in Cancro.

In hortis
petrolis
& riguis

A Canthus vel Acantha vera, quam Romani pederotam vocant, Germani, Welsch bern flaw/ officinis non agnoscitur, folia habet multò laetucaceis latiora & longiora, erucæ diuisura, nigricantia pingui leuia, caulem binum cubitorum digitali crassitudine, florem album nascitur.

Incultis
ac petro-
lis.

Acanthus sylvestris, autor est Diosco. & Plinius, folijs spinosis, angustioribus tamen vero, longè distans à sphondilio sylvestri.

Anemonis quinque obseruantur genera.

Collibus
& sabu-
losis.

Primum provenit folio coriandro simili, sed frequentioribus incisuris, lanuginosis caulibus, floribus sylvestris papaveris magnitudine, senis circum distinctis folijs purpurascens, capitulo umbilicotenue emergente, nigro colore, nigrisq; capillamentis stipato, perinde ac in papauere.

Aruis &
segetib⁹.

Secundum folijs assurgit maioribus & frequentius lanciniatis, flores purpura dilutior nitescens.

Tertium folijs crescit rannunculo primo æmulis, caulibus tenuibus, rotundis, in quorum cacumine flores albi. quinque tantum folijs di-

LOCVS
Natalis.

IUNIO, SOL
in Cancro.

Campe-
stribus.

Stincti rosarum magnitudine.

Quartum folijs lanciniatis floribus purpureis.

Quintum folijs lanciniatis floribus aureis.

Omnia hæc genera, Maio mense & principio Iunij florent: obseruandum præterea ne pro papauere erratico colligantur, quæ inter se longè differunt, ut testatur Diosco. qui diuersis capitibus de ijs scribit.

Pratis a-
menis &
vmbro-
sis.

Aquilegia Germanis, Agalei/ non desunt qui pro specie chelidonix maioris ponunt, caulescit mense Iunio, numerosa caulium sobole gracili tamen ac tenui.

Inter se-
getes &
prope se-
pes.

Aphace, germ. Wilde wiesen/ oder vogel wicken, folio germinat vitæ maiore, crassiori; flore subrubeo, siliquis inde de pendentibus pisorum instar, nascitur.

Hortis
colitur.

Aristolochia triplex, longa germ. ostelucey/ Rotunda, Germ. holwurcz, q longè tamen differt à pistolochia Fuchsij, siue fumaria altera. Tertia est Aristolochia clematidis

Montib⁹

Asphodelus verus, vel hastula regia, folijs est maioris porri, caule leui, floribus albicantibus, numerosis in stellæ modum sese pendentibus, officinæ nostræ carent, nascitur.

D 2 Althea

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	IUNIO, SOL in Cancro.	LOCVS Natalis.	IUNIO, SOL in Cancro.
Hortis colitur.	Althea, quam alij Ibisum vocant officinis bis malua. Germanis, <i>Ibis</i> /oder <i>heyl- wurtz</i> /in syluestrium malua- rum genere est, cui folia ut Cyclamino rotunda lanugi- ne canescunt.	In obscu- ris syluis & valli- bus. Pratishu- midis, & vmbro- sis locis.	Barba capri Fuchsi, Ger- manice, <i>Wald geißbart</i> . Bistorta, germani, <i>Natter- wurtz</i> /quàm aliqui Britanni- cam herbam esse contendit, duplex est, mas & foemina, officinæ utramque plantam serpentariam falso appellat, cū ea sit Dracunculus, Diosc.
Hortis & campe- stribus.	Attriplex ex Diosc. lib. 2. ca. 3. aliqui chrysolochanon vocant, germani <i>möiten</i> . duo eius genera satium & syl- vestre, utrumq; olus cogni- tum.	Asperis & petro- lis.	Chamædrys græcis, alijs chamedrops, officinis cha- medryos, genituo pro recto utentibus, ut in Stochade, vulgò calamandrina, ex Dio- sc. lib. 3. cap. 94. latinis Trifago. Sunt qui eam Teu- crion appellauere, propter si- militudinem quam seruat cum teucro, Germani, <i>Hein- Bathengel</i> . Iunio & Iulio mensibus colligenda.
Campe- stribus & ruderib. In sepib. scobium margine, nusq; ra- men nos copioflo- rem na- sci vidi- mus quā Tubinge	Bursa pastoris, Germani, <i>Sirtenstab</i> . Bryonia & ampello leuie græcè, vitis alba latinè, fescè ra arabicè vulgo nostro, <i>Stuckwurz</i> /tota æstate flore- scit, & in sublimè ita attolli- tur ut vniuersos tegat, arbo- res scandit, et sepes tanquam itragula veltis exornet. Bupthalthmon, quidā ca- chlon vocant, germani <i>Kins- aug</i> /caules emittit ténues mollesq; : folia fœniculi, lu- teum florem, anthemide maiorè oculi similitudine, vnde nomen traxit, ex hac descriptione Diosco: errant hi qui Bellem maiorè pro Bupthalthmo ponunt, errant & officinæ, si cotulam non fœtidam pro eo rapiunt & colligunt.	Iuxta se- pes.	Caryophyllata syluestris, floribus luteis, vulgò <i>Benes- dicwurtz</i> .
Circa op- pida et in campe- stribus nascitur,		Pratis.	Careum, siue Carum, Ara- bistis Caruum, Germ. <i>Fumel</i> .
		Vineis nascitur.	Cynoglossum, latinis lin- gua canina, Germ. <i>Hundts- zung</i> /herba est caule vacans, lanuginosa. nec est ea herba, è solo elata passim circa iti- nera, caule hispido, surculo- so, folijs hirsutis, arctis, præ- longis flore ex purpura cæ- ruleo, qui aliquibus pilo- sella maior dicitur.

Cyanus

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	IUNIO, SOL in Cancro.	LOCVS Natalis.	IUNIO, SOL in Cancro.
Inter frum- menta- ceas sege- tes mi- nor ap- paret.	Cyanus, alijs Baptifecula, duplex maior et minor. Ger- mani, fœm blumen / Maio & Iunio mense, ad contexen- das rusticarum puellarum coronas expetita est minor. Cyanus maior nascitur non procul ab Hala sueuorum in monte dicto, cinsom.	Montib ⁹ et collib ⁹ Maio & Iunio mense vberri- ma est.	ex qua de descriptione apparet lôgè differre Chamecyssum ab Hedera terrestri, quàm quidam chamecyssum affir- mant.
Copiose nascitur indume- tis, & pra- tis siccis.	Campanula Fuchsi, Ger- mani, balsfraut / quod vide- licet ad oris, cervicis fau- ciumq; mala conferat dicta est.		Chamepitys, siue aiuga uel abiga, siue ibiga & iba ex b. mutatione, vulgo Iua arthe- tica. ex Dios. lib. 3. triplex est. omnes odorem piniredo- lent, ex Marcello picea à quo chamepitys nomen dedu- ctum esse credunt, quasi par- ua picea, uel parua pinus. Quæ verò in officinis mon- stratur, viginem potius resi- pit quàm pinum, vix amare- scit, minusq; densa.
Inter fru- menta & segetes sponte prouenit	Chamamelum, officinis Camomilla grecis anthemis, trium est generum flore tan- tum distantium, de quibus infra de floribus dicemus.	Agris macris.	Consolida regalis, Germ: Kitterspoin / species chamo- miæ.
Herba nō nisi sa- ia in ger- mania nōstra crescit.	Coronopus, Germ. Bräen- fuss / dicitur & sanguinaria, officinis iucognita herba est oblonga per terram strata, folijs tcissis, radice gracili & adstringente.	Asperis & incul- tis locis.	Echion, quod à viperis no- men omnino adinuenit, vel quod semen proferat capiti- bus viperinis simile, appella- tur etiam ut autor est Nican- der Alcibiaceum. folia habet prælonga, aspera, aliquan- tum tenuia, anchusæ proxi- ma minora tamen, subrubra & pingua, spinulis tenuibus horridula, flores purpureos nascitur.
Nascitur in cultis.	Est & Cornopus syluestris herba, q̄folia pfert longa, an- gusta, per interualla cornicu- lata, humi accubantia, & in stellæ modum radiantia, cau- lem, spicam, florem & semen gerit, per omnia plantagini similia.	Hortis colitur.	Eruca duæ species ex Dios. lib. 2. vna hortensis quæ flo- ret tota æstate, colligenda ea Augusto, alia syluestris ma- ximè

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	IVNIO, SOL in Cancro.	LOCVS Natalis.	IVNIO, SOL in Cancro.
Campe- stribus et incultis nascitur.	ximè in Iberia quæ occiden- tem spectat, ea circa calendas Iunij potissimum erumpit, alio enim tempore vix repe- ritur.	Montib ⁹	Filix fœmina folijs est fi- licis surculosis, altioribusq; & quæ non singulari, ut illa, pediculo fulciatur: vtramq; plantam Germani, <i>Waldfar- ren</i> vocant.
Campe- stribus & mōtosis.	Eringeon, Germ. <i>man- trew</i> / oder <i>raddiseln</i> / legitur cum sol est in cancro, nasci- tur copiosissimè iuxta ar- cem Lympurg prope Ha- lam Sueuorum.	Nascitur propè se- pes & se- cus uia.	Galion, nomen ex eo tra- xit, quod in contrahendo lacte coaguli vicem impleat, germanis, <i>vnser fræren weg- stroß</i> vocant, folium habet aparinæ simillimum, minus rem tamen.
Hortis vbi Thy- mus, co- litur, cre- scit.	Epithymum, flos est è Thymo duriore satyreia si- mili capitula habet tenuia, & leuia, & in eis caudiculas quasi capillamenta. Colligi- tur eo tempore, quo thy- mum largè floret, quod acci- dit circa solstitium cancri.	Circa se- pes & difi- ciorum, areas ac semitas vbique.	Galeopsis, græcis pariter ac latinis, quibusdam vrtica fœtida nominatur, longè distans à scrophularia maio- re.
In mon- tibus & saxosis.	Filix mas, folia habet sine caule, sine flore, ex vno pe- diculo cubitali longitudine exeunt, multifida & lateri- bus pinnata sub graui odore Etlî Diosco. lib. 4. cap. 178. sine fructu scribit, constat ta- men, semen ferre filicem, a- uersis folijs inhærens, sed minutum. colligitur planta Iunio, semen vero circa fi- nem Iunij mensis, legitur au- tem abscissis, propè radicem folijs & in domo suspensis, substracto linteolo, aut pa- pyro.	Nascitur in monti- b ⁹ , copio- siore nō vidi q̄ in mōte di- cto <i>Her- berg</i> / nō procul à Balinga.	Gentiana à Rege Illirico inuenta, cognitu facillima, folijs iuglandi, plantagini- ue similibus, iuxta cacumen paulum dissectis, Germani, <i>Enzian</i> vocant. Sunt & aliæ species Gentianæ, inter quas Cruciata vna dicitur. Gnaphalium tormentosa planta & incana, quibus- dam herba Sancti Christo- phori, vel filius ante patrem, alijs impia herba dicitur, Germanis, <i>Rhurfraut</i> / folijs albis ramulis capitatis, ros- marini, ut scribitur, effi- gie. Genesta, falsò quibusdam spar

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

IVNIO, SOL
in Cancro.

LOCVS
Natalis.

Pratis
motosis
& saxo-
sis.

In riguis
pratis &
conual-
libus

In vineis
cultisq;
locis ac
semitib;
copiosis-
sima.

Pasim
iuxta iti-
nera na-
scitur.

IVNIO, SOL
in Cancro.

spartion appellatur, ad sco-
pas obsequiosissima pluri-
mis turget foliolis, floribus
luteis, pisi modò lunatis,
Germani, Genesi.

Gratiola quibusdam gra-
tia Dei folijs lini, vel Hyllo-
pi æmulis, latiusculis, caule
rotundo, anguloso nonnun-
quam floribus oblongis, ex
foliorum sinu flavescenti-
bus, aut purpurascensibus.
Germani, vocant *firschtraut-*
oder firsch byssop.

Hedera terrestris, longè ab
Asclepiade herba distans,
longis tenuibusq; funiculis
hedera illa in terra proserpit,
folijs violaceis, asperis, gra-
uiter odoratis, in ambitu di-
scissis, floribus in purpura
albicantibus, Fuchsius Cha-
mecissum Dioscoridis esse
credit, Matthiolus negat.

Intybus latinè, Seris græcè,
ex Dios. lib. 2. cap. 125. diui-
ditur in sylvestre, picris & ci-
choriū appellatū, latinis aut
Ambubeia, officinæ Cicho-
ream, Germani, *Wegwarten*
vocant, hæc cū Iunio incipit
florere, in autumnum usq;
durat ab eo tempore donec flo-
ret colligenda erit, altera syl-
vestris, Seris siue Intybus He-
diopnois nominatur, latior
re folio constat, quibusdam

Dens

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS
Natalis.

IVNIO, SOL
in Cancro.

Pratis
spōte sua
crescit.

Dens Leonis, quod folium
sinuatim per lacinias denti-
culatum sit. officinis Ta-
raxicon aut Altaraxicon, ger-
manis, Korktraut/oder praf-
sen rōrle. colligendum Iunio
mense.

Hortis
puenit
cultā.

Satiuus Intybus, quem pri-
uatim, Plinio teste lib. 20.
cap. 8. Serin nominarunt, in
duas distinguitur species, v-
na latiore folio, quam vul-
gus Endiuam vocat, lactuce
similior, nostratibus mensis
Iunio & Iulio mense, in ace-
tarijs frequentissima, trans-
lata hæc, terraq; sepius obru-
ta cādorem, teneritudinemq;
acquirat, & maiorem amari-
tudinis partem exuit. Altera
angustiora folia habet, &
subamara est, Germani Sca-
riolam vocant.

Montib⁹

Imperatoria, herba no-
men acquisiuit, propter in-
gentes facultates quas ha-
bet, contra nimirum mor-
bos venenatos, folijs Sphon-
dylio minoribus, solo accu-
bantibus, robustis hirsutis ac
asperis constat, in cacumine
floribus candidis.

Lapathum officinis, vel
lapacium acutum, vulgò Ru-
mex, græcis Oxylapathum.
ex Dios. quadrifariam distri-
buitur, Galeno trifariam,

LOCVS
Natalis.

IVNIO, SOL
in Cancro.

In palu-
strib⁹ &
circasof-
sas.

Hortis
plātatur.

In arcis
sepib⁹ &
sec⁹ vias.

Partim
seritur,
partim in
pratis at-
que in-
cultis na-
scitur.

Nascitur
in pratis
& palu-
stribus.

Nascitur
montib⁹
pserim

primum palustre, Germanis,
Wildtampffer / oder streiff-
wurg.

Alterum satium priori
non dissimile, at minoribus
folijs pluribusq; cauliculis,
hoc genus creditur esse Rha-
barbarum Monachorum.

Tertium genus sylvestre
est, paruum plantagini pro-
ximum humile & molle,
germani, gūten heinrich vo-
cant, nascitur.

Quartum Oxalis vulgo
acetola dicitur, quia gratum
acorem palato repræsentat.
Germani, Sawerampffer /
caule non magno semine
rubente, subacuto, hanc Ro-
mani propriè appellarunt
Rumicem, ad vsus medicos
expetita forsitan, quod ab ea
succus non aliter, atq; mam-
ma (quam Rumen veteres
dixerunt) sitientibus exugi
soleat.

Limonium folia habet
betæ, tenuiora & longiora,
decem & sepe plura, caulem
tenuem rectum lilio equa-
lem seminibus rubris scatentem,
quæ gustata adstringunt
Germani, Waldt mangoit / vo-
cant.

Lunaria minor, germanis,
flein monatfraut / planta est
brevis, dodrantali ferè altitu-
dine

LOCVS Natalis.	IUNIO, SOL in Cancro.	LOCVS Natalis.	IUNIO, SOL in Cancro.
mōte Au- striaco ppè Tu- bingam.	dine caule constat simplici, rotundo, lento ac gracili, ē cuius medio in latus exit ra- musculus, cui folia sūt vtrin- que septem annexa, lunata, crassa, firmaq;.	Pratishu- midisiu- xta alue- orū mar- gines, & montib⁹ saxosis reperitur	tur, duum est generum, al- terum flore luteo, Germani, gelb wederich / caule iunceo, longo, nodoso, folijs saligi- ginis, ut plurimum ternis, gustu valde adstringentibus,
In segeti- bus & cultis a- gris.	Lolium, Germani Trepse- oder waldtrepse / floret hoc mense, Iulio semen profert & cum frumento colligitur, in mea patria vulgò For- scheim plurimum reperitur.	In palu- stribus & locis hu- midis.	alterum flore purpureo Ger- mani, braun wederich / haec- nus nobis incognita, quam verò officinæ pro Lylima- chia ostendunt, vera Diosco- ridis non est, ut ex gustu ap- paret quæ non adstringit, sed potius illegittima Lylis- machia.
Nascitur in cultis locis cir- caitnera & prata.	Lepidium siue Iberis, Na- sturtium agreste, Germanis, gauchblum / oder wilder freß/ licet his nominib⁹ Fuchsis & Matthiolo, res eadem signi- ficetur, quod & Damocrates lepidium, Iberim appellavit, Gal. lib. 19. c. p. med. loc. te- ste, attramen Appollinari Ver- cellensi medico, sanè doctis- simo, plantæ, diuersæ sunt.	Montib⁹ & hortis plātatur.	Laserpitium germani- cum. Germani, Maister- wurg / alijs Magistrantia, Iu- nio mense florida est.
Hortis plātatur. Nascitur in aspe- ris & edi- tis locis.	Lepidium piperitis, Ger- mani, pfefferfraut.	Syluis fa- bulosis et in vijs locis pfer- tim inter muscos fos lapi- des.	Laserpitium verum Dio- scoridis nascitur in Syria Ar- menia, Media & Lybia. Cau- le ferulaceo, quem Maspetū vocant, folijs apio simili- bus lato semine.
	Lithospermon, officinis miliū solis vel soler. ex- Diosco. lib. 3. cap. 141. à se- minis duritie nomen acce- pit, folijs est oleæ longiori- bus, Germani Meerbirch & Steinsamen vocant, officinæ maius & minus ostendunt, Iunio & Iulio mense semine turgent.	Hortis plātatur.	Muscus terrestris, Germa- ni, mosig / vocant, planta est longis viticulis, vbiq; & ob- longis, foliolis numerosissi- mis vestita.
	Lysimachia, quibusdam Corneola, alijs salicaria dici		Melissa quam melisso- phyllon siue melitena, id est, apiastrum vocant, voce dā- nata ab Hermolao secundo sui corollarij cap. 310. etsi ab Ignio viro eruditissimo in- E uecta,

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	IUNIO, SOL in Cancro.	LOCVS Natalis.	IUNIO, SOL in Cancro.
	<p>uecta, Dioscoridi ac Varro ni vsitata alijs citrigo siue citraria ab odore citri, de qua Diosco. lib. 3. cap. 99. est porro duorum generum, vnum luteum, alterum pur- pureum, Iunio & Iulio colli- genda.</p> <p>Melilotus, siue sertula cā- pana, alijs Regia corona, Germanis, vnser frawen schū- lein/in tria fastigia diuiditur.</p> <p>Primum verum Melilo- tum, simile fœnu græco est, folio raro, flore luteo, odoris eiusdem cuius & herba, nem- pè suauis.</p> <p>Secundum aspectu cano- croci odore ac flore pinguis- simis ac breuissimis folijs, Plin. teste lib. 21. cap. 9.</p> <p>Tertium ab radice frutico- sum, cubitale, flagellis exi- libus, coma trifolij minuta, ac lente fimbriata, flosculo melino, odoris eiusdem cui- & herba, nempè suauis om- nia eiusmodi genera melilo- ti in fine Mēsis Iunij & Iulio dū florent colligenda sunt.</p> <p>Melilotum syluestre, quod accedit ferè ad formam ge- nestella, Germani, vnser frau- wen schūlein.</p> <p>Nymphaea, officinis Ne- nuphar, folijs fabæ ægyptiæ. Est & altera Nymphaea cuius</p>		<p>flos blephara dicitur, folijs antedictæ radice alba, scabra, flore luteo, nitente, rosæ simi- li, nobis in pallidam flore cā- dido, lilio simili radice nigra aspera, clauæ figura. & cro- ceam offi. citrinam diuidi- tur, flore luteo, splendēte ro- sæ simili, radice alba aspera. quæ candida est radice po- tentior existimatur.</p> <p>Orminū, satium, Germa- ni, garten scharlach / herba est folijs marrubio similis, caule semicubitali, quadrangulo circa, quem eminentiæ sili- quis similes prodeunt, quæ ad radicem spectant, hæc planta plurimū distat à Gal- litrico, uel centro galli, alijs sclarea.</p> <p>Orminnū syluestre, wilder scharlach / vulgò dicitur, folio est saluie fere simili, gallitri- co passim vocato haud lon- gè ab simile.</p> <p>Plantago maior, Breyte wegerich.</p> <p>Plantago minor, spitzig wegerich.</p> <p>Plantago aquatica folijs est ceteris crassiore robustio- reque ac leuiore, ex lata origi- ne in acutum desinente, lan- ceæ cuspidis modo flosculis, cādidis, græci Alisina vocāt, Germ. wasser wegerich.</p> <p>Paxconia</p>
	<p>Paludib⁹ & stagna- tibus a- quais.</p>		
		Colitur.	
Hortisin Germani- a, plan- tari cepit			
		Pratis & sponte nascitur.	
		Pratis.	
		Humidis	
		Lacunis.	
Pratis & aridis lo- cis.			

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE

LOCVS Natalis.	IVNIO, SOL in Cancro.	LOCVS Natalis.	IVNIO, SOL in Cancro.
Hortis colitur.	Paania, siue glycyfide ex Diosc. lib. 3. cap. 134. græcis aliquibus penthoron dici- tur, sunt qui Idæas dactylos radicem paconix vocent, duplex est, mas & fœmina, Germa: gichfraut.	In pratis asperisq; & saxo- lis.	Philipendula, à tuberosis radiculis, quasi ex filo pen- dentibus, græcis znanthe, Germanis, Steinbrech. folijs staphilini, floribus candidis.
Aquosis.	Pentaphyllon, maius can- didum, weiß gras fûnffinger- fraut.	Petrosis & aridis locis.	Pilosella maior, Germani, Nagelfraut, herba est è solo elata, caule interdum cubita- li, hispido, surculoso folijs arctis, pralongis, hirsutis, non venosis mollibus, hanc herbam officinae magno er- rore, pro cynoglossio vero v- surparunt.
Incultis.	Pentaphyllon maius luteū, gelb fûnffinger fraut.	Aridis.	Pilosella minor Germani, Neuß öle/oder hasen pfedle/ differt tamen ab auricula muris, quam Germani, Bü- nerderm vocant.
Aridis locis.	Pentaphyllon minus.	Hortis si- mosis.	Pes anserinus, à Domino Fuchfio præceptore meo ob- servantissimo herba sic di- cta, quod folia planè formā anserini pedis habeant, vul- gò Gens fûß.
In sege- tibus cā- pis et ma- cerijs.	Papauer: ex Diosc. lib. 4. cap. 54. aliud est erraticum, quod rhæada vocant, recen- tes papauer rubrum, flore protinus deciduo puniceo, interdum albo oblongo ca- pite, pueri eiusmodi folijs concauo pugno impositis ludunt, altera palma incus- sa, strepitum edunt, Ger- mani fœn rosen vocant.	Hortis et sepibus colitur.	Periclymenon vulgo ma- ter sylua, quibusdam capri- folio, siue vincibosco, aut li- lium interspinas, Germani, Wald lilien/cuius fructus po- ma equina vocantur.
Hortis.	Aliud papauer satium est, quod Thilacitem vocant se- mine est candido. colligen- dum id Augusto mense.	Montib ⁹ vmbro- sis.	Pyrola Germani, Winter- grün / folia pyri arboris in- star habet.
Campe- stribus & segetib ⁹ .	Parthenium, de quo Dios- c. lib. 3. cap. 132. aliqui a- maracon vocant, vulgo ma- tricaria Germani, Niertram/ estq; hoc parthenium.	Seritur in Italia & Ger ⁹	Rubia tinctorum officinis, græcè Erithrodanum, radix rubra est, qua tinguntur lanae.
	Domesticum siue hortense: alterum est campestre, quod Germani, wild familln vo- cant, oder frotten dill.		E 2 vna

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	IUNIO, SOL in Cancro.	LOCVS Natalis.	IUNIO, SOL in Cancro.
mania quibus dā locis. Vmbro- sis & se- pibus.	vna est satiuā, Germ: Garten röt/altera syluestris, alias stel- laria dicta, nec est pediculus Lupinus vulgi) folijs & cau- libus asperis ac rudibus, hæc & Alchymilla aut pes Leo- nis dicitur, folijs oc tangulis maluam penè referentibus, circum serratis, flosculis stel- latis. Iunio dum florescit colligenda.	Pratisvli- ginolis.	quod Dij colludentes, Nym- phis ad firmiorem venerem hanc herbam inuenerunt.
Incultis & aridis feritur.	Sanguisorba maior & mi- nor, Drachenb. ür fraut.	Pratis af- fatim lu- xurat.	Sphondilium folijs qua- dantenus platani, at panacis caule fœniculato.
In uinetis ruribus virida- rijs vtra- que ge- nera fa- miliaria.	Spinachia, folio triangu- lari, Germ: Binesch.	Pratis fa- bulosis.	Satyrium Basilicum mas, Germani, freugblumen das mendle.
	Sonchus, vulgo cicerbita, aut rostrum porcinum, siue crispium, ex Dios. triplex est, lib. 2. cap. 123. quidam syl- uestrior & spinis magis hor- rens, Germ. Gens distel. alter tenerior sonchus arboris in- star latis constans folijs, cau- lem in ramos exeuntem fo- lia distinguunt. Tertium ar- borescit non multis est cog- nitum: alij in candidum & nigrum, alij edendo, alij nō edendo, alij in asperam, alij in leuē, esse dixerunt, ea- dem rei diuisione & signifi- catione.	In petris et asperis locis na- scitur.	Satyricum basilicum fœ- mina, freugblumen das weyble.
Pratis.	Satyrium trifolium ve- rum, siue testiculus vulpis, vulgo Stendelwurz / trifo- lium nomen habet propter tria folia. Satyrion autem,		Scabiosa maior & minor, Germani, apodem fraut. vtra- que p'anta nota. veteribus indicta Maio & Iunio ad O- ctobrim usq; florescit. Est & pseudoscabiosa legitima a- deo persimilis ut primo in- tuitu peritissimos etiam fal- lat, verum crassior tota est, nec amarescit, nec adeo hir- suta, plures alias species sca- biose ostendit. D. Fuchsius in postrema editione.
			Saxifraga, quam Romani sic vocant, ex Diosco. lib. 4. cap. 15. Saxiphagon, alij Saxiphagon, quidam em- petron vocant, Germ: stanz brech: herba epithymo simi- lis, hætenus Medicis non- dum est cognita, quam enim autores ostendunt, figura E- pithymi non respondet, pro- ea itaq; uti licet, vel pimpi- nella hircina, vel tormentil- la, aut

15
QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	IUNIO, SOL in Cancro.	LOCVS Natalis.	IUNIO, SOL in Cancro.
	la, aut herba S. Petri sic dicta, alij vtuntur radice raphani, vel nasturtij, aut raphani semine, siue aspleno, aut filipendula rubea. donec uera sese offerat.		bus spicati exeunt flores ex purpura albicantes. Ersi inquam Horminum non sit, posset tamen quis pro odorato Hormino vti Mathiolo placet, comode uti.
Pratis & aridis locis.	Serpillum duorum generum est. Dios. lib. 3. cap. 37. hortense odore samlicum imitatur, atq; in coronas ad di solet, legendum Iulio & Augusto mense, alterum est syluestre zigis appellatum, Germani, Felderquendel vocant. floret ferè tota æstate, legendum itaq; dum floret.	Integulis secusque parietes.	Semperuiuum siue sedum ex Dios. lib. 4. cap. 77. triplex est. Primum sedum maius, quibusdam Barba lovis (quæ Alcudem ex Plinio) dicitur, Germani, groß haußwurtz vocant.
Syluis & aquosis.	Stellaria, quam Fuchsius aliquando Leonis pedem vocauit, Germani: Synaw oder Leontropfen / folijs octangulis, quam supra pro Rubia tinctorum syluestri posuimus.	In Macerijs parietibusq;	Minus vulgo vermiculare, Germani, klein haußwurtz / quibusdam crassula minor, distinguitur in marem & foeminam. Mas florem gerit croceum, Maio & Iunio mensibus. Foemina albo flore spectatur.
Syluis.	Sanicula mas & foemina, Germani, Sanickeln vocant, mas folia habet vitis simillima, cum rubentibus maculis, foemina, eiusmodi maculis caret.	Parietibus	Tertium sedum gustu acerrimum est. omnia hæc genera donec florent colligenda sunt præcipuè Iunio & Iulio mensibus.
Campestribus & incultis.	Scarlea folijs hormino quadruplo maioribus & latioribus, subasperis crispis, humi accubantibus caule sesquicubitali, & quandoq; citato latiore hirsuto firmo quæ dranguloq; à cuius medio plures oriuntur rami, in qui-	Aridis et sabulosis	Spartion, falso quibusdam Genesta vocatur, Germani, pfrimen / colligitur circa Idus Iunij, frutex est sine folijs, & floribus constat alba violæ similibus.
		In aquis	Sion, Lauer & anagallis, aquatica latinis dicitur, officinis herba ignota, Germani, Wasserpungen / Bachpungen.
			E 3 Trifo-

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	IUNIO, SOL in Cancro.	LOCVS Natalis.	IUNIO, SOL in Cancro.
Pratis a- menis.	Trifolium odoratum, wörtschender flec. Trifolium pratense flori- bus, tam a bis quam purpu- reis Germ: wiscen flec. Tragopus, siue barba hir- ci, floribus purpureis, Germ: bochsbart / officinis pleriq; incognita herba. Primò il- lam vidimus in horto illu- strissimi comitis Ludouici Casimiri, de Hohenloe, pij defuncti.	Asperis & incul- tis.	ciarijs duplex, Mas profer- pens, & si caule sit dodranta- li, subrubro hirsutis folijs longiusculis, cum lanugine ad nigrum inclinantibus, flo- ribus purpurascens. Foe- mina folijs rotundis lanugi- noso, similiter caule flore melino ad purpuram vers- gente. Iunio mense colligen- da vtraq;.
Colitur apud nos in fctili- bus & hortis.	Tussilago latinis, Βάχιον græcè, vel Chamaleuce ex Myrepsò, officinis farsara, si- ue vngula caballina, flores Martio mense apud nos ap- parent, folia & radix ultra æstatem licet durant, colligi- mus tamen circa tropicum canceri.	Seruntur	Vicia germinant, folio mi- nore quam aphace, & tenui- ore quoq; caule, Germani, wiscen vocant, flore in pur- puram rubescens.
Iname- nis & in- cultis a- gris.	Tormentilla, Heptaphyl- lon, vocata à septenis folio- rum diuisuris, in quinq; fo- lij specie reponitur. Thlaspi alijs capsella, siue scandulaceum, vulgò sina- pis syluatica, duorum est ge- nerum, latifolium, & angusti- folium, Germani, Bawern: senfft / vocant præsertim pri- us, posterius autem Besem- freut / quod scoparum vices suppleat.		
Aridis & siccis lo- cis.	Veronica, Germani, Ehen- preyß / recentioribus simpli-		
In fossis & iuxta sapes.			

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS
Natalis.

IVLIO, SOL
in Leone.

Hortis.

A Sparagus officinis spa-
ragus, Germanis, spar-
gen, duplex hortensis
& spontaneus, solonatali dif-
ferentes, sylvestrem alij Cor-
rudam, Attici Orminum ap-
pellant, cuius meminit Di-
osco. lib. 2. cap. 117. quan-
& de altili verba fecisse con-
stat.

Montib.

Hortis v-
biq; col-
latur.

Apium hortense, erudito-
rum ferè omnium consensu
vulgare est petroselinum, id-
que probant ex Plinio lib.
20. cap. 11. & Gal. lib. 2.
alim. facul. cap. 52.

Palustri-
bus locis
gaudet.

Apium palustre & rusticū
latinis, Eleoselinon Diosco-
ridi, Germanis wasser epff/
oder epich / alij paludapium,
quod apud aquæ ductus &
in palustribus pueniat, folio
raro, nec hirsuto consistit,
sed simile quodammodo A-
pio est, odore, sapore, figura-
q; qd & officinæ hætenus,
pro vero apio usurparunt,
sed malè.

Hortis,
locisq;
hume-
tis pin-
guinis
busq;
gaugès.

Alcea, latinis Ibisus,
vulgò maluanisco, aut bo-
nausisco, siue bis malua, con-
stat folio malua, maiori ta-
men, pilosioreq; caule molli
flore melino, fructu malua,
radice nervosa albaq; gustu
malua, caulibus proxima,
Iulio & Augusto colligenda.

LOCVS
Natalis.

IVLIO, SOL
in Leone.

Campe-
stribus &
hortis.

Asperis
fabulosis
siccis &
conual-
libus.

Vmbro-
sis parie-
tibus.

In Ponto
& Cap-
padocia.

Alcea sylvestrium maluarū
generi assignata, quibusdam
herba Simeonis, Germani,
Sigmarstraut.

Amarantus, Helicrisus, si-
ue luteus, Germ. florum or-
tausentschön / Iulio floret, quo
tempore & colligendus.

Adiantum, cuius duo ge-
nera ex Theoph. 7. de hilito.
plant. cap. 13. candidum vi-
delicet & nigrum ex Diosc.
lib. 4. cap. 120. adianthon, si-
ne adiectione polytrichon
vocatur, nigro colore nitens:
officinæ adiantum, capillum
Veneris, polytrichon. calli-
trichon diuersis nominibus,
distinctas esse plantas putat,
cum tamen in vnum coinci-
dant, idemq; denotent. Diosc.
in Adiantum, quod plinius
candidū, alijs polytrichon,
quidam capillum Veneris
distinguunt, & Trichoma-
nen, quod Plinius nigrum
vocat, Germani candidum,
vocant Jungfrawhar / Ni-
grum autem Steinbrech.

Absintheum, quibusdam
Batypicon. Germani Werm-
muth / sunt verò tria præci-
puè genera, ponticum, Ma-
rinum, quod alio nomine
Seriphium vocant, est &
tertium

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE

LOCVS Natalis.	IULIO, SOL in Leone.	LOCVS Natalis.	IULIO, SOL in Leone.
In fanto- nia Gal- lia.	tertium quod Santonicum, à regione in qua nascitur, vo- catur optimum est Pōticum ob maiorem adstringendi vim. Est & vulgare absinthium nostrum, Matthiolus à Pon- tico alio discrimine differre non censuit, quàm quod pro- prio clymatis munere, no- strate minus est, adstrictori- um autem magis: In fine Iu- lij mensis legendum.		Buglossum vulgare folio est boragine longiore, hirsu- to aspero, minutissimis acu- leis scatente, flores edit pur- pureos Boragine minores. huius species aliquot obser- uantur, vnum hortense, & duo sylvestria.
Iuxta se- pes pas- sim na- scitur.	Anchusa, quam rurales Buglossum sylvestre vocant, alijs Calyx aut Onoclea, Germanis, rot edhsenzungen appellatur, æstate florida. Matthiolus aliquot species ostendit.	Hortis colitur.	Botris, Germanis, Trau- ben fraut. Botrys à semine qd racematim ramulis ad nasci- tur. Amathus Botrym ac Ar- themisiam vnicaulem, vnā & eandem plantam esse exi- stimat, Apollo Franciscus negat.
Campe- stribus & lato solo nascitur	Anethum Dioscoridis, fo- lio & flore vsq; adeo fœnicu- li æmulo, ut oculis illudis, gustu atq; odoratu interno- scatur, semine tamen mino- re, in fine mensis Iulij colli- gendum.	Campe- stribus.	Blattearia, passim hæc na- scitur folijs oblongis p am- bitum serratis, floribus lu- teis, & similis est Verbasco, quæ sæpe fallit pro ea capta.
Hortis se- ritur & spontè fœniculi modò puenit.	Buglossum ex Dioscori- dis historia lib. 4. cap. 112. nihil aliud est quàm vulga- ris & hortensis borago, Ger- manis, Borretsch / a boum linguis, quas folia eius imi- tantur lingua bubula voca- ta, longitudine, asperitate, latitudine uè. Iulio mense col- ligitur.	In Aruis & mon- tibus.	Cnicus officinis Cartha- mus, vulgo crocus Saraceni- cus, duo genera ex Theopha- sto notantur, 6. de historia plant. cap. 4. sylvestre nimis rum & urbanum. Sylvestre duplex, vnum mitius, & Cnico satiuo similius, hoc proprie græci Attractylida, latini verò fusum agrestem, aut colum rusticam, nomi- narunt, hæc Attractylis Au- gusto mense legenda. alte- rum sylvestre genus densum est, caulesq; soncheos pro- fert, quod officinis omnibus &
Hortis fa- miliaris- simum, cæpestri- bus & fa- bulosis.		Hortis passim colitur.	

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	IULIO, SOL in Leone.	LOCVS Natalis.	IULIO, SOL in Leone.
	& vulgo Cardo benedictus nuncupatur, Germani, Besegnerer distel/ oder Bomwurz. In fine Iulij mensis maturum, nisi quod eius semen Augusto ad maturitatem peruenit.		bos est magnitudine praestans, folio non absimili fanu graeco, ut testatur Theoph. lib. 3. de hist. plant. cap. 7. cultam aliquoties vidimus in horto Illustrissimi comitis Ludouici Casimiri de Hohenloe, principio Iulij ad maturitatem peruenit.
Inter linum & Epithymum crescit.	Cassutha vel cuscutha, germani, flachs seyden/filtzfraut/ herba est in modum capillamenti, spinis ac plantis inuoluta, sine folijs, paruo tamen ac albo flore.	Scrobiu aggerib' & lecus vias.	Chondrylla, quam aliqui cichorion, alij serin appellant, ex Dios. lib. 2. cap. 25. caulem flores & folia cichorio similia habet, verum tenuior tota est, Germani, vocant flein sonnen wirbele/ aliud Chondrilla genus habetur, folium ferens longum circumrosum humi ipsarum, caulem succo madentem lacteo, radice tenui rotunda, leui, vegeta flauescente. Germ. hasenstrauch.
Humidis circa fluentia.	Centum morbia, sine numularia. Germanis. pfennigfraut.	Nascitur in latis & cultis.	Calamintha, officinis calamentum, ex Dios. lib. 3. cap. 24. quaedam montibus familiaris, altera pulegio similis est, Nepeta à latinis vocitata. Tertia menthaistro cognata, huius omne genus à latinis Nepeta contuse appellatur: officina nostrae videntur, tertio genere menthaistro propinquo. vbi verò vtriusq; scribitur, herbam gattariam secundam speciem addunt.
In glabris montibus & in syluis puenit.	Chamaleon albus, Germani, Ebertwurz vocant, folia habet silybo, aut scolymosimilia, asperiora acutiora, nigroq; chameleone validiora, caulem non promit, verum ex medio spinas echini marini, aut Cinaræ modò erigit, flores purpureos. Iulio & Augusto mense colligenda.		
In caepitibus siccis & cliuosis tractibus & maritimis.	Chamæleon niger, Germani schwarz Garten distel/ folio ferè scolymo similis, minora tamè, tenuioraq; ac rubro distincta videntur, caule dodrantali, in vmbella flores spinosos, versicolores, hyacinthi æmulos.	Secus vias semitasq; caepitres agrorum & fossarum marginibus.	
Hortis colitur.	Coluthea, siue colythea, Germani, Welsch linsen. ar-		

F Cala-

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	IULIO, SOL in Leone.	LOCVS Natalis.	IULIO, SOL in Leone.
Solo inculto nascitur: & circa piscinas stagna, aquarum scatebras & labra eorum exurgunt. Prope urbium & oppidorum montibus et incultis.	Calamintha aquatica alijs sifymbrium, officinis Bala-mita dicitur, German. Bach-mintz/est & sifymbrium Cardamine officinis, Nasturtium aquaticum, Germani Brun-na fress/ colliguntur Iulio & Augusto mensibus, haec & aliae species sifymbrij. Cicuta latinis & officinis, Conion graece, Germanis, Schirling oder wütterich, vulgaris notitia est planta, Iulio flores & semen profert, quo tempore legenda. Cruciata à D. Fuchsis sic appellata, quod eius radix in modum crucis transfossa sit Germani, Creutzwurtz/ vocant, haec magnam cognationem cum gentiana habet. Digitalis Fuchsis, Germani fingerhut/ duum est generum, vnum floribus purpureis, alterum, floribus luteis, vtraque genera vidimus flores in sylua non procul à Thermis cellensibus mense Iulio, quo tempore colligenda sunt.	Altis montibus, inuenimus non procul ab Hala Sueuorum.	Tertium assignatur genus folijs Coriandri, Germanis, Schwarz hirtzwurtz/ probatissimum creticum: idque in myropolijs omnibus, vulgatae sylvestris pastinacae nomine, Dauci omnis usum obtinuit, idem tamen non sunt Daucum & pastinaca sylvestris. Diftamnium cretense aliquibus sylvestre pulegium, leuis pulegio similis, sed maioribus folijs, quae tomento quodam, spissaque lanugine pubescunt. Dioscor. metitestate & autumnus. vsus foliorum, non ramorum nec fructus. Est & pseudodiftamnium, de quibus lege Dioscor. lib. 3. cap. 32.
Montibus umbrosis & saxosis locis.	Daucus ex Dioscor. lib. 3. cap. 67. aliqui Daucium vocant: triplex est creticum folijs feniculo simile, Germani, Berzwurtz/ aut Bermütter/ aliud genus sylvestri apio simile, Germani, weiß hirtzwurtz/	Humidis iuxta rivum aquarum & fontes.	Dipsacus, alijs Galedragon siue labrum Veneris de quo Dioscor. lib. 3. cap. 12, Germanis farten distel/ duum est generum, vnum sativum, quod a villonibus in hortis plantatur. Germ. Weberfarten/ alterum sponte passim nascitur, floribus purpureis, Iunio & Iulio potissimum carpitur. Dracunculus maior & minor: maior habet caulem rectum lauem, duum cubitorum, baculi crassitudine, versicoloribus draconum maculis, purpureis tamen eminentibus folia rumicis sibi inui-

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	IVLIO, SOL in Leone.	LOCVS Natalis.	IVLIO, SOL in Leone.
Nascitur in sepib ⁹ vmbro- sis vterq;	inuicem implicita: minor folio constat haderaceo, ma- gno, candidis notis insigni caule recto bicubitali, verli- colore, maculis resperfo pur- pureis, ita ut anguem planè referat. Colligitur vtraque mensis tempore, ex quibus succus exprimitur.	Campe- stribus inculto solo.	noribus multò, luteis floris bus. Est & Erigeron maius, à quibusdam flos Sancti Ia- cobi dictus. floret Iulio & Augusto mensibus.
Hortis ut etiã vmbro- sis locis pro- uenit.	Enula campana vulgo, a- lijs Helenium, duplex ex Dio- sc. lib. 1. cap. 26. vna habet folia verbasci angustioris fo- lij, asperiora, oblonga. alte- ra aegyptia quæ nobis incog- nita est. Germani Enulam vocat alat wurg.	In riguis et scrobi- bus.	Equisetum, officinis cau- da equina duplex est ex Dio- sc. lib. 4. ca. 42. vna longior, asprella vulgò dicta, aspera sanè, ad tergenda vasa vilita- tissima, altera breuior, huic negotio minus apta.
Circa vi- neta scrobium q; mar- gines, lo- cis etiam motosis copiosis- sima.	Eupatorium, ex Dios. lib. 4. cap. 33. fruticosa herba est. Germani, Odermenig / Italis Agrimonia.	Iuxta vr- bes rude- ra hor- tosq; na- scitur.	Erysimum latini Irionem vocant, Germani Hederich oder wilden senfft / vulgò ra- pistrum, folijs cruce sylue- stris. per integram ætatem floret, legendum in fine mē- sis & principio Augusti.
Campe- stribus.	Est & Eupatorium vulga- re, quo hætenus officinæ pro- Dioscoridis Eupatorio vsur- parunt, verum haud rectè, estq; meo iudicio Ageratum, potius Dioscoridis, quamuis à nobis dissentia Andreas Marinus, ut de eo latius in libro, de delectu purgantium medicamentorum nostro, supra Mesuem scripsimus.	Nascitur sepibus, parietib ⁹ et vinetis	Elxine, officinis parietaria, Germanis tag vnd nacht/ oder S. Peters kraut / in fine Iulij mensis colligenda.
In mace- rijs circa oppida.	Erigeron sine Senecion, Germanis grindt kraut / folijs continuis per extremitates cruce modo dissectis, sed mi-	Seritura- liquando spote in- ter sege- tes nasci- tur.	Eruum latinè, Orobum græcè ex Dios. lib. 2. cap. 191 angusto folio, tenuis, semen in valuulis habens, hodie ab officinis nō cognoscitur, olim erat vulgaris hac plan- ta in boum saginâ, quidam cicerulam. Caleno Lathy- rum, alij eruiolam, non- nulli vitiam, plures semen quoddam ab Alexandria al- latum vitia simile putarunt, quidam lolium, alij alia

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	IULIO, SOL in Leone.	LOCVS Natalis.	IULIO, SOL in Leone.
	somniarunt. Est porro aliud satiuum quod album dici- tur, alterum sylvestre, idque ruffum, Iulio mense matu- rum.		floris seminisq; , estq; hoc mitissimum.
Hortis feritur.	Fœniculus latinè, græcè μαγὰρρον, Germanicè, Fen- chel / colligitur caule turgē- scente, salua vitali, Iulio præsertim mense.	Hortis et fictilibus	Hysopus, duum est gene- rum montanum et hortense, Germani Zspen/ floret Iulio & Augusto mensibus, quo tempore etiam colligenda.
Campe- stribus.	Geranium sextum, cuius flores sint purpurei, radix in- trinsecus, & extrinsecus ruf- fa, Germanis, Storck schna- bel.	In hortis iucundū spica & lauanda spirant odorem.	Lauandula, alij Lauanda, etsi sub genere Nardi repo- nitur, longè tamen distat vi- ribus à spica, siue Nardo cel- tica, Romana etiā dicta, quā Germani Spicanardi vocāt, ea enim iucundi odoris, est radice numerosa, coharens, plena, nec fragilis est. Lauen- dula autem grauis est odoris, balneis & lauacris expetita, floribus potissimum, ramis, folijs, cauli, & radicibus nul- lus vsus, folio est crassiore robustiore, colore in cano, flosculis cæruleis vel purpu- reis, ideo hæc pseudo nardus dicta est.
Gignitur incultis & aspe- ris locis.	Hypericum vulgò perfo- rata, alijs herba S. Iohannis, Iunio & Iulio mensibus au- reis floribus ornata, ex Dios- alij androsomon, alij ca- chion, alij chamepitim ap- pellant.		Lactucarum, varix sunt species ex Theophrast. 7. de hist. plant. cap. 4. varijs etiam nominibus insignitæ, alia e- nim crispa, rotunda, quæ Iu- lio & Augusto mensibus magnam habet gratiam, tam in acetarijs, quam in fer- culis. Alia est capitata à fo- lijs suis, quæ ubi à terra pa- rum attolluntur, mali cuius- dam
Interrui- nas an- tiquis muribus	Hyosciamus siue Apolli- naris herba, quibusdam Al- tercus, officinis barbarè Ius- quiamus, ut & pleraq; alia nomina, ignorantia græci & latini sermonis corrumpūt. ex Dios. lib. 4. cap. 59. trium est differentiarum, primum floribus purpureis ferè, se- mine nigro, alterum semen subflauum flore luteo. ter- tium genus, quod in vsum medicum venit, pingue la- nuginosum molle, candidi	Hortis et agris cul- tis.	

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	IULIO, SOL in Leone.	LOCVS Natalis.	IULIO, SOL in Leone.
	dam speciem rotundam ob- tinent, instar Brassicae capita- tae, Germani, grosser laticch oder weisser laticch / & hac Iulio mense floret & semen profert.	Saxis & aspergis nos per tris adhe- ret ut mu- scus.	Lichen, græcis pariter atq; latinis, Hepatica officinis, Germanis, stein oder braunn leberfraut / aliquibus Bryon appellatur. Iulio mense ea est decerpenda.
In aruis & vinea- rum hor- torumq; macerijs nascitur.	Lactuca sylvestris, germa- ni, wilder laticch / spinulis in- horrescit, folijs laciniatis serratis, & per oras aculea- tis, hacq; non citra errorem, pro officinarum endivia v/ surpatur, succo enim acri ac medicato abundat.	Incultis asperis et editis lo- cis.	Lithospermon, officinae Miliium solis, aliquibus Mi- lium soler, à loco quo nasci- tur rectius denominatur, Li- thospermon à seminis duri- cia nomen accepit. Est & a- liud milium solis minus à seplasiarijs appellatū, quod pro iuero Lithospermo non erit vtendum.
Montib; asperis et incultis.	Lonchitis prima, ex Dios- lib. 3. cap. 144. folia habet porri latoria, rubentia, plu- rima ad radicem circumfra- cta, veluti in terram procum- bentia, pauca in caule, in quo flores ceu galericuli, &c.	In seges- tibus.	Lagopus, Germani, hasen/ fuß / oder hasen pfödle / nasci- tur.
Syluis ac mōtosis locis.	Lonchitis altera, quam a- lij asperam lonchitin appel- lant, folia scolopendrij emit- tit, sed asperiora maioraq; ac multò magis diuisa. hanc primò mihi ostendit doctus adulescens Ioannes Hesch ⁹ , medicinae ac rei herbariae stu- diosus Tubingæ, quam ex Martiana sylua secum attu- lerat.	In cam- pestribus cultis vi- netisq;.	Mercurialis ex Dios. lib. 4. ca. 169. Linozostis, quibusdā parthenion, alijs hermisbo- tanion appellatur, eo quod à Mercurio inuenta sit, cre- ditur, est autem duplex mas & foemina. In fine Iulij col- ligenda, aut principio Au- gusti.
Campe- stribus.	Linaria officinis, Osyris græcis, flachsfraut oder harn- craut Germanis, Iulio, Augu- sto & Septembri mensibus floret.	Nascitur propè æ- dificia, ruinas & rudera.	Marrubium, cuius duo genera Theophrast. 6. de hist. plant. cap. 11. cōstituit, aliud folio herbido, serratori, in- cisurisq; profundioribus, al- terum rotundius, squalensq; vehementer, incisuras habes obscuriores, minusq; ferra- tum, estq; hoc aliud nihil, F 3 quàm

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS
Natalis.

IVLIO, SOL
in Leone.

LOCVS
Natalis.

IVLIO, SOL
in Leone.

Colitur
fistilibus
& virida-
rijs.

quam Ballote siue Marrubiū
nigrum Dioscoridis quod
Germani *schwarzen andorn*
vocant, alterum verò Mar-
rubium candidum, Germ:
weissen andorn / colliguntur
Iulio potissimum mēse am-
bo genera.

Maiorana vulgò. *Sampsu-*
cus & *Amaracus* grecis, exi-
mia odoris gratia supra aedi-
um fenestras in atrijs, cēna-
culis, ac viridarijs passim co-
litur, perpetua uiret coma, à
frigoris inclementia asserua-
ta, per terram non repit, etsi
ita statuatur Dioscorides, colli-
gitur circa finem Iulij men-
sis, & principio Augusti.

Malua ex Diosc. lib. 2. cap.
110. duplex est. satina, esui
longè aptior & sylvestris,
Germani *pappeln* vocant,
quæ in fine Iulij mensis &
Augusti principio colligen-
da, quo tempore etiam flo-
rent.

Hortis
colitur,

Malua arborea, quibus-
dam Romana appellata, ea-
que Coburgi in horto De-
cani, ac alibi arboris instar
visitur, dicitur enim arbore-
scere, mensibus senis aut se-
ptenis. Aëtius *deidramala-*
chen, Galenus *anadendro-*

In aruis
sponte
nascitur.

Inter fru-
menta.

malachen vocat, 14. metho.
floribus quàm maximè Iu-
nio & Iulio abundat.

Melanthium, quæ & Gi-
thon. officin. *Nigella*, quod
à semine nomen nactum est,
dicitur. duum est generum,
Satium & sylvestre. *Sati-*
uum exilibus surculis fruti-
cat, sæpe binos dodrantes
excedens, folijs ut *senetio-*
nis minutis, sed multò tes-
nuioribus capitulo in cacu-
mine tenui paruo, ceu *papa-*
ueris, oblongo intercuran-
tibus intus membranis. *Fu-*
chsius tria *hortensia* ostendit,
quorum duo habent se-
mina nigra, vnum Germani
schwarz fōmich / alterum,
schwarz Coriander vocant.
tercium *Melanthium citri-*
num, quod semen eius sit
subflauum.

Sylvestre *Melanthium*,
Germani *wild schwarz Cori-*
ander / quod *Fuchsius* videtur
potius esse tertium genus
Cumini sylvestris, *Matthio-*
lus duo sylvestria pingit.

Est & *pseudomelanthium*,
quod olim pro *Lolio Fuch-*
sius signauerat.

Origanum ex Diosc. lib. 3
cap. 28. triplex est, aliud
Hera-

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	IULIO, SOL in Leone.	LOCVS Natalis.	IULIO, SOL in Leone.
	Heracleoticum, quod & Cunilam vocant, Brassauolus id commune Origanum, in pres, sen- campestribus paisim obo- tes, colles riens, heracleoticum esse re- et fossarū tulit. Matthiolus negat & margi- sylvestre facit, Franciscus A- nes penē pollo Alexander vir doctissi- ubiq; naz mus, neque heracleoticum, scitur neque folijs Hyssopi, neque Cōmune sylvestre Dioscoridis, esse Origanū scribit, sed pro secunda spe- cie, ex tribus à Plinio depi- ctis lib. 20. cap. 17. ponit, & pro legitimo statuit origa- no.		rum, mittel basilien / pri- mum, groß basilien.
	Origanum alterum est oz- nitis. Tertium est Tragoriga- num.		Phyllitis, falso scolopen- dria, siue lingua ceruina, di- citur Germani Hirszunga / folia promit rumici similia, longiora & viridiora, sena aut ieptena, recta, quæ parte anteriore læuia cernuntur, à tergo autem pensiles, quasi vermiculos tenues ollen- dunt: ex quibus apparet phyllitim longè differre à Scolopendria, siue aspleno, quam aliqui Hemionium vocant, folijs est multis sco- lopendræ animal, similibus ab radice vna prodeunti- bus, folia polypodij mo- do diuiduntur. subter fla- uescentia, hirsutaque, sus- pernè viridia. vtraque plan- ta Iulio & Augusto colliz- genda.
Seritur et colitur in hortis & facilis bus.	Ocymum triplici habetur differentia, primum folijs mercurialis, helxine, aut a- maranthi emulis, crassis, la- tis, longiusculus, vulgò rus- ticum basilicum dicitur. Se- rapioni, non Caryophyllas- tum. Dioscoridi lib. 2. cap. 134. Ocymum simpliciter. Secundum, folijs exit à ra- mulis dicto longè minori- bus. Tertium folijs minu- tioribus atque angustiori- bus. cæteris incundiorum es- flans odorem. Germani hoc vocant, flein basilien / alte-	Parietib ⁹ saxis sili- ceis & opacis.	Peucedanum, alijs fœni- culum porcinum, Germani Harstrang.
	Montib ⁹ opacis et pratis hu- midis In vligi- nosis lo- cis et pro- pè semi- tas.		Potentilla, Germani Gen- serich / herba agrimonie non dissimilis, cauliculos pro- fert qui humi repunt, pilo- sellæ modo, floribus au- reis.
			Perz

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS
Natalis.

IULIO, SOL
in Leone.

LOCVS
Natalis.

IULIO, SOL
in Leone.

Arenosis
& aruis.

Perfoliata, Germ. durchs
wachs.

Palustri-
bus & a-
quosis.

Potamogeton, foliū habet
betæ simile, hirsutum paulu-
lum supereminens, extra a-
quam Germani, saum frant.

Inter se-
pta fre-
quens.

Phu, vulgo Valeriana,
quibusdam Amantila, aut
herba Benedicta, aliqui syl-
uestre Nardum vocant, Ger-
mani Baldrian / Est verò a-
liud magnum, aliud minus,
tertium exiguum.

Collibus
& monti-
bus abun-
dat pos-
simum.

Polium ex Diosc. lib. 3. cap.
105. duplex est. montanum
cui Teuthrion nomen est, alij
polium maius, cuius est v-
sus, alterum fruticosius, non
vsq; adeo valens, odore &
viribus infirmius, hoc ab a-
lijs polium syluestre dicitur.

In hortis
et vineis.

Portulaca officinis, An-
drachne græcis, Germ. Bur-
zelfrant / est verò alia hor-
tensis, alia sylvestris. Iulio
potissimum mense carpen-
da sunt, folia portulacæ.

Petrosis
& incu-
tis.

Papauer sativum, græcis
μικρον κικονος, Germ. mag sa-
men / duplex est, candidum
& nigrum, Iulio & Augusto
colligendum.

In hortis
satū pro-
uenit.

Pimpinella, rectius Bipi-
nella, quibusdam Solbastrel-
la, alijs sanguisorba dicitur,
Germanis pineln / æstate vs-
que in autumnum florescit,

Montib;
saxosis et
opacis.

Hortis
plātatur
ac seritur

tam maior, quam minor Bi-
penella: maiorem siue san-
guisorbam maiorem, mino-
rem, sanguisorbam mino-
rem vocat Matthiolum, vtra-
que hirci odorem præfert
Est & Bipenella Saxifra-
ga.

Petroselinum Macedoni-
cum ex Diosc. lib. 3. cap. 62.
prouenit folio apio aquatico
simili, sed minoribus, caule
crasso, ramoso, floribus al-
bis, semine ammi, odoratio-
re, sapore acri, aroma olente,
errant itaq; plurimum qui
vulgare petroselinum à Ma-
cedonico nihil differre scri-
bunt. Est & Hipposelinon
herba ea quam Fuchsius fal-
so Smyrnion vocauit, Ger-
mani libstüchel.

Mas in
câpeltis
b^o cōmu-
nib^o vijs
adistio-
rū areis
vbq; sca-
tet. fami-
na pau-
cis agnos-
citur.

Polygonum, vel sangui-
naria quibusdam centum-
nodia, nomen equiseti tri-
butum. ex Auicenna 5. col-
lect. vulgò Corregiola, ex
Diosco. in marem & fœmi-
nam distinguitur. Germani
Wegdnit gras / vtuntur mare-
duntaxat, utpote viribus effi-
caciore.

Persicaria, quibusdam hy-
dropiper, Dioscoridis. Ger-
manis, slochfrant / à recentio-
ribus in duas species distin-
guitur, in non lituram &
alteram

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE

LOCVS Natalis.	IULIO, SOL in Leone.	LOCVS Natalis.	IULIO, SOL in Leone.
	altera cui folia infunt pullo colore signata, quasi oculi pupillam praefereant, flore purpureo. Iulio & Augusto mensibus colligenda.	Capestris b ^o et sub urbijs. In locis siccissimis calidis dissimisque.	quo tunc semen erit demetendum, herba vero ad usum medicum dum floret. Est & Ruta sylvestris, Germani Maurrauten vocant. Tertio habetur Ruta montana, provenit.
Montibus & hortis platur.	Pyrethrum ex Dioscoridis lib. 3. cap. 69. Romani saluarem vocant, floribus est chamamelines non anethi umbellae, ut scriptum reliquit Dioscoridis. Germani Bertram vocant, herba colligenda circa finem ferè Iulij. Radix autumno quibusdam effoditur, nos vero Iulio cum adhuc est succo plena.	In montibus & palustribus ne dum etiam pratensis midis.	Scordium folijs triflaginis maioribus, non sic in ambitu diuisis, aliquantulum alba redolentibus quadrangulis caulibus, subrubro flore, visitur haec planta & apud nos non procul ab Hala Sueuorum, prope Geyslingem montem.
In montibus alxis & saxosis.	Parmica graecis, Sternutamentaria latinis, Germanis wilder Bertram. Rusticis oliueta vocatur, à similitudine foliorum, frutice surculaceo, abrotani amulo flore, capitulo chamamelis deflorescentis instar.	Campestribus.	Spina alba, graecis Acanthaleuce apud Dioscoridis lib. 3. cap. 12. hodie plerisque pharmacopoeis incognita herba est, uti pro ea hodie non incommodè quis posset, quod ab alijs lactaria herba, siue Carduus Maris, Germ. sechdistel appellatur, siquidem ea ad omnia praestat, quae in Acanthaleuci à Dioscoride describuntur, non dicam quod notis quibusdam huic accedat.
Gignitur in muscosis petris & in agrestibus quercu truncis.	Polypodium, siue filicula quibusdam glycyrrhiza sylvestris dicitur, praestantius est, quod arboribus glandiferis innascitur. herba est filicis similis subhirsuta, incisuris diuisa, non tamen adeo tenuibus.	Nascitur in montibus & syluis.	Alba spina latinis, Graecis Leucacantha, & haec quae nascitur, hoc est quibus folijs, quod caule, flore, ac semine proveniat, ne hodie quidem constat inter medicos.
Hortis feritur & platur.	Ruta hortensis, Germani Raute / floret Iulio, cognitu haec facillima est. Autumno maturescit semen,		Symphiton, quibusdam G Alo,

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	IULIO, SOL in Leone.	LOCVS Natalis.	IULIO, SOL in Leone.
Petrus na- scitur.	Alo, officinis consolida ex Dios. duplex est, primum pe- treum, nascitur ramis tenui- bus, Origanosimilibus capi- tulis thymi, lignosum, totum odoratum, gultu dulce, sali- nam ciens. Alterum Sym- phiton, pecton alij vocant Germani groß waltwurz / id caulem emittit bicubitalem, colligenda circa finem men- sis.	Nascitur in monti- bus & asperis.	Thymelea, ex qua granum Cnidium, quod est semen i- plius colligitur, huius folia, quæ peculiariter Cneoron appellatur, per menses colligi deben, & siccata in vmbra recondi. Cæterum obiter hic notandum, quod Arabes, Thymeleam & Chameleam confuse Mezereon appella- runt, Germani, chameleam vocant Seytlandt / Thymelea autem fert granum siue se- men, quod officinæ Coccum Cnidium appellant.
vmbro- sis et opa- cis.	Smilax aspera, alijs hedera spinosa, siue Rubus ceruinus nominatur, folia habet peri- clymeni aculeata, arbores scandit, Germani Scharpff winden.	In tenui solo & as- peris locis hor- tis siue na- scitur ac feritur.	Thymbra græcis, Satureia, vel cunila latinis, ex Diosc. lib. 3. ca. 36. vulgaris notitiæ est. duum est generum, hor- tensis & sylvestris. primum Germani saturon, Hünersfüß/ oder Joseplen vocant, alte- rum feldt quendel oder fänle/ qd Columelle gustu acrius & odoratior est.
Sepibus.	Smilax Ixuris, folia hede- ra similitudinem habent, molliora, leuiora, tenuiora, nullis horret spinis, colligun- tur folia in fine Iulij, & prin- cipio Augusti, folia enim per autumnum decidua sunt.	Nascitur in Aman- to Cilitie monte et in multis etiã Ger- manie monti- bus as- peris et petrosis.	Tordylon siue Tordylion, latinis Sefeli creticum, Pau- lus agineta Gordylion, Ger- mani Berwurz vocant, her- ba est surculosa, semine du- plici, rotundo, scutorum ef- figie, odorato, subacri, ad- fertur ad nos hodie Malsi- liense odoratum, amarum, oblongum, cum latitudine carnolum, Iulio mense Tor- dylon
Petrus.	Saxifraga lutea, Germani gelb steinbrech.		
Saxosis & petris.	Strutium, siue saponaria, Germani seyffen kraut / in fi- ne Iulij mensis.		
Hortis nascitur, & vine- tis.	Salvia, siue elelisphacos, Germani Salney / duum est generum, maior & minor, vtraq; fruticosa, spicato flore Iunio & Iulio mensibus ap- paret.		

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE

LOCVS
Natalis.

IVLIO, SOL
in Leone.

dylon floret, ac semen subin-
de profert.

Telephium, vulgò crassus
la maior, quidam fabariam
vei fabam græcam, à folio-
rum, quam cum faba ha-
bent, similitudine nominât,
Germani wund fraut / oder
fnaben fraut / Dios. lib. 2. cap.
ultimo, duo genera facit v-
num floribus candidis, alte-
rum luteis. Fuchsius tertium
ostendit floribus purpureis.

Matthiolus pro Thelephio,
Chelidonium minus osten-
dit, quod videlicet in Tele-
phio illo, Dioscoridis non
insit facultas illa exiccandi
& detergendi, Franciscus A-
pollo, Matthioli sententiam
negat, & eiusmodi vires Te-
lephio tribuit.

In mace-
rijs ac
septis.

Vrtica nulli non cognita
solo tactu, suoq; igneo prur-
ritu. non modo interdiu, sed
etiam noctu, vellicat enim,
pungit, & suo morsu sensum
laccelsit, Germani vocant
Kieffel / ex Diosco. lib. 4. cap.
79. duo genera describun-
tur. vnum satium, quod
Romanam vel græcam vrti-
cam nominant, caule rotun-
do, asperrima, nigricantibus
folijs, semine limi æmulo al-
terum genus sylvestre est,

LOCVS
Natalis.

IVLIO, SOL
in Leone.

cuius tres obseruantur spe-
cies, vna aspera vrtica appel-
latur nigrioribus, folijs hirsu-
tiore caule, semine limi, sed
minore, altera, minus aspe-
ra, minuto semine, vulgaris
est hæc. tertia Canina nomi-
natur, minor licet cæteris sit,
acrior tamen & mordacior
est, cuius semen accipiat,
non refert, Iulio mense ad
maturitatem perueniunt.

Vrtica Cardiaca dicta,
Germani herzgspar vocant,
floribus galioplis, folijs vr-
ticæ non dissimilibus, offici-
næ quædam Brancham vrti-
cam vocant.

Verbenaca græcis, ex Dios.
lib. 4. cap. 51. peristereon,
latinis columbaria vocatur,
alijs sacra herba, quoniam
multum ad amuleta expia-
tionesq; commendatur, diuis-
ditur in rectam & supinam,
Maremq; & fœminam. Re-
ctam Fuchsius marem vo-
cat tribuit, huic flores luteos,
supinam fœminam esse scri-
bit, floribus purpureis, Ger-
mani vtrinq; plantam cysen
fraut nominant. colligi de-
bent potissimum fœmina,
circa canis ortum, hoc est
mense Iulij, quo tempore
floreant.

G 2

Ver-

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS
Natalis.

IVLIO, SOL
in Leone.

In subur-
bijs vbiq;
& circa
parietes.

Verbascum, vulgo Tapsus
barbarus ex Diosc. lib. 4. cap.
89. differentias summas du-
as habet, nigrum & album,
in quibus mas & foemina in-
telliguntur. Mas candidum
weiß wullefraut/ das mende/
Germani vocant, Foemina,
nigrum appellant, schwarz
wullefraut/das weible / cuius
aliquot numerantur species,
distinguunt quidam in do-
mestica & sylvestria. legenda
genera Verbasci Iulio, quo
tempore florent.

LOCVS
Natalis.

AUGVSTO,
Sol in Virgine.

In aquo-
sis incul-
tis aspe-
risq; lo-
cis.

In hortis
siccis &
lapidosis

In aqua-
ru ripis
vinearu
aggerib.

Salvia
passim
feritur ac
platur
in hortis
germa-
niae.

Sylvis &
vmbro-
sis.

Nascitur
ac feritur
in hortis.

ARthemisia, Germani
beyß/ duplex est, vna
latior habitiorq; fo-
lijs, siue ramosa & fruticosa,
quae hodie nomen in offici-
nis retinet. altera ramosa
quidem, sed non fruticosa,
qua Fuchsius Matricariam
appellat, cuius sententiam
Matthiolus refutat hac, ut
scribit Dios. lib. 3. cap. 110.
constat flore paruo, tenui,
candido graecolente, aestate
flore. Est & tertium genus
tenui folium, quod Fuchsius
Tanacetum esse putat, huius
opinio ab eodem Matthio-
lo improbat.

Angelica, Germani pestis-
leng wurtz / vna hortensis,
quae cubitalem altitudinem
excedit, caule geniculato,
inani, multis alarum cauis
referto, folia profert oblon-
ga, per ambitum serrata, in
nigrum virescentia. Sylve-
stris pumilior est, sed viribus
omnium praestantissima, Ger-
mani vocant Angelik / oder
des heyligen geist wurtz / oder
brustwurtz.

Ammi, cuius genituo am-
meos, officinae virtutur, athio-
picum cuminum appellant,
Germani Amey, vulgo no-
tum.

Ama-

LOCVS Natalis.	AVGVSTO, Sol in Virgine.	LOCVS Natalis.	AVGVSTO, Sol in Virgine.
Hortis et fagilibus	Amarantus purpureus, Germani florumor.	cat, Germani holzmangolt/ de quo supra diximus in mente Iunio.	
Incoltis et asperis locis.	Ascyron siue ascyroides hyperici genus est, magnitu- dine distans fruticosius mai- ores habens ramos surculo- siores, rubentesq; folia te- nuia, Germani hart hew vo- cant.	Campe- stribus.	Blitum, fatuum & insipi- dum olus, quod Gale. lib. 2. alimēt: facul sic vocat. Ger- mani Mäyer / floret æstate & autumno, Augusto mense carpitur.
In mon- tibus sa- xosis.	Asclepias, germ. Schwal- ben wurz / ramos emittit lon- gos: folia hedera longa, er- rant hi, qui pro ea Hedera terrestri videntur. pro Ascle- piade Fuchsius Vincetoxi- cum ostendit, cui Franciscus Apollo vir doctissimus as- sentitur.	Hortis passim pueniūt.	Brassica vel caulis ex Dios- lib. 2. cap. 1 & 2. diuiditur in satiuam et syluestrem, satia quæ æstate propter amaritu- dinem non æstur, acris enim est, à Plinio lib. 9. cap. 8. & ante ipsum Theophr. lib. 7. hist. plant. cap. 4. in tres spe- cies diuiditur, nempe primò lauem, quam germani brey- ten oder grossen feel vocant, alteram Crispam, germani trausen feel / tertia crambe, germani fleinen feel.
In colli- bus mon- tibus al- tis & syl- uis.	Aster Atticus, Bubonium, græcis, Inguinalis latinis, of- ficinis ignota herba, Stern- fraut germanis, Augusto & Septembri mensibus colli- genda.	Mariti- mis præ- rūptisq; locis fre- quens.	Brassica syluestris, candi- dior hirsutior & amarior, q̃ satiua de qua Theophr. 7. hi- sto. plant. cap. 6.
Hortis seritur.	Beta ex Dios. lib. 2. ca. 15 in candidam & nigram di- stinguitur. Candida in om- nibus efficacior quàm nigra, hanc siculam, vel siclan, Theoph. autore lib. 7. de hist. plant. cap. 4. appellarunt, Germani mangolt / colligen- da Augusto.	Mariti- mis locis	Brassica Marina, officina soldanella, folijs Aristolo- chie rotundæ prælongis, ut Dioscoridis textus habet, o- mnia hæc genera Augusto mense potissimum florent.
Syluis.	Beta syluestris, inter acy- leata numerat Theoph. 6. de hist. plant. cap. 3. Plin. lib. 20 cap. 8. hanc Limonium vo-	Seritur et platur in hortis.	Balsamina siue viticella, planta prælongis tenuibusq; viticulis est, vltro citroq; re- plantantibus, prælimas tū plan-

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	AUGUSTO, Sol in Virgine.	LOCVS Natalis.	AUGUSTO, Sol in Virgine.
Amat so- lum pin- gue & a- pricu ac stylas & colles.	tas, tum arbusculas compre- hendit, Germ. Balsamtraut/ alijs Hierosolimitanum po- num vocatur, Franciscus Apollo inter genus Halica- cabi secundi ponit, qd idem Matthiolus facit. Centaurium duplex, ex Dios. lib. 3. cap. 6. & 7. maius & minus, Magnum folia ha- bet iuglandis, oblonga viri- di bratsicarum colore sepra- ta in ambitu, &c. est nihil ali- ud quam illustis illa radix, quam antiqui erroris secta- rij Rheuponticum vocave- runt. Centaurium minus, vulgo biondella, ex Diosco. lib. 1. limnesion aliqui vocave- runt, quoniam rigua amet loca, Germani guide / oder fiebertraut / Iulio, Augusto, & Septembri colligitur, eo tempore, quo semine prag- nans est herba, ad extrahen- dum succum.	Nascitur ruderib. & incul- tis agris, aridis in- terdu & siccis lo- cis.	sa, quæ à Cyparissia specie differre constat, caulis supra cubiti altitudinem assurgit, geniculatus, folijs piceæ acu- tis, exilibus: flore paruo, ve- lut purpureo, &c. huius ra- dix magna impostura, pro Turpeto venditur. Quod cum non ignorasset Aqua- rius sua ætate, Turpetum a- liud album esse dicit, quod Aliptæ radicem esse prodi- dit, aliud nigrum, quod py- tiusæ radix est. Fuchsius a- pud Nicolaum Esulam ni- hil aliud esse opinatur, quàm Chamepityn, quod Matthi- olus negat. Imò Nicolaum, illam ipsam Esulam maio- rem, vel pityusam, quæ folio piceæ uel pineæ constat, in- tellexisse, à forma foliorum denominatione sumpsit, par- uam enim pinum, pityusam representat.
Montib. ac aspe- tus locis.	Euphrasia, quibusdam Eufragia grecis Euphrosini, alijs herba adhil, quibus- dam ophthalmica, antiqui- oribus incognita, herbula est, inter initia autumnii ma- gna copia erumpit, Germani augentrost vocant. Esula maior quam offic- inæ sic vocant, grecis pityu-	In cultis & siccis sive aspe- tus locis.	Esula minor, hanc Mar- thiolus Tithymalum Cy- parissiam esse opinatur, ea- liquidem primum arborem, nuper natam folijs prorsus imitetur, radicibus hæc con- stat exiguis fibrosis, parua hæc præstantior est, præfer- tim cortice, & eo quidem tenuiore, leuiore, fractu fa- cili
Pratis & campe- stribus.			

24
QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS
Natalis.

AVGVSTO,
Sol in Virgine.

cili Casia modò subru-
bente, senis nondum men-
sibus transactis collecto,
nam recens quo mense legi-
tur mala est uti, & nigra &
orta loco aliquo prope Ther-
mas, legenda igitur sunt E-
sula, circa finem Augusti,
aut tempore mēsis.

Nascitur
in hortis
et vineis.

Esula rotunda, græcis pe-
plus, frutex est lactei succi
plenus, Germani, Teuffels-
mildh vocant, folijs parvis
uritæ, paulò latioribus, ro-
tunda coma, colligitur prin-
cipio Augusti mensis, licca-
tur in vmbra & cōtinuè ver-
titur.

Hortis
seritur.

Eruca sativa, latinis pariz-
ter atq; officinis græcis Eu-
xomon, Germanis Weiss-
senfft / circa finem Augusti
colligenda.

Seritur
agris.

Lens sativa herba notissi-
ma, Augusti mensis initio,
vel circa finem Iulij, colligi-
tur vna cum semine.

Hortis et
vligino-
sis locis.

Mentha, cuius duæ sunt
differentiæ, hortensis & syl-
vestris. Hortensium aliquot
numerantur species, floscu-
lis purpureis, vna interno-
dia coronantibus verticilla-
to ambitu: altera sub pur-
pureo flore spicatoq; circa

LOCVS
Natalis.

AVGVSTO,
Sol in Virgine.

caulicorum fastigia, ut
quæ Romana dicitur. Sylve-
stris, vulgo Menthastrum di-
citur.

Mentha in vmbra sic-
canda, ut eius superflua hu-
miditas corrigatur, vbi ve-
rò infundi tantum postu-
lat, ut in syrupo de absin-
thio, passa tantum requiri-
tur. idque in omnibus in-
fusis perpetuò obseruan-
dum.

Pulmonaria, Germanis
Lungastrau.

Pulegium, Germani Pos-
ley / aliud sativum, aliud syl-
vestre apparet, Sylvestre pul-
legium, simile est origano
minoribus folijs quàm sa-
tium, & à quibusdam Di-
ctamnium vocatur, Diuidunt
præterea in marem & fœmi-
nam pulegium. Mas candi-
do flore, fœmina purpureo
erumpit, quæ efficacior est
mare, legenda sunt cum
fuerint floribus ornata, Iu-
lio videlicet & Augusto mē-
sibus.

In arvis
& incul-
tis nasci-
tur.

Psyllum, latinis herba
pulicaris, Germanis psiliens-
traut / semine est nigro pur-
licum

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS
Natalis.

AVGVSTO,
Sol in Virgine.

licum simili, unde & nomen
flore tota æstate. Matthio-
lus duo constituit genera v-
num flosculis albis, alterum
quod folijs constat numero-
rioribus, longioribus, angu-
stioribus, densioribus pilolis
pnr iter atq; incanis. Franci-
scus Apollo tria describit,
album nigrum, vel subpur-
pureum, ex quibus deligen-
dum est semen, quod est ma-
turum, magnū, graue & qd
aqua mergatur.

Nascitur
in mōti-
bus aspe-
ris & in
cultis lo-
cis.

Solidago Saracenica, ab
alijs ceratophyla, Germani
Heydnisch wundkraut / à
Fuchsius sic denominata, cau-
lem rubeum ac cauum ha-
bet, altitudine trium ferè cu-
bitorum, è quo prodeunt
folia oblonga, serræ modo
incisa salicq; similia, flores
luteos Augusto mense osten-
dit.

Locis in-
cultis
mōtib;
saltibus
pratis &
dumetis.

Succisa quam aliqui Ge-
um appellant, Germ: Teuf-
fels ambie / latinis Morsus
Diaboli, folijs plantaginis
minoris similis, floribus pur-
pureis, radicibus subnigris
& succis. In Augusto colli-
gitur.

Nascitur
in aqua-
rū ripis.

Tanacetum, Germanis
Reinfarn / quod Fuchsius pro
tertia specie Artemisiz po-

LOCVS
Natalis.

AVGVSTO,
Sol in Virgine.

nit, Matthiolus verò negat
& pro parthenio mare de-
scribit, floret hæc Augusto
mense.

1.
Sepibus
aut val-
libus.

Tithymali, Isue Esulæ,
quæ indifferenter ab offici-
nis sic appellatur, septem nu-
merantur genera, quorum
masculus Characias, latinis
vallaris appellatur, quod ni-
mirum vallis sepisq; mu-
nuendis idonea sit, Germani
Wolffemilch vocant.

2.
Mōtosis.

Tithymalus Myrtites, à
foliorum figura denomina-
tur, huius fructum quidam
nucem vocant, & hic scemis-
na æstimatur.

3.
Maritis-
mis.

Tithymalus paralius, id
est Marinus, quod in maris
timis nascatur.

4.
Ruderis-
bus.

Tithymalus Helioscopius,
hoc est, Solisequus, quod ad
solis cursum circumagitur,
groß wolffemilch.

5.
Campe-
stribus.

Tithymalus Cyparissias,
à cypressi similitudine, Ger-
mani Cypressene wolffemilch.

6.
Petrosis.

Tithymalus Dendroides
à ramorum copia.

7.
Scopus-
lois.

Tithymalus platyophil-
lus, id est, latifolius, à latitu-
dine foliorum, Germani
Breyte blettere Wolffemilch.

Omnia hæc genera Tithy-
malorum, in fine Augusti &
mense

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS
Natalis.

AUGVSTO.

Sol in Virgine.

in mense Septembri colligen-
da, praesertim quando iucci
sint extrahendi, nam ut su-
pra diximus, quo recentio-
res plantae hae colliguntur,
eo deteriores sunt iucci,
ideoque non nili transactis se-
nis mensibus legendas esse
praecipunt Medici.

LOCVS
Natalis.

SEPTEMBRI,

Sol in Libra.

Hortis.

Hortis et
fœtilib.

In Idas
monte
Troadis
et in Mes-
senia.

Hortis
seritur.

A Brotanum ex Diosco.
lib. 3. cap. 25. duum
est generum, mas &
fœmina, Mas frutex est, qui
in arboris speciem candican-
tibus folijs, seriphij modò,
exurgit, circum ramulos in-
cisis, cum odoris grauitate,
Augusto floret, autumno le-
gendum potissimum Sep-
tembri, quo tunc semine
prægnans carpitur. Fœmina
non omnibus cognita, sunt
enim qui absinthium mari-
num pro eo ostendunt, alij
Cypressum, prior opinio fal-
sa, posterior verior est, quod
Dioscoridis verba decla-
rant.

Asarum, quibusdam syl-
uestris Nardus de quo Dios-
lib. 1. cap. 9. alij asarum
Bacchar vulgare esse scribunt,
Germani balsewurzg / vere &
autumno floret, in fine Au-
gusti & principio Septem-
bris colligitur.

Æthiopis folia, quæ ver-
basco similia sunt, per quàm
hirsuta densaq;, Plinius les-
git autumno.

Coriandrum aut corias
non, Germani Coriander /
herba est vulgaris noticiæ.

Conyza: officinis pulicæ-
ria, quia substrata pulices

H inte-

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	SEPTEMBRI, Sol in Libra.	LOCVS Natalis.	SEPTEMBRI, Sol in Libra.
Locis ædificatis, interdum humilibus & agrorum marginibus proueniunt.	interimat ex Diosco. lib. 3. cap. 116. triplex est, maior, minor & media, Germani <i>Gelwurtz</i> oder <i>dürwurtz</i> vocant. parua odore præstantior est, maior verò frutice, altior et folijs latioribus, graui odore, vtriusq; folia nirsuta & pingua. Medium genus iniucundum, & grauius spirat.	Nascitur locis cultis & sabulosis.	tumno & æstate. Est & pseudodictamnium, ex Diosco. eodem loco duo genera describuntur, primum priori simile, sed minus, quàm illud acre. alterum folijs sisymbrij, ramis maioribus, in quibus flores syluestris origani, nigri molles.
Agriculis reperitur, colitur etiam in hortis ob purpurei floris odorem.	Cyclaminus: vulgò panis porcinus, quibusdam panis, vel umbilicus aut malum terre, radice constat, rapimodo tuberosa & folijs præstantiore. officinis arthanita, germani <i>Serebror</i> .	Horticolitur, & iuxta sepes & vepres nascitur sponte.	Lathyrus, officinis cataputia minor, quod in pilulis quibusdam, seu potius catapotijs semen ferat, Germanis <i>spring forner</i> / oder <i>treibforner</i> / carpitur autumno, dum fructu prægnans est.
Hortis & agris colligitur.	Cannabis satina, planta in marem & fœminam distinguitur, Mas semen profert, sterilis fœmina ad lineos vsus accommodatior. Est & syluestris Cannabis, quam alij Eupatorium vulgi esse, existimarunt.		Lupulus Germani <i>hopffen</i> vocant. ex Plinio videtur. lib. 1. cap. 11. esse lupus salicarius, inter sponte nascentia esui apta enumeratus: autumno legitur.
Syluis & montibus.	Erica, arbuscula bicubitalis, sæpe longè maioris proceritatis, multis à radice stolonibus, bis anno floret, vere & autumno, quo tempore etiam colligenda.		Rosmarinus vel Libanotis, ex Diosco. lib. 3. cap. 70. durum est generum, fœcundum nimirum & sterile, fœcundi semen Canchrys vocatur, sterile neq; caulem, neq; florem, neq; semen promit. Est & Rosmarinum Coronariū vocatum, semper virefcit, præterquam in raris & extremis gelicidijs, profert exeruleos flores, quos Melanthios vocant. Carpuntur Maio mense, & deinde ad Septembris
Herba cretensis.	Dictamnium, aliquibus syluestre pulegium à Diosco. lib. 3. cap. 31. sine flore & semine describitur, metunt au-		

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS Natalis.	SEPTEMBRI, Sol in Libra.	LOCVS Natalis.	SEPTEMBRI, Sol in Libra.
<p>Nascitur narcissus in montib⁹ pro- batissim⁹ suavi o- dore.</p>	<p>bris medium, bis enim anno flore, vere & autumno. Narcissus ex Theoph. lib. 6. cap. 6. folium albu ter- ra proximum gerit, sed lon- gè latius, lilij modò, habet caulem sine folio herbaceu florem suo ferentem cacu- mine, in membrana veluti vasculo inclusum, large am- plum, coloreq; nigrum, figu- ra oblongum, serotinus ad- modum. post arcturum e- nim & circa æquinoctium flore, Plinius duo genera, lib. 21. cap. 19. Narcissi de- scribit, vnum flore purpureo, alterum herbaceum, Germa- ni zeytlosen vocant. Matthio- lus præter hæc alias complu- res species ostendit.</p>	<p>Hortis umbro- sisq; lo- cis & se- cus uias sponte nascitur.</p>	<p>Solanum siue Solatrum corruptè, ex Diosco. lib. 4. cap. 61. aliud est hortense, siue esculentum, vulgo her- ba mora, alijs vua morel- la, idque simpliciter Solani voce intelligendum est, Ger- mani Nachtschatten.</p>
<p>In hortis seritur spectadi potius q̃ quæstus gratia.</p>	<p>Ricinus, latinis cici, aut croton græcè, vulgo catapu- tia maior. Arabibus Cher- ua, ex Diosco. lib. 4. cap. 142. nomen accepit à ricini ani- malis similitudine. plebis ceca vocatur, cui cibis nul- lus est exitus, nullis discre- tum membris, colore liuido in globum continuè crescens, nec prius à suctu recedens, vbi animalium dorso nhære- scit, nisi antea disrumpatur, & sponte decidat.</p>	<p>Saxosis nec pro- cul à ma- ri locis.</p>	<p>Secundum est Halicaca- bon, aut phisfalida, id est, Vesicaria vocatum, officinæ Alkakengi appellant, Ger- mani nostri, Juden doctle: Zuden kirschen / oder Rott nachtschatten / quod non ni- si autumno maturescit. Est præterea aliud genus Vesica- riæ, siue Hali cacabi, quod Fuchsius peregrinum, Ger- mani Welsch schluten / vo- cant. Franciscus Apollo, vir eruditione insignis, Balsa- minam, aut viticellam esse ostendit, ab alijs Hierosolo- mitanum pomum vocatur, folijs quali vitis. flore can- dido, vesicis halicacabi ver- rucosis, &c.</p> <p>Tertium habetur Sola- num somnificum, ab effectu denominatum, nempe dor- mitorium.</p> <p>H 2 Quar-</p>

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

LOCVS
Natalis.

SEPTEMBRI,
Sol in Libra.

Monta-
nis ac vé-
to perfla-
tis locis
nascitur.
In arbo-
ribus quer-
cinis.

Quantum Solanum Ma-
nicon, siue furiosum dicitur,
folio erucæ simile, maius ta-
men, satis ad spinam, quam
Pederota vocant accedens.
Viscum optimum est quer-
cinum; decerpitur autumnii
initio cum suis acinis, Ger-
mani Nischel vocant.

LOCVS
Natalis.

OCTOBRI, SOL
in Scorpione.

HAstenus eo progressi
sumus, ut herbarum
vires, quò nimirum
tempore vigent, & colligun-
tur ad vsum medicum, con-
spicue fierent studiosis. Nunc
cum in OCTOBRI SOL in Scor-
pionem ingrediatur, quo tẽ-
pore pleraq; ad ruinam de-
fluere solent, paucis exceptis
quibus folia non decidunt,
natura nos hic aliquandiu
in colligendis delistere &
quiescere iubet, estq; hoc tẽ-
pus Brumale omnino incli-
nanti atati conferendum,
quod non sentiat amplius
gaudia annorum. Sed non
immerito posset, quis cau-
sam commutationis quæ-
re, an fortassis quod folia
sint tenuia, lata & mollia,
vel forsitan id fieri occulta
aliqua qualitate, ut Timeus
Mathematicus sensit, aëris
veneno & fideris qualitate,
cum SOL scorpionem ingre-
diatur. Verum cur non ea-
dem causa aduersum omnes
polleat, iure miramur, cadūt
enim plurimis autumnio,
quædam ocys aut tardius
amittunt, atque in hyemes
prorogant moras.

Nec interest maturius ger-
minasse, ut pote cum quæ-
dam

27

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

dam primò germinet, & inter nouissimas nudentur, ut Amygdalæ, fraxini, Sambuci. Morus autem nouissimè germinat, & cum primis folia dimittit, magna & vis soli, prius decidunt in liccis macrisq; & vetustæ prius arbori, multis etiam, antequàm maturescant fructus. In Serotina ficu, & hyberna pyro, & malo granata, est pomum tantum aspici in matre, neq; his semper retinet, comas eadem folia durant, sed subnascentibus alijs tum arescunt, quod euenit circa solstitium. Nec præterea ista cōmutatio annua adscribenda erit duntaxat frigori, gratia cuius calor cum spiritu & humore, quorum est comes intro repellitur in profundum, forisq; cutis spiracula adstringit, calorisq; substantiam cogit, & ita coercet, ut nihil aut minimum possit effluere, siquidem folia in quibusdam, media æstate, aut statim post germinationem decidunt. Cur verò frigore non pereant, folia arborum quædam, & herbarum ne hodie sapientia professoribus id cōstat. Etsi quidam non decidere, nec arescere folia in arboribus putant, cum callo sint crassa & angusta, ceu hædera muralis,

uinca peruinca, Buxus & similia aut quorum foliorum succus pinguior est, verum neutra ratio mihi placet. Quis enim in Ilice, Abiete et Larice potest intelligere causam? Quidam inuitantis cœli voluptatem, aut etiam soli vbertatem, fertilitatemq; respiciunt, veluti circa Memphim in Ægypto, quæ hodie Alkyra dicitur. præterea in Elephantina Thebaida, tanta vtrorumq; locorum vis est, tanta cœli clementia, ut nulli arbori, ne vitibus folia quidem decidant, Sed ne his quidem concedimus. In Germania enim & locis Septentrionalibus, licet nullam talem fertilitatem videmus, nihilominus arbores quædam perpetuo virescunt, frigusq; nō abhorrent. Quid non laudatius Germaniæ nostræ pabulis? licet subest statim harena tenuissimo cespitem corio testæ. Nec itaq; semper proceritas herbarum vbi aquosum & pingue est solum.

Proinde cum nulla probabilis ratio eorum, quæ sensui sunt conspicua, reddi aut demonstrari potest, satius erit, omissa terrestri cura, naturæ illud duntaxat occultæ adscribemus, natura enim uim miraculum sui, atque

H 3 tellus

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

tellus ostendere voluit, quæ
cui libet in ipsa propagatio-
ne ad mensuram caloris in-
nati dedit, ratione cuius vi-
tam longius aut breuius du-
cere potest, de quibus apud
Aristotilem in libro de lon-
gitudine, & breuitate vitæ di-
sputatur, quæ nos hîc, cum
ad institutum nostrum pa-
rum conferre videantur, præ-
teribimus.

LOCVS
Natalis.

OCTOBRI, SOL
in Scorpione.

QVOTEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

[illegible]

QVO TEMPORE FLORES COLLIGENDI.

FORMA
Coloris.

IANVARIO,
Sol in Aquario.

COLOR.

FEBRVARIO,
Sol in Piscibus.

Cadidos
flores ha
bet.

A Mygdala, iuxta Plini
um lib. 16. cap. 25. in
Ægypto omnium pri
mò floret, mense nimirum
Ianuario, Martio verò po
stimum maturat.

Purpurei
mixti cū
candore.
Flos cro
ci modò
erumpit.
nullis ad
huc ap
parenti
b^o folijs.

E Rica in tepidioribus los
cis, primò inter sylues
itres herbas floret, in
frigidioribus autem mense
Martio.

Hermodyli ueri, flores
erumpunt Februario, & pri
mo statim vere, alio tempo
re & ita cœli clementiori,
post exitum autumni.

MARTIO

29

QVO TEMPORE FLORES COLLIGENDI.

COLORES.	MARTIO, SOL in Ariete.	COLORES.	MARTIO, SOL in Ariete.
Cádidos flores habet.	B Vibus sylvestris, Germani feldt zwibel / in Martio flos erumpit, ac statim evanescit.	Carulei.	curuatur, perduratq; diu antequam contabescat.
Purpurei.	Ellebori nigri hortensis, Germ: schwarz garten nießwurtz/locis videlicet Septentrionalibus apparent, non priusquam Martio flores.	Subcan-	Hyacinthi secundi maioris.
Candidi.	Ellebori nigri sylvestris, wild schwarz nießwurtz.	didi, aut subpallidi.	Hyacinthi minoris, Germani omnes Mergzenblumen vocant.
Herbae ceis.	Ellebori herbacei, cuius magna est copia in nostris montibus Halx Suzuorum cum floribus.	Floribus paruis ac herbaceis	Hyacinthi albi, siue pallidi flores.
Cádidos.	Elleborus albus, weiß nießwurtz/ flores habet.	Purpurei	Iuniperus perpetui virosus, floret in fine mensis.
Flores in cacuminibus albicantes numerosos, in stellæ modum sese pandentes.	Hastula Regia, quam Latini Albulcum, siue Asphodelon vocant folijs maioris porri: caule læui ferente in cacumine florem quem Anthericon appellant, floret particulatim, ut Scylla ab initio incipiens, verbasci quoque modum. Radicibus nititur numerosis, nigricantibus & bulbosis, Plinius colligit flores Martio: lib. 21. cap. 17.	Floribus purpureis.	Laricis flores ineunte Martio è frondium cacuminibus mira elegantiq; naturæ industria comantibus foliolis annexis micant, etsi quidam nullo exhilarari flore putant.
Caruleos.	Hyacinthus primus flores habet maximos, floret cum violis circa finem Martij & Aprilis initium, qui maturefcens ad terram inclinatur.	Flores habent laevigatos, & quasi nucamento compactos.	Petasites, quam Matthiolum pro Tussilagine maiori pingit, floret circa finem Martij.
			Salix vulgò nota, Germani weiden oder felbinger / flores Galenus lib. 6. simpli med. multis verbis commendat, ad exiccantis emplastri preparationem: est enim vis eorum ita desiccatoria, ut morsu abstineat, habent verò etiam quandam adstrictionem, & C. Theophrast.

COLO MARTIO, SOL COLO MARTIO, SOL

res.

in Ariete.

phrast. lib. 3. cap. 13. hist. plant. tria genera Salicis describit. Nigram, quod cortice nigro sit obducta, hanc Plinius lib. 16. cap. 27. Viminalem vocat, Columella vero Sabinam & Amerinam appellat, Germani Rotweiden. Secunda, Salix candida, à Plinio, Vitellina, Columella autem Græca, Germanis, gel weiden vocatur. Tertia à Theoph. Helix, à Plinio, Columella, Gallica appellatur, Germani Flein weiden.

Flos virgata specie in luteo candido pro filit, flores retq; ab imo.

Flores habet luteos.

Violacei.

Candidi.

Carulei.

Purpurei.

Lutei.

Scylla ter anno floret, Theoph. autore lib 7. cap. 12. tria; tempora sationum ostendit, ut testatur Plinius lib. 21. cap. 17. Est hoc tempus primum sationis.

Tussilaginis floret vsq; ad principium Aprilis, quo de hinc tempore euanescit.

Viola Martiana siue purpurea.

Viola alba, Leucoj dicti vulgaris notitie, sed in floribus differentia quædam inuenitur.

Verum illud animaduertendum, quod luteæ violæ, Mauritani Cheiri, siue Alcheiri appellant, & deinde

res.

in Ariete.

purpurei, non nisi Aprili & Maio mensibus florere incipiunt.

Vitex, siue lygos, frutex est in arborem assurgens, folia aliæ, sed molliora habet, duum generum ex Diosco. lib. 1. cap. 116. notatur, ex differentia florum. Germani viticem Schaffmullen vocant.

Vna flore mittit album cum purpureo altera tantum purpureum florem habet.

QVO TEMPORE FLORES COLLIGENDI.

COLO- res.	APRILI, SOL in Tauro.	COLO- res.	APRILI, SOL in Tauro.
Cáddos ut sape florere vi- dimus in horto Il- lustrissi- morū co- mitu de Hohéloe	A Vrantia poma, quibus dam aurentia, fulgo- ris auri plena, ideo au- rea nuncupata, aut verius ab Arantia oppido Achaia, ut ex Hermolao 5. sui corolla- rij. cap. 422. apparet. Germa- ni Pommerantzén vocant, flores habet fragrantissi- mos.	intrinse- c ^o lutei. Purpu- reos os- tendit. Purpu- rei. Aurei. Purpu- rei. Cáddos Purpu- rei. Candidi Purpu- rei. Candidi. Purpurei ex nigro splendēt, in cuius medio aurei flo- sculi emi- cant. Vnū flo- rib ^o lute- is odora- tis. Alte- rū palle- scētibus odore de- stitutis.	pitunt & per aestatem durant fere integram. Clematides, Daphnoidis latinis vnica peruinca flo- res. Cneoron, Matthioli. Chelidonij minoris, siue Scrophularia minoris. Daphnoidis zeytlandt. Fumaria, quæ olim à D. Fuchio pistolochia nomi- nabatur. Geranij primi flores Geranium candidis flori- bus. Hedera terrestris, flores pulilli. Limoniarum, Lemonien blüß. Pulsatila flores legimus, quàm plures iuxta Cocha- rim flumen impetuosissi- mū, non procul ab oppido Ingelfingen dicto, mense Aprili. Primula veris, siue verba- sculum, alijs Phlomidis. Ruellio Brachecuculus, herbarijs Arthritica, Germa- nis Schlüsselblumen / cuius duo sunt genera. I 2 Pruna
Profert flores cá- ddos fra- grantif- mos.	Adami poma, alijs Lumia, vel cedriata vocantur, her- baceo virentia colore & præ- grandia instar melonum vel orbiculata, aut oblonga fa- cie turgentia, vel ouali specie turbinata.		
Candidi. Purpurei	Amygdalarum dulcium. Amygdalarum amara- rum,		
Purpurei Cáddis floribus.	Asari flores. Armeniaca, quæ & Chry- somela, id est aurea mala, ex Athenæo lib. 3. cap. 5. lati- nis præcotia dicta sunt, hæc vna cum alijs horæis fru- ctibus Aprili mense flo- rent.		
Cáddis.	Allium vrsinum, floribus in summo.		
Cáddis.	Agrostis siue gramen, in fine mensis incipiunt florere, & per mensem durant se- quentem floribus.		
Extrinse- c ^o rubei,	Bellis minoris satini, Ger- mani Monar blümle / inci-		

QVO TEMPORE FLORES COLLIGENDI.

COLO- res.	APRILI, SOL in Tauro.	COLO- res.	MAIO, SOL in Geminis.
Candidi	Prunorum syluestriū flores, quos Germani <i>schlehen</i> appellant.	Cādidos Aurei.	A llaria flores habet. Anguria, hetruscis cucumis, alijs melo palestinus. ex Serapione Dulla ha, id est, melo magnus, Germanis Cucumern. cuius flores Maio apparent.
Purpurei	Perficæ arboris flores, germani <i>Pfirsingblüß</i> vocant.	Aurei.	Anagallis mas.
Lutei.	Ranunculi hortensis primi, ungefülter garten hanen süß.	Punicei.	Anagallis fœmina.
Candidi	Rorismarini siue Libanotis.	Candidi	Aparine.
Ex cādido pallescentes	Ribes, Joannes berle blüß.	Candidi Aureo	Alparagi.
Candidi	Siliquarum flores, Joannes bierblüß / græcè Ceratia. alijs ceratonia, quibusdam Xylocaracta, alijs Carobe dicitur, flores sunt.	Chrysanthemum modo.	Aconitum Dioscoridis, Theophrasti, & Plinij, flore apparet.
Floribus candidatibus.	Vua Crispa, vulgo spineola, Germanis <i>Eloster ber</i> / veris initio statim pubescit, frutice ramulis pluribus aculeato, horridis spinarum mucronibus folijs circinata rotunditatis apij instar discissis, duum est generum mas & fœmina.	Cerulei.	Aquilegiæ flores violacei, siue cærulei sunt, ex caudis quibusdam, veluti muliebres loci propendentes.
Flos cæruleus albus et luteus apparet.	Viola trinitatis incipit florere, & per integram æstatem durat, Germani <i>Dreyfaltig-fait blümen</i> .	Candidi	Allij Hortensis, gartenfnoblaech.
		Purpurei	Allij syluestris, tam primi quàm secundi speciei.
		Candidi	Alleluia, siue Trifolij acetosi.
		Purpurei	Anemonis sativi, primæ & secundæ speciei flores.
		Albi.	Anemonis tertix speciei.
		Aurei.	Anemonis quartæ speciei.
		Extrinsecus albi, intrinsecus lutei.	Bellis maioris, groß genß blümen / flores chamomillæ modò profert.
		Purpurei	Betonicæ purpureæ.
		Flores utriusque purpurei	Bistorta tam mas quàm fœmina. Germani <i>Waterswurtz</i> / falso serpentaria dicitur.

Barba

QVO TEMPORE FLORES COLLIGENDI.

COLO- res.	MAIO, SOL in Geminis.	COLO- reis.	MAIO, SOL in Geminis.
Flora aureo.	Barba hirci, græcis Trago- pogon, Germani Bochebart/ dum est generum, vnum, flos auri modò fulget, alte- rum purpureos, radiantibus circumquaq; calycis apici- bus.	Aurei.	Chrysantemi flores splen- dent.
Flora purpureo.	Betula inlos profert ob- longos, in quibus hæret flos.	Candidi.	Erucæ sylvestris, wilde senfft blüß.
Herba ceus.	Bulbus sylvestris florem ostendit.	Luteis.	Erigeron, floret tota ferè estate floribus.
Câdidû.	Caryophyllata sylvestris, Benedicti wurtz / florem pro- fert.	Câdidis albæ vio- læ colore similibus, odore in- festo.	Euonimus arbor siue fru- tex, Germani Hanenbôde / floret vere floribus.
Puniceû	Consolidæ mediæ, gulden güngel / mixtum colorem.	Rotundi Echina- cei & her- bacei.	Fumariæ flores. Purpurei.
Ex pur- pura ca- ruleum, Luteis.	Coluthea spectatissime floret, circa finem mentis floribus.	Câdidos Purpu- reos flo- res osten- dunt.	Fagus arbor, Germ. buch- baum / cuius flores apparent.
Candidi	Cerasorum hortensium et sylvestrium omnium flores.	Câdidos.	Fraxinus arbor, Germani Eschabaum / habet flores.
Ex albo & purp:	Cydonæ arboris flores mixtus.	Lutei.	Geranium, 2. 3. & 4. Ger- mani Storchschnabel blümen.
Albi ra- cemosi.	Corni maris & fœminæ flores.	Lutei.	Gingidium flores in vm- bella.
Câdidû.	Cercfolium florem osten- dit.	Lutei.	Genesta, genest / flores.
Purpu- reos.	Chamedrys vtraque tam mas quam fœmina flores.	Lutei.	Genestella, Germ. Streich blümen / frutex rosmarini pes- nè folijs est at rigidis ac pun- gentibus, femine, flore, ac radice genestæ, flores diu ap- parent.
Aurei.	Chelidoniij maioris.	Subflau	Isatis sativa floribus.
Snbpurp:	Citriorum.	Siquidè	Isatis sylvestris, Maio & Iunio apparet.
Lutei ra- cematim coheren- tes in v- læ ferè modum.	Crespini flores, officinis Berberorum, Germani saw- rad, oder sawerdoin / vel Ba- berblüß / odore non ingrato flores.	candidi, pallètes, lutei pur- purei ac côspici- untur.	Iris Domestica, à cœlestis arcus similitudine nomè ac- cepit, flores in summitate in- curui uarij. Germani Blaw- gilgen blümen vocant.

QVO TEMPORE FLORES COLLIGENDI.

COLO- res.	MAIO, SOL in Geminis.	COLO- res.	MAIO, SOL in Geminis.
	Iris sylvestris, cuius duo genera monstrantur, vnum latius siue Domestica per omnia similis, minoribus tamen folijs & floribus, alterum folijs gladioli longioribus, flore ceteris longè minori, odore Armeniaci mali radice tenui, lignosa, geniculata, subrussa, inodoraq;	Rosa- ceos.	Pœonia vtraq; mas vide- licet & fœmina flores osten- dunt.
	Lutei.	Candidi	Polygonati.
Candidi.	Lili conuallij flores. sua- uiter olent.	Purpu- reos.	Perlica arbor gaudet, flo- ribus pulcherrimis.
Câdidis.	Libanotis hortensis, siue Rosmarinus frugiferus, flori- bus.	Ex pur- pura cæ- ruleo.	Pilosella, vtraq; maior & minor florent.
Luteis.	Libanotis sylvestris.	Purpurei	Prunella.
Candidi.	Lupinorum flores.	Subfla- uum.	Pinus arbor, Germ: sich- ten. etsi hanc quiden nō flo- rere existimant, ostendit ta- men florem mense Maio.
Candidi.	Lamij, siue vrtice mortuz.	Candidi	Prunorum tam satiuos rum quàm sylvestriū flores.
Flore ru- bro.	Lapathum, siue Rumex, ger- mani ampffer vocant.	Albi ra- cematim depédēt.	Populi Nigræ flores. Ger- mani schwarz alberblüß.
Luteis.	Lapatium acutum, quod alias oxylapathum dicitur, floribus exiguis apparet.	Lutei câ- dicantes.	Ribes, flores profert.
Florem habet ra- ceosum.	Lapatium tertium, quod vulgus bonum Heinricum appellat.	Câdidos	Sedum, siue semperuiuum maius flores ostendit.
Subcâd.	Myrrhis in umbella flores.	Luteos.	Sedum minus & vermicu- lare.
Candidi.	Mespilorum.	Câdidos	Sanicula, mas & fœmina flores habent.
Lactei.	Nasturtij satini.	Candidi	Scordij vrsini flores.
Subluteo	Orobanchis flore.	Câdidos	Smilax aspera flores ha- bet, suauiter olentes &
Candidi.	Ophris, germ. zweyblat. flo.	Câdidos	Saxifraga maior.
vnū câdi- dis, dein- de purp.	Ophioglossi.	Herba- ceos.	Sanguitorba maior & mi- nor, flores ostendit.
et è ceru- leo in pur- pureum.	Orchis, latinis testiculus ca- pinus, Germa. Knabenkraut/ cuius genera sunt mas & fœ- mina, floribus diuersis.	Albis ra- cematim coheren- tibus.	Staphilodendron arbor, Germani Pimperpüßle vo- cant, arbor ista conspicitur in monasterio, Murhart Du- catus

QVO TEMPORE FLORES COLLIGENDI.

COLO- res.	MAIO, SOL in Geminis.	COLO- res.	IUNIO, SOL in Cancro.
	catus württembergensis, præ- terea satis magnitudine flo- ret, mense Maio floribus.	Crocei vel poti ⁹ subflau.	A Bietis flores, Germani Tannenblüß/ apparent circa solstitium æstiva- le, Plinio attestante lib. 17. cap. 26. nostro Climate con- speximus mense Maio.
è ceruleo rubescēti- bus & ex cēsis albi- cātibus.	Scabiosa, Maio Iunio ad Octobrem usq; florescit.	Cerulei. Lutei. Aurei.	Abfinthij, Seriphij flores. Abfinthij Santonici. Abfinthij pontici.
Florelilij effigienō quantita- te, sed co- lore & florisqua- dam ef- fentia.	Satyrum, Germani sten- delwurcz/aliquibus testis vul- pinus, trifolium, folij liliacē- is, ternis, frequentius gēmi- nis, officinæ carent.	Rosaceis floribus.	Altea id est, malua sylue- stris, floret vltra mensem in- tegrum.
Floribus purpu- reis.	Satyrum Erithronium, siue Erythracium seu ru- brum, cuius duę sunt species, ex quibus alterum Triphyl- lon, nimirum Satyrion odo- raturum, pro vero satyrio vti licebit.	Subru- beo.	Aphace flore.
Candidi. Purpu- reis.	Sorborum flores.	Punl ceis	Anagallis vtraq; tam mas- quam foemina floribus.
	Solanum somniferum se- cundæ speciei, cuius Matt- thiolus mentionem fecit, floret.	Aurei.	Acorus syluestris, Germa- ni gelb schwertelblümen.
Candidi. Lutei.	Thlaspi lati & angusti, folij.	Cādidi.	Acantha vera, Germani Welsch bern fleck/ latini Bran- cam vrsinam vocant, flori- bus decorata est.
Candidi.	Verbasci odorati, schlüssel- blümen.	Subluteis	Aristolochia tam longa quàm rotanda.
	Virga sanguinea, flores in umbella.	Candidi	Asphodeli, siue hastula re- gix, flores ab into incipiunt.
		Lutei.	Attriplex, vtraq; hortē- sis & syluestris.
		Aurei.	Anguriarum.
		Purpurei	Betonica.
		Candidi	Batti siue Rubi Idei, qui à & race- monte videlicet Ida sic de- nominantur, flores primo rubescunt, deinde apparent.
			Bryonia,

QVO TEMPORE FLORES COLLIGENDI.

COLO- res.	IVNIO, SOL in Cancro.	COLO- res.	IVNIO, SOL in Cancro.
Candidi. Pallidi.	Barba capri. Bryonia, racematim co- herent, & in stellæ modum radiant.	Luteis.	Cucumer satiuus floret, particulatim floribus.
Aurei. Extrinse- cus albis, intrinse- cus luteis	Balsaminæ siue viticellæ. Chamomillæ, à summo florere incipit. ex Dioslib. 3. cap. 131. trium est generum flore tantum distantium. primum Herantemon vo- cant, quam consolidam Re- galem existimat Fuchsius, Matthiolus hanc cumini syl- vestris speciem. alterum ge- nus Leucanthemon dicitur, alio nomine Camilla, quo- rum sane vnicus vsus est in officinis. Tertium chrysan- themum appellatur.	Aureis.	Cucumer sylvestris flori- bus.
	Calendula siue Caltha, Germani Ringelblumen/ flo- ret singulis ferè mensium cas- lendis Maio incipiente, Au- tumno autem magis appa- rent.	Lutei. Subpur- purei. Cerulei.	Coronopi flores spicati & Ciceris satiuus flores diu ap- parent, similiter & sylvestres. Chamedrys vtraq; tam mas quàm fœmina.
Aurei.		Cerulei flores.	Chondrylla, quam aliqui cichoreon, alij serin appel- lant, duum est generum, v- num caulem flores, & folia habet cichoreo similia, qua ex causâ quidam sylvestris Intybi speciem esse dixe- runt. Germani Sonnen wirt- bele. Alterum à lactis yberra- te, præsertim à radice, quæ redundat, lacti folia seu lacti folia appellatur.
		Lutei flo- res.	Centum morbia, siue nu- mularia.
		Aurei.	Chamecy parissi, quam quidam pro abrotano fœ- mina ponunt, Germani Cy- press/ flores habet.
Candidi. Cerulei. Ceruleis	Carei. Cinoglossæ. Cyanus maior & minor floret.	Aureos.	Chamecyssi.
Câdidi & mu- scosis.	Cypros græcè, Ligustrum latinis, floret in eunte æstate.	Câdidi. Aurei. Câdidi.	Chamepytis primæ. Chamepytis secundæ. Chamepytis tertiæ.
Cerulei. Purpurei	Centaureij maioris. Cetaurij minoris, Mesues æstatis initio florem colligit, nos vero Augusto & autum- no mensibus.	Lutei. Purpurei Purpurei	Chamaeleonis nigri. Dipsaci Iunio & Iulio mensibus.
		Câdidi. Purpurei Purpurei	Dauci genera flores. Echij. Eringij, flores apparent post

QVO TEMPORE ELORES COLLIGENDI.

COLO- res.	IVNIO, SOL in Cancro.	COLO- res.	IVNIO, SOL in Cancro.
	post solstitium Cancri, circa finem fere Iunij.	Candidi.	Lepidium, Iberis Damo- crati appellata.
Purpu- reum.	Eruum rufum ostendit flore[m].	Candidi.	Lithospermi.
Subpur- pureum.	Eruum pallidum: ambo hac diutius florent, quam frumenta.	Purpurei Lutei.	Lifimachia purpurea. Limafichia lutea, Iunio & Iulio menfibus florent.
Cãdidos	Erithrodanum fatium et fylueftre flores habet.	Candidi inftrami- li.	Lafepitij germanici flo- res.
Lutei.	Eupatorium, Dios. floret ab imo, & durat per mensem Iunium & Iulium.	Purpu- reis.	Lauendula, alias pseudonardus, floret Iunio & Iulio menfibus.
Candidi Candidi	Epithymi. Filipendula, fiue Oenan- tha.	Subpur- Lutei.	Malu infania. Meliffa duorum generum, vnum floribus luteis, alte- rum floribus purpureis.
Purpu- reos.	Gentiana, utraq; flores profert.	Aureis. Ceruleis.	Meliffa citrugo floribus. Melanthium fiue Githof- ficinis Nigella, nomen à fe- mine nactum, floribus.
Subpur- Purpurei Lutei.	Gratiola oblongi flores & Geranij quinti. Hepthaphylli.	Purpu- reis.	Melanthium floribus,
Cæru- leos.	Intybus fiue feris horten- fis flores profert Iunio & Iu- lio. Intybus fylueftris, cuius duz sunt species, prima Ci- chorea, Germani Wegwar- ten / incipiunt particulatim florere & durant vsq; in au- tumnus: altera species fyl- ueftris, folio eft latiore.	Luteis floribus. Purpu- reis. Punicei aut sub- purpurei	Melanthium citrium. Melanthium fylueftre flo- ribus. Pseudomelanthium, quod Germani vocant Kotteln.
Cerulei.	Imperatorie flores. Lolium. Lilij albi, nec vlli florum maior excelſitas, interdum trium cubitorum conſpici- tur (ſi videlicet flos cum ſti- pite meſuretur.)	Cãdidos purpureos & az- tros.	Morus arbor floret non prius niſi exaſto frigore, ob id ſapientiffima arborum dicta eſt à veteribus flores habet.
Cãdidi. Subpur- purei,	Limonij veri.	Melini. Lutei,	Meliloti veri Iunio & Iu- lio menſibus. Meliloti vulgaris.
Candidi.			K Melo-

QVO TEMPORE FLORES COLLIGENDI.

COLO- res.	IVNIO, SOL in Cancro.	COLO- res.	IVNIO, SOL in Cancro.
Lutei.	Melonum.	Pallidi.	Pentaphyllum, siue quin- que folium latinis, flores.
Candidi.	Marrubij nigri foetidi.	Sublutei.	Periclymeni flores mixti, nempe candidi & lutei, vel
Câdidis.	Nymphaea floribus.	Câdidis	Plylium primum & secun- dum floribus.
Aureis.	Nymphaea floribus.	& lanu- ginosis.	
Câdidis.	Nasturtium satium.	Câdidi.	Pyrola flores in Capilla- mentis.
Câdidis.	Nasturtium syluestre primū.	Rosei, pu- nicei &	Rosarum differentias per- sequitur, Plin. lib. 21. cap. 4.
Purpus reis.	Nasturtium syluestre secun- dum.	Albi: om- nes hi flo- res decer- pendi, cū non pla- nè expli- cati vi- suntur, ceu etiā capparū.	q̄ differunt multitudine fo- liorum asperitate, leuore, co- lore, & odore, paucissima quina folia, ac deinde nume- rosiora. Est & Rosa in cam- pania Italiae quam Centifo- liam vocant, praestantissima sunt rosa, quae puniceo colo- re rubent, proxima laus ijs, quae in rufum candicant, vi- lissima candicantes.
Purpu- reis.	Orminum tam satium quam syluestre floribus.	Purpurei	Rapunculi, in principio mensis flores apparent.
Câdidis.	Orcoselinum gracè, Apriū montanum latine, floribus.	Albis me- dioluteis	Solanum hortense tota æ- state floret, floribus paruis.
Câdidis.	Oxyacantha Matthioli, latinis acuta spina, Germa- nis bagendorn/ floribus.	Candidi.	Solani halicacabi, offic- inis Alkakengi.
Câdidi, & race- matim cohæret.	Olex flores omnes tam fa- tues quàm syluestres, mense Iunij apparent.	Subrubei	Solani somniferi.
Candidi	Plantaginis aquaticæ.	Ex câdi- do lute- scentes.	Solani peregrini.
Lutei.	Plantaginis maioris flores in spica cohærent.	Carulei.	
Pallidi.	Plantaginis minoris.	Echinos	Sij siue Laueris, Germani Bachmünz/ flores.
Intus luz- tei, extus albi.	Parthenium Fuchsi, quod nos supra pro Matricaria syl- uestri posuimus, Germ. wildt Hamillen/ oder frotendill.	et purpu- reos.	Spina alba Fuchsi, latinis cardus Maria, Germanis Fechdistel flores habet.
Extrinse- cus albi, intrinse- cus lutei.	Parthenium satium, ger- mani Mertram / latinis Ma- tricaria diu flores apparent.		Scorlea
Candidi	Peponum flores.		
et lutei.	Prormicæ, siue sternumen- tariae Germ. wi. d. Bertram.		
Ex purp- caruleo,	Pilosellæ maioris flores.		
Lutei.	Pilosellæ minoris.		
Aurei.	Pes Leonis, Matthiolus stellaria dicta.		

QVO TEMPORE FLORES COLLIGENDI.

COLO- res.	IUNIO, SOL in Cancro.	COLO- res.	IUNIO, SOL in Cancro.
Flores purpurei coloris.	Scorlea, floribus in caule secundum folia, per interval- la prodeuntibus, ab Ormino fatiuo Fuchij distans.	Aurei. Lutei. Subrubei	Sanctæ Barbaræ. Sargi. Scordij flores parui appa- rent, & Stachados.
Câdidis in umbel- la.	Sanibucus hortensis, syl- vestris & aquaticus, floribus gaudent omnes.	Subcæ- rulei. Câdidis.	Struthium, floret Iunio & Iulio mensibus grato aspe- ctu floribus.
Purpu- reos.	Serpentaria maior alias Dracunculus maior flores habet.	Lutei. Lutei. Albi.	Staphisagritæ. Sesalis Mafsiliensis. Sagittæ maioris & mino- ris.
Purpu- reos.	Serpentaria minor, alias dracunculus minor.	Candidi.	Saracenici frumenti, Cer- mani Heydel vocant, fru- mentum hoc copiosissimè nascitur & colitur, in mea patria Forcheim, flores diu apparent.
Flores purpurei & echi- nati.	Scolymi flos erumpit He- fido lib 2. de opere & die te- ste Solsticio æstivali. in Ger- mania verò mense Iulio. & quo tempore floret, aliud concepit, aliud parturit, de quò vide Plinium.	Flos in luteo câ- didus.	Scyllæ flores, secundum sationis tempus nunc osten- dunt, Plinio autore lib. 21. cap. 17.
Purpu- rei.	Saluæ maioris & mino- ris flores spicati Iunio & Iu- lio mensibus apparent.	Ruffi.	Terebinthi flores racema- tim cohærent, ut in oleis ve- rum apparent.
Purpu- reis, can- dore mi- xti.	Serpillum hortense & syl- vestre, utrunq; ornatur flo- ribus.	Subfla- uis.	Tilia fœmina floret cum urbanis arboribus floribus.
Luteis.	Sinapi hortense floribus.	Rubeis.	Trifolij pratensis floribus.
Câdidis.	Sinapi hortense floribus.	Subrubei	Trifolij pratensis secundi.
Aureum.	Sonchus aspera & levis flore habet.	et cand.	Trifolij pratensis tertij, cū floribus duntaxat.
Purpurei	Sideritis, Iunio mense flo- rere incipit, nec desinit nisi in autumni fine.	Câdidis.	Turcici frumenti. 1.
Purpurei & punic.	Spatula foetida.	Lutei.	Turcici frumenti. 2.
Cæruleis.	Scabiosa omnes micant floribus.	Candidi.	Turcici frumenti. 3.
Candidi.	Saxifraga albæ.	Purpurei	K 2 Thymi

QVO TEMPORE FLORES COLLIGENDI.

COLO- res.	IVNIO, SOL in Cancro.	COLO- res.	IULIO, SOL in Leone.
Cádidos purpura mixtos.	Thymi, circa solstitium cancri, flores legimus.	Rosacei.	A ltea, id est, malua syl- uestris.
Cærulei.	Teucion Fuchsi, Germa- ni gross Battengel.	Rosacei.	Althea officinis, bis malua.
Cádidis.	Vitis vinifera, floret circa solstitium cancri, floribus odoratis.	Lutei.	Anethi.
Purpurei	Veronica maris.	Candidi.	Anisi.
Lutei	Veronica femina mixti.	Aurei.	Ascyri flores.
purpura- scentes.		purpu- reis.	Amarantus floribus.
In pur- pura ru- bescētes.	Vitis Wicfen/floret Maio & Iunio mensibus, quæ lon- gè differunt ab Aphacis.	Luteis.	Amarantus floribus.
	Viola Trinitatis, de qui- bus & supra diximus, no- men à floribus desumptum est, sunt enim superius pur- purei, in medio candidi, in- ferius verò lutei, aspectu gra- tissimo, nullo odore, ab ali- quibus lacea dicta.	Cádidis	Anonis, siue ononis, alijs Restabouis, quod altis du- risq; radicibus aratores, me- dijs insuleis remoretur, Iu- lio & Augusto mensibus flo- ret, prima species floribus.
		Luteos.	Anonis, secunda species flores habet.
		Purpu- reis qui apparent	Anonis tertia species, flo- ribus omnes hæ mense Apris li è veteri, aculeato caudice regerminant, mox sublimes quosdam ramulos spinis vis- ridibus rigentes emittunt, in- fra autem thyrsulos acu- leos producentes, qui autum- no firmioribus spiculis per- ficiuntur.
		Iulio & Augusto mensib ⁹ .	Angelica fatiua.
		Candidi	Angelica syluestris.
		Purpurei	Apij palustris siue Eleose- lini.
		Candidi	Absinthij pontici.
		Aurei.	Arbuti flores racematim dependent, floribus candi- dis, paruis lilij conuallij vo- cati figura.
		Cádidis.	
			Attra-

35
QVO TEMPORE FLORES COLLIGENDI.

COLO- res.	IVLIO, SOL in Leone.	COLO- reis.	IVLIO, SOL in Leone.
Pallidi.	Attaçylis, hirsutior & hortensis vulgo Cardobene dictus.	Subrubei	Cannabis.
Purpurei	Anchusa, cuius aliquot species obseruentur, Germani vocant rot ochsenzungen/ omne genus in toto ferè caule purpureos explicat flores, à vulgari Buglossò non dissimiles.	Candidi Candidi Aurei. Cerulei. Candidi. Purpurei Purpurei Purpurei ruffescentes.	Coriandri. Cicutæ. Cnici. Cruciatæ. Ceparum. Campanulæ. Calaminthæ Dioscoridis. Calaminthæ montanæ, cuius tres sunt species, iuxta florum colores, de quibus postea in Gattaria dicemus.
Ceruleos	Buglossum magnum, Borago dicta flores habet.	Candidi	Chamelex, alij Mezereon.
Purpur: aut sub- rubetes.	Buglossi, vulgaris primi flores ostendit.	Candidi Candidi Candidi.	Cuscutæ. Capparum, flores muria asseruandi, antequam se ex- plicant.
Nigri- tes flores.	Buglossum vulgare secundum.	Purpu- reos. Luteis.	Chameleon, albus flores profert.
Purpurei	Bliti flores.	Subpurp:	Digitalis lutea floribus.
Lutei.	Botris.	Aurei.	Digitalis purpurea.
Purpurei	Cyani seu fabæ flores du- rant quadraginta dies.	Lutei.	Dictamni albi.
et candidi.	Ciceris nigri.	Pallidi.	Elenij circa finem mensis.
Purpurei	Cucurbitæ flores, statim in principio Iulij & circa finem Iunij mensis apparent.	Lutei.	Erysimi.
Candidi	Colocynthidis.	Subpur:	Eruca satiuæ.
Lutei.	Citreorum, Germani Ci- trinat blüß/calathi effigie ca- pillamentis, quibusdam è medio emergentibus, appa- rent.	Candidi	Eruca sylvestris, diu appa- rent.
Subpur: florere vi- dim⁹ in horto Il- lustrissi. comitū de Ho- henloe.		Lutei.	Elxine, id est, parietariæ.
Purpur: candic.	Cardiacæ flores mixti.	Purpur: reis.	Fœni graci. Fœniculi.
		Luteis.	Gattaria prima, Germani fäzen nep oder müntz. alio nomine Calamentha, flori- bus.
			Gattaria secunda flori- bus.

K 3 Gatta-

QVO TEMPORE FLORES COLLIGENDI.

COLO- res.	IULIO, SOL in Leone.	COLO- res.	IULIO, SOL in Leone.
Albis flo- ribus.	Gattaria seu Nepeta tertia species floribus pulegio si- milis.	Candidi.	Ocymi maioris.
Lutei.	Gnaphalij.	Candidi	Ocymi minoris, flores diu- tissime durant, incipiunt au- tem ab imo, & particulatim florent. legendi flores ante caniculæ ortum.
Cerulei.	Glyzerica.	Candidi	Ocymi Caryophyllati
Ceruleis	Geranium sextum cū flo- ribus.	Purpurei	Origani flores mixti, nempe.
Aureo, li- lij facie.	Hemerocallis, Germanis Heidenisch lilien/flore.	cadescentes.	Personatia, siue arcion, of- ficinis Lappa maior, folia habet cucurbitæ maiora ta- men, hirsutiora, nigriora & crassiora, caulem albican- tem, quanquam interdum vidua caule reperiatur. flo- rem ostendit. mense Iulio in capite echinato, Germani vocant groß fletten fraut.
Purpurei	Hyslopi.	Purpu- reum.	Personatia minor, folijs minoribus, mollioribus & mitioribus aculeis, alba qua- dam lanugine circum qua- dam obductis extat. hanc Plinius lib. 25. cap. 9. persolatam vocat, quæ minoribus est echinatis capitulis, cū flore.
Aurei.	Hypericonis: Sanct Joann- nes blumen.		Perfoliata flores gerit, è capitulis quibusdam prode- untes, & in stellæ modum ra- diantes foliosos, odore non ingrato, floret Iulio.
Sublutei.	Hypoxelinum, Germanis Libstuckel.		Petroselini vulgaris, id est, appij hortensis, Germani Peterle fraut/florem gerit Iu- lio & Augusto.
Candidi.	Helxine Cissampeli.		Pseuda-
Candidi.	Hyosciami albi, flores sunt.		
Lutei.	Hyosciami flau.		
Purpurei	Hyosciami nigri.		
Floribus	Lichnis, cuius flos æstas tem primo nunciat, ut testa- tur Plinius, ceu viola alba & purpurea: huius variaz sunt species, aliz enim sunt.	Purpu- reo.	
rosaceis			
vel pur- pureis			
vel can- didis.			
Lutei.	Linaria.		
purp. cad	Lentis sativæ.		
Sublutei.	Lathyris.		
Sublutei.	Lauri arboris muscosi, &	Aureos.	
Cerulei.	Lini flores vulgo noti, nepe		
Candidi.	Millefolij.		
Candidi.	Maioranæ.		
Purpurei	Maluæ hortensis.		
Purpurei	Marrubij siue præsij, ver- ticillato ambitu asperi, Ger- manis, schwarz endo:n.	Album.	
Lutei.	Nardi celtici.		

QVO TEMPORE FLORES COLLIGENDI.

COLO- res.	IULIO, SOL in Leone.	COLO- res.	IULIO, SOL in Leone.
Punicei.	Pseudapij flores sunt odorati racematim coherentes, quibus flaccescentibus siliquula oriuntur, in quibus semen concluditur, Germani vocant Erdnuß/ Erdseygen/ floret Iunio mense, & principio Iulij. hoc pseudapium longè differt à vero Apio Dios. lib.4. cap. 170.	Candidi Lutei. Candidi & sub- purpurei Cerulei.	Pastinaca minoris. Pastinaca erraticæ. Phu magni, id est, Valeriana, Germani groß Baldian.
Albis.	Petroselinum macedonicum floribus.	Cerulei. Lutei.	Pseudonardi maris, Germani; spicanardi blumen. Pseudonardi foemina/ Lauander.
Lutei.	Portulacæ domesticæ.	Candidis.	Raphanus hortensis, Germani Kettich/ Iulio mense floribus apparet.
Sublutei.	Portulacæ sylvestris.	Candidi	Ricini, vulgo cataputix maioris.
Rosacei.	Papaveris sativi.	Cádidis.	Rubix sativæ.
Lutei.	Peucedani.	Cádidis.	Rubix sylvestris.
Candidi.	Pimpenellæ saxifragæ.	Aurei.	Senæ flores veluti Brassicæ Iulio mense visuntur, cuius folia Glycyrrhizæ respondent crassa, subpinguia, fabarum sapore, caule cubitali, à quo ramuli exeunt in lori Modum flexiles, floribus emicat aureis, purpureis intercurrentibus ventosis. herba hæc græcis antiquis incognita fuit, distatque plurimum à Colutea, à Delphinio, à Pelicmo, à Peplio, ab Empetro, & tandem ab Alypo Dioscoridis.
Candidi.	Pimpenellæ maioris.		Scrophulariæ maioris.
Candidi.	Pimpenellæ minoris.		
Punceis.	Polygonum, floret usque ad Septembrem floribus.		
Luteis.	Potentillæ.		
Purpurei	Pisarum.		
Purpurei	Persicariæ.		
Lutei.	Pyrethri, flore Chamemelino non anethi umbella, ut Dioscorides reliquit.		
Albi.	Pulegij maris sativi.		
Purpurei	Pulegij foemina.		
Purp. cádicætes.	Potamogeti.		
Purpurei	Polij hortensis.		
Purpurei	Polij sylvestris.		
Lutei.	Pastinacæ maioris.	Purpurei.	Scro-

QVO TEMPORE HERBAE COLLIGENDAE.

COLO- res.	IULIO, SOL in Leone.	COLO- res.	IULIO, SOL in Leone.
Subrubei	Scrophularia minoris per aestatem ferè integram appa- rent.	Lutei.	Verbasci maris.
Candidi & pur- purei.	Smilacis hortensis, siue phaseoli.	Sublutei	Verbasci foeminae.
Candidis.	Smilacis levis, floribus in cacumine perpetuis multis rotundis, &	Aurei.	Verbasci sylvestris, omnes species Verbasci particula- tim florent, & incipiunt ab imo, ut scilla & hastula re- gia.
Lutei.	Teutli siue Betæ.	Albi.	Violæ matronalis, prima species.
Flores câ- didos.	Tordylium, quod aliqui sefeli creticum vocant, Ger- mani Berwurz / Fuchsius il- lud esse primum genus Dau- ci ostendit, folia foeniculi si- milis habet, minora tamen & tenuiora.	Punicei.	Violæ matronalis secun- da species.
Câdidi.	Thimelæ.	Candidi.	Viburni flores, Germani arbores hanc vocant <i>schlin- genbaum</i> / floret Iulio.
Lactei.	Telephij albi.		
Purpurei	Telephij purpurei.		
Lutei.	Tithymalli, genera omnia flores ostendunt luteos, præ- terquam marinum, quod al- bos habet flores.		
Flos dê- sus euas- dens in pappum seu lanu- ginem, Augusto mense.	Typhæ, Germani <i>Warren- folbenblûst</i> / hic flos cum adi- pe suillo vetusto & eloto ex- ceptus medetur ambustis.		
Candidi.	Vitis nigra odorati flos res &		
Candidi.	Vrticæ Romanæ.		
Purpurei	Verbenacæ maris.		
Lutei.	Verbenacæ foeminae.		

QVO TEMPORE FLORES COLLIGENDI

COLO- res.	AVGVTSO, Sol in Virgine.	COLO- res.	AVGVSTO, Sol in Virgine.
Purpurei Aurei. Puni- ceos. Ceruleos Florē ha- bet cādi- dū, tenuē & graue- olentem. Cādidū.	A Brotani maris. Abrotani fœminæ. Anagallis mas. Anagallis fœmina flores. Artemisia latioribus folijs Artemisia tenuioribus fo- lijs, florem habet. Artemisic tertia species. Ammi flores in umbella. Anisi. Ascyri. Attraxylis vulgaris siue Carchamus sylvestris, Germ: wild saffran. Asclepiæ siue hirundinarię. Aster atticus, à Matthiolo. Balsaminæ. Brassicæ. Centaurij minoris, Germ: sieber fraut. Cucumeris asinini. Euphrasie, Iulio Augusto & Septembri floret. Eupatorij adulterini, siue herbæ S. Kunigundis. Hydropiperis.	Cineritij & sub- candidi. Purpurei vel Ro- facei. Rosacei. Candidi Purpurei Purpurei Intus lu- tei extrin- sec ^o albi. Candidi Candidi Candidi Candidi Lutei. Aurei. Purpurei Aurei. Purpu- reis. Luteis. Cādidis. Cādidis.	Lupuli salictarij, Germaz ni Hopffen. Malux hortensis arboreæ, prima species. Malux hortensis, altera species. Myagri flores. Menthæ flores, tam hor- tenses, quam sylvestres om- nes apparent. Myrica. Matricariæ, siue parthenij hortensis. Sylimbrij hortensis. Sylimbrij sylvestris. Sylimbrij aquatici, Germ: Bachwurtz. Sylimbrij aquatici secūda species, Germ: Brunnen fress. Solidaginis Saracenicæ. Senetij maioris, siue flos S. Iacobi. Succisæ, id est, morsus Dia- boli. Tanacetij, Germ: Reinfarn/ quod supra pro parthenio mare posuimus. Antirrhinon, Germ: vocant Sterckblumen. Antirrhinon secundū florib. Antirrhinon tertium florib. Arbuti flores racematim pendent liliorum conualliū instar.

L SEP

QVO TMPORE FLORES COLLIGENDI.

COLO- res.	SEPTEMBRI, Sol in Libra.	COLO- res.	OCTOBRI, SOL in Scorpione.
Purpurei	A Sari flores vere & au- tumno legendi.	Candi- cantibus floribus.	E Rica, ex Theophrasto arbuscula est, multis à radice stolonibus, bis anno vere nempe & autum- no floret.
Aurei.	Abrotani fœminæ.		
Purpurei	Cnici flores, quidam cã- didi, quidam purpurei, ger- minant & florent post æqui- noctium autumnii, & deniq; uultum temporis. hæc Theo- phrast. & Plinius.	Flos in luteo cã- didus.	Scyllæ flores tertium, nunc sationis tempus ostendunt, Plinio teste lib. 21. cap. 17.
Cãdidi.			
Aureis.	Crocus, floret Vergillia- rum occasu per mensem ferè integrum floribus.		
Subpur- Purpurei	Colchici florecentis.		
Lutei.	Cyclaminis.		
Lutei co- loris.	Calthæ.		
	Conyza maior florem ge- rit fragilem, qui in pappum abit.		
Luteum florem ostendit.	Conyza minor, Germani vocant gelb münz / oder dü- wurz.		
Luteis.	Conyza media floribus.		
Cãdidis floribus.	Libanotis, siue Rosmarini frugifera, quæ fœmina dici- tur. Maio & Septembri men- se floret.		
Purpurei	Narcisci purpurei, Ger- mani zeytlosen.		
Herbacei Purpurei	Narcisci herbacei flores. Ocymastri flores.		

QVO TEMPORE FLORES COLLIGENDI.

COLO NOVEMBRI, COLO DECEMBER,

res

Sol in Sagitario.

Hedera nusquam non
virens, ex Dios. lib. 2.
cap. 171. cuius tres
statuuntur differentie. Can-
dida nigra & Helix, candida
fructum fert candidum, ni-
gra, nigrum, aut croci am-
lum, quam vulgus Dion-
sium vocat. Helix fructum
non fert, sed albas habet vi-
ticulas, & folia parva, angu-
losa & concinniora: Maior
porro quæ fructum profert,
& arborea hedera vocatur,
florere incipit ad finem au-
tumni, floribus.

Musco-
lis colore
pallido, e
quibus
hyeme
racemosi
eduntur
corymbi

Flos cro-
ci modò
nullis ad
huc ap-
parentis
b^o folijs.

Hermodactyli, veri flos e-
xitu autumnii, qui alio tem-
pore, Februario nimirum, &
primo statim vere, erumpit.

res.

Sol in Capricorno.

Elleboris nigri hortensis,
Germani Schwarz Garten
nieswurz.

L 2

Specie

QVO TEMPORE SEMINA SINT COLLIGENDA.

Specieatq; forma modo
adornata planta cum sit,
omniq; ex parte folijs,
floribus, carne, neruis, venis,
ossibus & medulla, ceu re-
cens ac tenellus fœtus, im-
modico humore conforma-
ta. Restat ut reliquo deinceps
tempore, ut caloris assiduo
siccior atq; aridior fiat, cum
ita firmentur, atq; semina
gignantur, quo aspirant &
eile, viuereq; natura deside-
rant omnia quæ mortali cõ-
ditione generata sunt. Quan-
quam autem fieri nequit, ut
id perfectè & omnino conse-
quantur, hoc tamen nacta
sunt, ut quodammodo sem-
piterna sint, non numero
quidem, verum specie, quæ
semper est æterna. Quapro-
pter immutabili æternitate,
continuantur viventium or-
tus et procreationes, ut quodd
singulari substantia seruari
nequit, specie saltem persi-
stat. Etenim vsu venit, ut v-
num quodq; indiuiduum,
cum mortale & dissolubile
se sentiat, aliud sibi simile
optet in locum suum repo-
nere, in quod & languidum
& inclinantem suam vitam
quodammodo conferat, & per
quod procreatione, quasi re-
puerascens, atq; renouatum
quodammodo perpetuam
fiat, & æternum: hanc dico

procreationem, & frutices
acceperunt, quos procreare
manifestum est, atq; etiam
nutriri & crescere, quæ ex
seiphs progignunt, semina
nullo alterius congressu, ceu
animalia. Semen igitur cum
pars plantæ sit, ex qua primò
oriuntur ea, quæ secundum
naturam constituuntur, non
quidem ut ex materia, sed ut
ex motus efficiente princi-
pio, quæ est forma ætherea, à
cœlesti spiritu orta & acqui-
sita, necessario igitur tempo-
ra, quibus singula semina
matura & absoluta sint re-
spicienda, neq; hoc solum,
verum & alia, præcellen-
tia & florente ætate, in quib-
us inest flos roboris, facul-
tasq; generandi quodque sit
absolutè coactum, costumq;
planeq; imitatur naturam,
plantæ arboris aut fruticis,
obseruanda. præterea in de-
metendis elaborandum, tam
quæ in siliquis ossibus, va-
sculis, corniculis, aut capitib-
us includuntur, quàm quæ
nuda proueniunt, aut quo-
rundam fructuum medulla
obsessa, ex fructibus videli-
cet summè maturis ubi sic-
cari cœperint, priusquam de-
fluant, ex stirpibus iam sic-
cis, nec amplius virentibus,
qui sanè in sole expendendi,
potissimum ex cucurbitæ,
cucu-

39
QVO TEMPORE SEMINA SINT COLLIGENDA.

cucumeris, & huius generis
fructibus, ut eorum omnis
caro exsiccetur, exempta au-
tem huiusmodi semina à
glutino lota, aliquantisper
soli exponenda sunt, quæ ad
annum vsq; vixq; ulterius,
perdurant, rangorem non
sentiant, nec diu soli æstiuo
committantur, ne exusta aut
evanida fiant, & si quæ sunt
reliqua, quæ ad colligenda
semina spectant, & de eorum
durabilitate, lege Theophra-
stum 7. de historia plant: cap.
6. Nos tantum hic paucis
admonere volumus, ut
Pharmacopolæ negligentio-
res exteris admonerentur de
præstantia & natura seminis
cuiusq; si legitimo tempore
colligintur.

FORMA
seminis.

Granisa-
deo pu-
sillis ac
minimis
ut atomis
cōpara-
ri possit,
ob id es-
nim egrè
perspici-
tur.

IANVARIO.

Sol in Aquario.

Cupressi fecunditas mi-
ra, trifera enim est, colligun-
tur eius coni mensibus Ia-
nuario Maio & Septembri,
semen ijs innascitur.

2 3 FE-

QVO TEMPORE SEMINA SINT COLLIGENDA.

FORMA.	FEBRVARIO, Sol in Piscibus.	FORMA.	MARTIO, SOL in Ariete.
			<p>Salicis semen Martio mense colligitur, antequam maturitatem sentiat, etenim semen amittit ocysimè, ob id Homero dicta est, frugi- panda, Plinio teste lib. 16. cap. 26.</p>

40
QVO TEMPORE SEMINA SINT COLLIGENDA.

FORMA. APRILI, SOL in Tauro.	FORMA. MAIO, SOL in Geminis.
<p>Sinapi non dissimili.</p> <p>Leucoion, siue viola alba, Germani weiß Merten blumen / semen in Aprili ostendit in capitulis.</p>	<p>Cupressi semen in conis quos ter anno edit, reperitur.</p> <p>Hyacinthi semen, circa finem mensis colligitur, semen leuiter extergit & adstringit.</p> <p>Mercurialis syluestris, siue Cynocrambe maris, semen maturefcit Maio mense.</p> <p>Paliuri semen, cuius frutex aculeatus & durus, Germani Walde disteln / in filiis quibus rotundis conclusum, lini seminis instar.</p> <p>Saxifraga maior siue alba, radicem habet exilem, cui granula Coriandri similia adherent, partim alba, partim rubea, quibus officinae pro semine eius vtuntur, colligunt Maio mense.</p>
	<p>IVNIO</p>

QVO TEMPORE SEMINA SINT COLLIGENDA.

FORMA	IVNIO, SOL in Cancro.	FORMA	IVNIO, SOL in Cancro.
Rufum.	A lleluiz, siue Trifolij acetoli semen in filiquis lunatis profert.	Pisi fere magnitudine ex viridi nigricates.	Polygonatum latifolium, Germani weiswurcz / Baccas floribus excussis producit, circa finem mensis & principio Iulij.
Nigrum.	Afari semen acino non dissimile, hoc mense & Septembri colligimus.	Rubea multa, exigua tamen.	Paeonia maris, semina siue grana in capsulis, profert acinis puniceorum similia.
Rufum.	Bulbi sylvestris semen non tantum in caulibus, verum etiam iuxta radicem nascitur.	Nigra, quinque nimirum aut sex.	Paeonia, foemina summo caule. filiquas emittit amygdalis similes, in quibus cum dehiscunt multa grana inveniuntur, mense Iunio & Iulio.
In filiquis exiguus, oblongum angustum & acuminatum.	Cerefolium, quod ab alijs falso Gingidium appellatur, Germani ferbelfraut / semen producit Iunio.	Seme disci figura exiguum minutum, & acutum, & hac ratione a semine pastoris differt.	Thlaspi graece, Capsula, siue scandulaceum latinis, tam latifolium quam angustifolij, Germani hoc besenfraut vocant / illud Bawernsenff oder fress / utrunque Maio & Iunio floribus & semine praegnans inuenitur.
Angulosum ac copiosum.	Caron, Germani fümich / semen in summo caulium nascitur, quinquennio non in efficax.	Seme in vasculis loculi speciem habentibus, profert.	Veronica, Germanis Eberpfeiff / mas & foemina, Iunio mense floribus & semine praegnans est.
Minutissimum est.	Filicis maris semen, quod auersis folijs inhaeret, ad finem Iunij maturefcit.	Seme latum & compressum in filiquis lentium modum.	Vicia graecis Biccia, Germanis wicken / floribus & semine Iunio mense praegnans est.
Racemosum.	Lunariae minoris semen.		
Nigrum & oblongum	Orminum satium, caule constat quadrangulo semicubitali, circa quem eminentiae filiquis similes prodeunt, ad radicem versus nutantes, in quibus semen est.		
Parua, rotunda, & fuluescentia.	Orminum sylvestre calyculis pluribus in terram inclinatis constat, in quibus ad summum quatuor semina reperiuntur.		

Viola

QVO TEMPORE SEMINA SINT COLLIGENDA.

FORMA.	IVNIO, SOL	FORMA.	IVLIO, SOL
	in Cancro.		in Leone.
Semē fo- liaceum, tenuibus quidem sed quin- cuncina- libus fili- quis cō- tinetur.	Viola alba, græcis Leucoi- on, Germanis weissen weyl/ semen inter æstatis initia profert. Viola lutea, Arabibus Cheiri dicta, Germanis gelb weyl.	Terna aut qua- terna ni- griora ta- men & minora, quæ sunt lentes. Atrum et parvū. Semen ex baccis rubescē- tib⁹ legi- tur co- piosum. Semē ha- bet durū candidū, rotundū, à medio umbilici modole- niter cō- cauum. Oblo- gum an- gustū & acumina- tum. Semen aniso si- mile al- bidius tamen. Semē spi- catū her-	A Phace græcis pariter ac latinis, vulgo sylue- stris vitia, & os mundi, Germanis wildt wicken / se- men in filiquis lentium mos- do producit. Aquilegiæ semen in Ca- psulis ostendit. Aspargus altilis, Germa- nis Spargen / circa finem Iu- lij mensis. Aparinæ, Germanis flebs fraus / officinæ & herbarij nonnulli Aspergulam hodie vocant. Cherrefolium, semen in si- liquis exiguis profert. Cicuta latinis, & officinis græcis Conion. Cyperus, Germanis wil- der galgas / minuta folia in M cacu-

QVO TEMPORE SEMINA SINT COLLIGENDA.

FORMA.	IULIO, SOL in Leone.	FORMA.	IULIO, SOL in Leone.
bacei coloris. Semē gerit p oia plantagini simile, circa finem mēsis et principio Augusti.	cacumine cum semine, Iunio & Iulio mense producit. Coronopus ex Diosc. lib. 2. cap. 123. herbula est per terram strata, fisis folijs, spicatis floribus, colitur in orto Illustrissimorum comitū de Hohenloe.	Semē ut in genera the- sta the- cis incluz- ditur. Latum cōpres- sum & foliaceū. Mollem colore puniceū.	Isatis sativa. Isatis sylvestris. Laserpitium Germanis cū officinis Magistrantia, semen circa finem Iulij mensis, & principio Augusti producit. Lilium conuallium fructū profert, asparago non dissimilem Iulio mense.
Rotundum lentis obtinens similitudinem. Siliquas habent breues in quib⁹ semē presum continetur. Semine lenticulis non absimili.	Coluthea semen producit in siliquis circa finem mensis, & principio Augusti.	Grana in siliquis, dura lata et ruffa. Grana 3. aut 4. exeunt. Semē rubrum & racemosum.	Lupini ter florent Maio, Iunio & Iulio, post vnumquemq; florem siliquas producant, in quibus continentur grana. Lolium in siliqua aculeata, cortice contumaci contenta. Limonium verum, cuius radicem officina falso Ben- rubrum appellant.
Ruffum.	Eruum ruffum. Eruum pallidum. Eruum candidum.	Nigro, p interual- la in cau- libus.	Marrubium latinis, praesum officinis, Iulio potissimum mense semine est praeg- nans.
Leue glutinosum ad spon- dij se- men accedens.	Genista, Germanis Genist/ in siliquis hirsutis, semen profert circa finem mensis. Genistella, Germ: Erdbpfri- men / oder Klein streichwurtz / semen in siliquis exiguis. Gentiana maior. Gentiana minor, vtraq; Iulio mense semen producit in calycibus. Iberis sine Nasturtium syl- vestre, Germanis wilden fress- sen samem.	Semē in calicibus orbiculatum. In sili- quis se- men val- de exi- guum.	Nasturtium hortense. Nasturtium sylvestre, tam- prima, quam secunda spe- cies.

Nym:

42
QVO TEMPORE SEMINA SINT COLLIGENDA.

FORMA.	IULIO, SOL in Leone.	FORMA.	IULIO, SOL in Leone.
In capil- lamenti nigrū, la- tū, den- sum & pingue. Herbace- m u, acu- minatū & trian- gulare. Acumi- natū & rubeum. Racemo- sum. Rufum.	Nymphaea alba. Nymphaea lutea. Oxylapathum folijs du- rioribus, & tenuioribus fo- lijs semen ostendunt. Oxalis seu acetosa. Bonus Henricus, herba est Oxalidis, semen profert. Papauer erraticum, tam primæ, quàm secundæ spe- ciei, circa finem Iulij mensis & principio Augusti. Pyrolæ in capillamenti semen. Pes anserinus, semen cir- ca finem Iulij ostendit. Sinapi lateum, filiquas profert rotundas ac hirsu- tas. Sinapi album, floribus ni- mirum albicantibus, crucif- que effigiem referentibus, fi- liquis teretibus & oblongis, refertis.	Striatum et oblon- gum. Semen p ramulos diffusum & rotun- dum. Semē in summis caulibus sylvestri ormino simile ge- rit vtraq; Spinulis horridū semen. Nuci si- mil quæ carytes nomina- tur Semē in- globulis tenue. Semen tenuius. In glo- bulis se- mine lini minore.	Sanicula, quæ Matthiolo est quarta species pentaphyl- li, semen producit. Saxifraga lutea, Germani gelben steinflee/profert. Salvia maior. Salvia minor, dicta autem latinis utraque est, quod ad multa, præsertim ad focun- ditatem salutaris sit. Spinachia, Germani Bis- netsch vocant. Tithymali Myrsi nitis se- men legitur cum hordeum turgescit, principio nimirum Iulij mensis, alternis tamen annis. Vrtica maior. Vrtica minor. Vrtica Romana, tempore messis semina vrticæ legen- da sunt, vtrum verò semen eligatur, non refert, quidam Romanum semper præfe- runt.
			M 2 AV

QVO TEMPORE SEMINASINT COLLIGENDA.

FORMA.	AVGVSTO, Sol in Virgine.	FORMA.	AVGVSTO, Sol in Virgine.
In filisq semen paruum. Semē nō habet co piofum ceu pri ^o . Semē ha bet rotū dum, ra cematim coherēs. Semē illi est oblō gum lu teum ca put Thyr si specie. Album. Semē aci no non dissimile profert. Tenue se men pro ducitur. In filiis atrum. Cōpres sum. oblongū et latum. Oblōgū.	A bsinthij seripij marini semen, quod à quibus dam cina appellatur. Absinthium fantonicum. Absinthium ponticum: o mnia hæc genera colligenda circa principium Augusti mensis, quo tempore semine abundant. Acanthus siue Acantha, semine abundat statim in principio Augusti mensis, & circa finem Iulij. Altheæ semen in calyculis. Asari à 15. die Augusti, us que ad 8. diem Septembris. Amaranti lutei in umbel la rotunda veluti Corym bris. Allerariæ. Attriplicis Domesticæ in folliculis. Anethi. Anisi semen adoratum, &	Latū pe ponū du plo mai ^o cortice solidiori et nucleo grādiori. In figura pistilli he ret croci colore. Foliatū semen & cortice obductū. Semē ra cematim pendet. Nigrum. Corticē copiosū racema tim de pendens. Semē in caulibus copios sum. Semē ni grum & striatum. Nigrū & striatum. In folli culis.	Anguriarum semen in fru ctibus, tanquam nucleus cō tinetur. Aaronis semen primum viride apparet, vbi mature scit croceum. Attriplicis hortensis. Attriplicis sylvestris. Anchusæ species, quarum tres obseruentur, semen o stendunt. Blittum album, et rubrum semen, singulis annis, ut in Beta ostendunt. Beta candida, mangolt: Beta nigra, rotter mangolt/ Beta rusta, rot ruben / ger mani vocant. Buglossum verum, vulgò Borago dicta. Buglossum sylvestre vtrumq; Blatteariæ semen. Betonicæ

QVO TEMPORE SEMINA SINT COLLIGENDA.

FORMA.	AVGVSTO, Sol in Virgine.	FORMA.	AVGVTSO, Sol in Virgine.
In spicato Thyrsos thymbræ modo.	Betonica purpurea semen.	Subrotundum siue oblongum & album.	Cardui Mariæ, Germani scabidistel / Semen cnico non dissimili.
Tenuemen. Candidum & rotundum.	Cassuta, siue cuscuta.	Nigrum. Semen in calycibus latum & oblongum profert.	Chelidoni maioris semen in filiquis. Digitalis lutea. Digitalis purpurea.
Hispidum. S. atrum in Calyculis.	Cnici, in fine mensis semina producit barbæ modum hirsutumq;.	Semine capitum cum maturitate nigrescit.	Dracunculi maioris. Dracunculi minoris.
Semina nigrum, paruum iuxta alas.	Chamelionis nigri. Chamedrys, utraque masculinum & femina.	Semine candidum hirsutum & acre profert.	Daucus creticus, qui folia fœniculi similia habet, sed minora, Germani Berwurtz.
Semina siue grana, lata compressa, arietis caput representantia.	Ciceris candidi. Ciceris nigri. Ciceris rubei, semina in filiquis duo concluduntur.	Semine oblongum in umbella, odoratum acre.	Daucus secundus, qui folia Laserpitio similia habet, aromatum modo odoratum, acre, gustanti odoratum & feruens.
In filiquis rotundis granis concluduntur Oblongis capitulis paruum.	Ciceris sylvestris.	Capite et semine anethi, oblongum sapore acre.	Daucus tertius, folijs Coriandro asimulatur.
Nigrum.	Cornopi sativi. Cornopi sylvestris.	Primum viride mox rubrum tandem nigrum ubi maturum.	Erithrodani siue rubie tinctorum semen.
	Ceparum semen nigrescere incipiens colligendum, color enim niger maturitatis signum est.		

QVO TEMPORE SEMINA SINT COLLIGENDA.

FORMA.	AVGVTSO, Sol in Virgine.	FORMA.	AVGVSTO, Sol in Virgine.
Asperū.	Elxine, id est, parietariæ.	Rotūdū	Hipposelinum, quod est
Nigrum.	Elenij.	nigrū sa-	vulgare leuisticum, Germani
Subhir-	Eupatorii semen.	pore acri	Libstüchel.
futum.		ingrati	
Semē in	Eruca sativa.	odori,	
filiquis	Eruca sylvestris, huius se-	friabile	
firmum.	men homines in Hispania si-	& squa-	
	napis vice, utuntur, est autem	molum.	
	ad ducendam urinam effica-	Nigro &	Hipposelinum Appollina
	tior, & multo quàm sativa	oblongo	ris, de sententia Dios. lib. 3.
	acrior.	acri soli-	cap. 62. in Corymbis semine
	Echium, Germani wildt	do etaro	turget.
Capiti vi-	Ochsenzungen / semina ha-	matico.	
perarum	bet.	Semē p-	
similia.	Esulæ maioris, siue pepli	ducit ca-	Hyoscyamus, officinis
Paruum	in capsulis profert semen.	didum.	Iusquianus albus, quo utun-
rotundū		Semen	tur medici solo.
& puni-		flauum.	Hyoscyamus flauus.
ceum.		Semen	
Subflauū	Fœni græci semen.	nigrum.	Hyoscyamus niger, tria
pingue.			hæc genera Dios. lib. 4. cap.
Foliatū	Filipendulæ siue Oenan-		50. notauit, quorum semina
cortice,	the semen habet.		colligenda sunt in fine men-
instar at-			sis, Galenus libro 8. simpl:
triplicis.			Flaua & nigra semina fugi-
In siliqs	Fabarum satiuarum ma-		enda esse præcipit.
grana	gnitudine differentes.		Hastula Regia siue Aspho-
subbro-		Nigrum	delus uerus, baccas profert
tunda.		& trique-	subrotundas herbacei colo-
Rotunda	Fabarum sylvestrium in	trum.	ris, in quibus semen conclu-
grana.	siliquis compressis.		ditur.
Granaha	Frumentum Saracenicum	Nigrum	Intybus maior, siue En-
bet tri-	quod nos Heydel vocamus.	& oblon-	diuia.
quetra ni-		gum.	
gra intus		Nigrum.	Intybus minor, siue Sca-
alba.			riola.
Latū le-	Gentiana maior.		
ue & glu-			Laetuce
tinofum.			

44
QVO TEMPORE SEMINASINT COLLIGENDA.

FORMA.	AVGVSTO,	FORMA.	AVGVSTO,
	Solin Virgine.		Solin Virgine.
Sem: omnibus oblongū in acutū de sinens album & nigrum.	Lactuca rotundum. Lactuca crispā. Lactuca capitata. Lactuca sylvestris.	Paruum rotundū subflauū	leporino pedi similib' admodum adstringentis gustus. Miliū Germ: <i>Wirsph</i> / Augusto mense demetendum, semen in iuba tereti & pendulo folliculo concluso.
Sem: paruum inter folia rotundū erui magnitudinis duritia lapidea.	Lithospermum, siue milium, solis satium maius. Lithospermum satium minus. Lithospermum sylvestre.	Exiguū, rotundū geminoꝝ rū testiculorum modo.	Mercurialis mas semen. Mercurialis fœmina, semē producit racemosum & multum.
Subrotunda.	Lens semina profert in siliquis orbiculata compressa.	Nigrum.	Melanthium quod et Cith officinis Nigella appellatur, German. <i>schwarz kumid</i> .
Nigro folido & oblongo fœniculo proximo.	Ligusticum, seu cum Galeno Libiscum ex Diosc. li. 3. cap. 49. nascitur semine.	Nigrum.	Melanthium secundū hortense floribus purpureis folijs Coriandrinis, ob id à German. <i>schwarz Coriander</i> nominatur.
Gustanti acri & aroma olenti.	Errant pharmacopzi hoc tempore plurimum, qui pro eo leuistico vulgari vtuntur, caulē alto, crasso, cauo & geniculato, semine ingrati odoris, squamoso & friabili, nō aroma olente. Cerna: libstüchel samē.	Flauum.	Melanthium citrinum, cuius semen officinis incoꝝgnitum.
Subflauū cōpressum.	Linum vellitur Augusto mense intumescēte semine, & flauescēte colore. Iagopus, semen in panniculis muscolis lanuginosisq;	Semē in siliquis striatis foris nigro amaro in odoro.	Melanthium sylvestre, ab alijs pseudomelanthium.
		Paruum rotundū flauū, rotundū in fra amplitudine sinapis. cuius dūtaxat vsus esse debet.	Maiorana. Melilotum verum, siue fertula campana, semen in tenuibus corniculis includitur.

Ocyz

QVO TEMPORE SEMINA SINT COLLIGENDA.

FORMA.	AVGVSTO, Sol in Virgine.	FORMA.	AVGVSTO, Sol in Virgine.
Semen parvū & nigrum, cui et cortex obducitur. Odoratū amarū.	Ocymum maius. Ocymum minus. Ocymum cariophylla. tum.	Nigrum in calycibus.	Papauer sylvestre, quoddā nonnullis philitis appellatur à quibusdam verò Rheas, semen producit.
Grana in siliis sese inuicem stipant. Semē in spica tenuē profert.	Peucedanum Macedonicum semen habet, petroselinum hortensi non dissimile.	Semē leuem in uersione habet veluti fœnū græcū, ut bouis cornu videatur esse.	Est & papauer sylvestre secunda species, de qua Theophrast. 9. historia plantarum cap. 13.
Semina dauco similia producunt.	Pisi maioris. Pisi minoris.	Verficolor.	Papauer Spumeum, alijs Heradium et Corniculatum, siue ceratites.
Semen Getta vocato, simile.	Plantaginis maioris, minoris & longæ.	Semine duplici rotundo scutulo rum effigie odorato subacri.	Smilacis hortensis semen.
Septē, 8. 10. aut plura habet cicerum magnitudine.	Pastinaca sativa & sylvestris.	Triquetrum.	Seseli creticum, Tordylium dictum, recentioribus Siler montanum, ex Diosc. lib. 3. cap. 51. multiplex est: nempe Massiliense folijs fœniculi. Peloponese folio cicutæ latiore & crassiore.
Pellucidum & nigrum.	Personatia officinis Lappa maior.	Que corculi figurā planē referant, ex nigro subuirescentia.	Staphisagria semen.
Semē candidum et rotundū.	Phaseoli, grana in siliis aut inuolucris.		Senæ Alexandrinæ, ex Thecis oblongis lunatis tenui pedulo pendentibus semen legitur, semina intus in ordinem digesta sunt.
	Perfoliatæ semen.		Stæchas
	Papaueris sativi candidi, cuius plantam Thiliacem vocant.		

45
QVO TEMPORE SEMINA SINT COLLIGENDA.

FORMA.	AUGVSTO,	FORMA.	SEPTEMBRI,
	Sol in Virgine.		Sol in Libra.
Triquetrum coloris spadicci.	Stachas uel stichas, principio ferè mensis Augusti, spicis flavescentibus semen reperitur copiosum.	Tenne numero sum.	A Brotani maris.
Rotundū & cādidum.	Spinæ albæ semen Cnico simile.	Rotundū et minutum.	Artemisia latifolij.
Oblongū nigrū acre odore Myrrham referente.	Smyrnium semen in umbella gerit anethi modo, semine brassicæ maiore.	Acinosum.	Asari semen.
Semina in capitulis minuta.	Sagittæ maioris.	Rotundum & circinatum.	Anagallis mas.
Latū & compressum.	Sagittæ minoris.	Oblongum odoratum.	Anagallis femina.
Subrotundum.	Sphondilij sylvestris semen sapore ingratum, in foliis.	Paruū rotundū & subflauū.	Anisum folio & flore vsq; adeo fœniculi æmulo ut oculis illius gustu atq; odoratu intuscat, semine tamen minore.
Semen milio nō dissimile paruū & nigrum.	Tinctorii semen.	Oblongum & plumosum semen.	Amaranti purpurei semen.
Rotundum et odoratum.	Trifolij odorati.	Granula.	Asclepia, semen in folliculis longis, quæ cum dehiscent ostendunt.
Racemosum nigri plumis quasi vestitū.	Thymbra Dioscoridis.	Oblongum & squamosum.	Alnus, Germani Erlebaum cuius semen.
	Thymbra alterius generis, ambo hæc Satureia vel cuius nulla dicuntur.	Semē nigrum & resinam obolens.	Anonis siue Ononis in liquis fert.
	Vitis Nigræ, barbæ canæ effigiem præbens, semen initio herbaceum, ubi verò maturuit.	Nigrum punctis depictū.	Ascyrum hyperici genus.
			Androsami, semen in calyculis papaueris nigri Dios.
			N Acatia

QVO TEMPORE SEMINA SINT COLLIGENDA.

FORMA.	SEPTEMBRI, Sol in Libra.	FORMA.	SEPTEMBRI, Sol in Libra.
Lupino simile in folliculis Semen lenticula min ⁹ fert autūno in oculis cōnexis, cernum quater numē capacib ⁹ . Verū am- ma semē ac re & amaru- culū fit petro se- lino exi- liore.	Acacia, quæ nascitur in Æ- gypto, spina instar arboris fruticosa, semen. Acacia altera, quæ in Cap- padotia, Pontoque provenit, Ægyptiæ spinæ similitudine longè minus, tenerius, humi- le, aculeorum vallo muni- tum, folia habens acuta, se- men in autumnno legitur.	Atomis simile, ut vix cōspi- ci possit. Candidū plenum grandis usculū. Album pilis bar- batum.	Cypressus, tertio nunc co- nos profert, in quibus semen continetur. Cnicus hortensis semen profert, cortice tenui, medul- la vinctuosa & pingui. Cnicus sylvestris seu At- tractylis, prima species fru- ctum nigrum producit, in quo semen continetur. Alter Cnicus sylvestris, seu Attractylis secunda species, vulgo Cardobenedictus ma- turus est in Augusto mense. Coriandri semen.
In filiqs rotunda & parva Subrotū- dum ac paulò a- cumina- tum. Racemo- sum. Panico sylvestri simile.	Ammi, cuius genituo Am- meos officinæ vtuntur. Phar- macopœi pro Ammi varia semina ostendunt, nonnulli semina parua, oblonga & te- nuia habent, alij similia fœ- niculo, alij petroselino vul- gari adeo æmula ut vix visu internosci possint, nisi gu- stum consulamus, alij maio- ra cumino & nigra, quæ par- ua sunt & passim videntur. Brasica sativa capitata, & levis semina producant. Bryoniæ semen in acinis delitescit, glutinoso succo immersum. Borris circa ramulos. Blitum fatuum atque insi- pidum olus, in caecuminibus fert semen.	Rotūdū ac nudū. Rotūdū. Tritico simile. Oblōgū & nigrū. Longū nigrum. Copiosū tenue, ut in Hele- nio. Magnū, latum, a- mygdali- ni nuclei figura. Subni- grū instar capituli.	Cannabis sativa semen. Centaurij minoris. Caltha semen ostendit. Caryophylli Indici mai- oris. Caryophylli Indici mi- noris. Cucurbitæ sativæ, tā longe q̃ rotunda semen, in ipso fru- ctu cōtinetur, dulce & suave, maturū circa finem Septem- bris & principio Octobris. Cichorei sylvestris & re- rucarij. Erysimi semen in cornis- culis paruum acre.

Fœni-

46
QVO TEMPORE SEMINA SINT COLLIGENDA.

FORMA.	SEPTEMBRI,	FORMA.	SEPTEMBRI,
	Sol in Libra.		Sol in Libra.
Craſſius anetho et gustui magis bladiens.	Foeniculum secundo anno a satione semen profert.	Nigrum durūq; Latum.	Pſilij semen pulicibus simile.
Nigrum. Racemosum.	Hiperici semen in siliquis hirsutis.	Nigrū in herbaceis caliculis cōtinetur Semine in modū mori rubri.	Pyrius lenticula modo semen.
Acre & rubeum.	Hydropiperis albi.		Portulacæ hortensis.
Rotunda maiora eruis, q̄ eū corticib⁹ exuuntur, cā dida sunt & gustu dulcia.	Lathyris fructum fert in summis ramis, tribus loculentis distinctum, rotundū, ceu capparim, in quo terna sunt semina putaminibus inuicem discreta.	Durū qd difficile euellitur Lentum pingue siliq; cōclusum.	Portulacæ sylvestris.
Paruum.	Lepidium semen profert.	Album.	Pimpinellæ maioris.
In forma umbilici numero sum semen cōtinetur.	Malux hortensis.		Pimpinellæ minoris, vtraque hæc planta, quibusdam sanguisorba, alijs solbastrela dicitur, herba elegans & perpulchra.
Candida & hirsuta.	Malux sylvestris.	In vuis racemis; q; asperis cortice nudatū.	Peryclymenon vulgò maior sylux, semen habet.
Semē in siliquis.	Napi flauī semina, quæ Germani steck ruben samē vocant.	Rotundū ruffū & saporea cutū, rapi napiq; semine cū min⁹ tum etiā durius.	Paliuri arboris Theophr. semen legit, libro 3. de hist. plant. cap. 19. autumnio.
Semē in siliquis. Candidū & hirsutum.	Napi candidi semina, quæ Germ. weiß steck ruben samē appellant, vel alio nomine trucken steck ruben.		Rutæ hortensis in angulo; sis calycibus semen continetur.
	Napi sylvestris semina, q̄ germ: naß steck ruben vocant.		Ricinus, cuius semen officinæ Cheruam maiorem vocant.
	Pastinacæ satiuæ semen.		Raphanus satiuus primus cuius semen in siliquis tumentibus, rapo quadruplo maioribus in mucronem delinentibus continetur.
	Pastinacæ sylvestris.		

N 2 Ra-

QVO TEMPORE SEMINA SINT COLLIGENDA.

FORMA. SEPTEMBRI,	FORMA. SEPTEMBRI,
Sol in Libra.	Sol in Libra.
<p>Raphanus sativus secundus, radix minus crassa, longè durior, acrior, & gustui ingrator.</p> <p>Raphanus Rusticanus, siue vulgaris, à Romanis Armoratia vocatus, folijs sativo similibus ferè, sed magis Lamplanæ amulis. Fuchius vulgato nomine Bren oder M. rretich/ vocat, sed falso.</p> <p>Rotundū, albu, durū, operitū lanugine, lib. 2. r. cap. 4. Plin. test. Nigrum</p> <p>Rosarum semen continetur in ipso fructu, & legitur cortice rubeo ubi maturuit.</p> <p>Nigrum</p> <p>Symphytum maius, quod alio nomine pectron appellatur, semen veluti verbasci ostendit.</p> <p>Nigrum paruum lupino simile.</p> <p>Nigrum. In alijs exiguum</p> <p>Mentha Romana, semen Syacré erucæ instar.</p> <p>Rufum rotundū acuminatum.</p> <p>Rotundū et rubrū.</p>	<p>Tithymalorum semina autumnò leguntur, quorum genera sunt.</p> <p>Charatiq; semen in capitulis, alternis tamen annis.</p> <p>Paralij semen.</p> <p>Cyparissij siue Esulæ minoris, in capitulis semen.</p> <p>Helioscopij semen.</p> <p>Dendriformis.</p> <p>Platyphylli.</p> <p>Tiliae foeminae, semina in baccis orbiculatis continentur, quæ siccata sole, leviser tunduntur, feruescuntq; loco mundo reponuntur.</p> <p>Verbasci nigri & sylvestris.</p> <p>Verbasci albi semen, ex Dioscoride lib. 4. cap. 89. hæc differentia duæ summae habentur in quibus mas & foemina intelliguntur.</p>
<p>Rotundū cādidū.</p> <p>Simile eruo.</p> <p>Rotundum.</p> <p>Rotundū.</p> <p>Oblongū.</p> <p>Paruum.</p> <p>Rotunda.</p> <p>Nigrum.</p> <p>Album.</p>	<p>Rotundū cādidū.</p> <p>Simile eruo.</p> <p>Rotundum.</p> <p>Rotundū.</p> <p>Oblongū.</p> <p>Paruum.</p> <p>Rotunda.</p> <p>Nigrum.</p> <p>Album.</p>
<p>Syderitis.</p> <p>Sylimbrij hortensis, vulgo</p> <p>Mentha Romana, semen Syacré erucæ instar.</p> <p>Sorgi, Cermani Welschen Hirsch semen.</p> <p>Sparula foetida, in siliquis profert.</p>	<p>Syderitis.</p> <p>Sylimbrij hortensis, vulgo</p> <p>Mentha Romana, semen Syacré erucæ instar.</p> <p>Sorgi, Cermani Welschen Hirsch semen.</p> <p>Sparula foetida, in siliquis profert.</p>

OCTO.

QVO TEMPORE SEMINA SINT COLLIGENDA.

FORMA OCTOBRI, SOL FORMA OCTOBRI, SOL

in Scorpione.

in Scorpione.

Subalbidum.

A Bies, græcis ἐλάτη, germani Tannen / legit semen Plinius, lib. 16. cap. 26. post Vergiliarum occasum.

Nuclei ob longi duris putaminibus conclusi, interior nucleus nui tunicæ circumtegitur flauo colore.

Piceæ.
Pini domesticæ.
Pini sylvestris Idææ.
Pini sylvestris maritimæ.
Pini sylvestris Mægæ diæta.
Pini sylvestris Crembo diæta, Germani Harzbaum / Fichtebaum / oder Föhholz.

Semine nigro, melanthio seu nigellæ simile.

Ocimastrum, quod Germanis wüldr Basilig appellatur Plinio lib. 20. cap. 13. attestante. folia habet Ocimo similia, filiquas hyoscyamo perlimiles.

Cnici figura, la nuginosum.

Scolymus, latinis Carduus dicitur & Strobilus, Columellæ cinaria. Germani Articoea oder Strobilär dem nominant, semen ostendit.

N 3

NO

FORMA. NOVEMBRI, FORMA. DECEMBER,

Sol in Capricorno.

FRaxini semen, quod alio nomine Orneoglosson, siue lingua auis, Germanis Stein esfern dicitur, initio Nouembris decerptum, & in furno siccatum datur, perquam vtiliter calculosis ex veteri vino.

Libanotis fœminæ frugi-
feræ, cuius semen canchrys
vocatur.

Candiz
dum &
latum.

Januario

QVO T M P O R E F R U C T V S C O L L I G E N D I .

FORMA.

IANVARIO,

Solin Aquario.

Fructus,
crassus,
durus &
cōpactus

Quęante
maturita
tem vire
scunt &
deinde
nigrū co
lorē con
trahunt,
mense
Ianuario

Baccę
subrotū
dę, q̄ aut
ē viridi
nigre
scūt, aut
ē viridi
albescūt.

CVpressus vel Cyparissus, rustica & urbana plebi notissima arbor, ter in anno frugifera est. Ianuario, Maio & Septembri, de qua Plinius lib. 16. cap. 27. & Diosco. lib. 1. cap. 77.

Hæderę arboreę Corymbi racemosi eduntur, ligusticinis grandiores,

Lauri Baccę, Ianuario Aquilonis afflatu siccantur, expandunturq; rari ne calefiant aceruo. Plinio attestante lib 17. cap. 10.

Pini fructus, nullo non mense maturescit, quo enim mense ex ea nux decerpitur, eodem maturescit & alia, & sic dispensatur toto anno, hæc Plinius.

FORMA.

FEBRVARIO,

Solin Piscibus.

MAR

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.
 FORMA. MARTIO, SOL FORMA. APRILI, SOL

in Ariete.

A Mygdala, quæ et nux
 Græca dicitur, ex Dio-
 sco. lib. 1. cap. 139.
 duplex est, alia amara, quæ
 medicamentis, alia dulcis,
 quæ cibo idonea est. Dulcis
 in Macedonia & Ægypto,
 Plinio attestante lib. 16. cap.
 25. matura est Martio.

Racemo
 sum, fru-
 ctu folli-
 culo, cor-
 niculi
 modo in
 torto, in
 quo in-
 cluditur
 liquor
 limpidus,
 qui tan-
 dem ve-
 terascens
 vertitur
 in bestio-
 las ijs per
 similes
 quæ ex Vl-
 mi et The-
 rebinthi
 folliculis
 euolant.

Lentiscus, ter in anno fru-
 ges fundit, ut Ciceronis ver-
 ba referam.

Iam verò semper viridis,
 semperque grauata.

Lentiscus, triplici solita
 est grandescere fœtu.

Ter fruges fundens, tria
 tempora monstrat arandi.

in Tauro.

S Alicis fructus in princio
 pio mensis colligendus
 est, ante maturitatis gra-
 dum, vel ut Plinius testatur,
 antequam in araneam abeat,
 ocysimè etiam perdit fru-
 ctum, ob id ab Homero fru-
 giperda dicta est.

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA.

MAIO, SOL

in Geminis.

Crassa
duraatq;
cōpacta.

Rubex,
Albz &
molles
sunt.

Orbicu-
lata &
præssa.

CVpressus arbor, secun-
do nunc fructum ma-
turat forma.

Fragaria, fructus suauitate
commendata, gustu Maio
mense aridente, biliosis æstu-
antibusq; ventriculis & siri-
culosis, non leuis commodi,
Germ: Erdber.

Lupini, ter siliquas in an-
no producant, Maio Iunio
& Iulio, in quibus grana 5.
aut 6. membranis distincta
continentur.

FORMA.

IUNIO, SOL

in Cancro.

ARmeniaca, q̄ & Chry-
somela, id est, aurea
mala, quanquam &
cotoneo competant, vti &
citrio ex Atheneo lib. 3. ca. 5.
à latinis præcotia dicta, eo
quod ante alios fructus fus-
gaces sint, & cum alijs ho-
reis fructibus maturescant.
eorum quædam sunt mino-
ra, quæ Germana appellatio-
ne vocamus Amarelin. Quæ-
dam maiora, inter Persicum
& Armoniacum media spes-
cies, subfulua, carnosâ, odo-
risq; Persici sunt, Germani
S. Ioannes Psirsing.

Orbicu-
lata &
præssa.

Fructum
racemos-
um foli-
culis
cornicu-
li modo
intortis
ostendit.

Lupinorum fructus, in si-
liquis grana, 5. aut 6. mem-
branis distincta, reperiuntur
in fine mensis & principio
Iulij.

Lentiscus arbor est in Chio
Insula, ex qua resina lentisci-
na, vulgo Maltix. græcis Ma-
stiche, resudat Diosco. auto-
re lib. 1. cap. 75.

Myrtus ex Dios. lib. 1. cap.
228. sativa, nigra, utilior est
medicinæ, quàm candida, &
in hoc genere multò magis
montana. semen tamen im-
becillius parit. Dux itaque
Myrti species, altera candida
comparata, nigrescens, alte-
ra ni-

O ra ni-

FORMA.

IUNIO, SOL

in Cancro.

Baccas
ferūt ob-
longas,
agrestes
oleas
quadan-
tenus re-
ferentes,
multo sa-
nè sylue-
stribus
maiores.
Colore
& mag-
nitudine
iuniperi-
no non
abfimi-
les, vino-
sum &
austeriu-
sculum,
et in sum-
mitate
cōcauū,
vmbili-
ciāe mo-
do.

Baccæ fla-
uæ & sub-
dulces.

ra nigra respectu, albicans &
in purpuram pallescentes.
Satiæ sunt & sylvestres v-
triusq; coloris.

Satiæ sunt Myrtus exo-
tica, Myrtus Romana.

Myrtus, Tarentina quæ in
arbores facile adolefcunt ra-
mis flexibilibus, ac lentis.

Myrtus sylvestris, Germa-
ni vocant Heydelber/ oder
Schwarzber/ fructum fert.

Vua crispa, vulgo spineo-
la, veris initio statim pube-
scens, postea flore atq; acinis
candicantibus, primū acer-
bitate grata herbacei coloris
per maturitatem flauescen-
tibus granosis translucidis
cum dulcore, Germani vo-
cant Blosserber.

FORMA.

IUNIO, SOL

in Cancro.

Solamum, Somniferum
secundum, quod Matthiolus
pingit lib. 4. cap. 69. supra
Diosc. folijs angustis, caule
anguloso, floribus tintinabi-
li figura subpurpurascen-
tibus in ambitu denticulatis,
flore Maio mense, Baccas
maturat Iunio & Iulij prin-
cipio.

IULIO

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA

IULIO, SOL

FORMA

IULIO, SOL

in Leone.

in Leone.

Fructus
prodeunt
Perfico-
rum for-
ma, sed
aureo aut
luteo, co-
lore cum
purpura
mixto.

Baccas
rubentes
longo pe-
diculo
dependen-
tes, duro
intus los-
siculo
pili mag-
nitudine
aut mai-
ore, in q̄
nucleus
conclu-
ditur, sub
amariu-
sculo sa-
pore.

Grana 5.
aut 6. me-
branis di-
stineta.

Fructus ni-
ger &
mollis,
sanguis-
neusq;
succeople-
nus.

Armonica maiora, graecis *παραμόνια*, unde *παραμόνια* dicta sunt, Germani Sancti Johannes p̄firsing/ ut supra diximus.

Cerasus arbor notissima, Germani Weichselbaum/ profert baccas rubentes. Genera cerasorum ex fructus colore, duritie, gustu fortiuntur nomina, ut Plinius lib. 15. cap. 25. testatur. Alia dulcia, alia subamara, alia austera, alia acida, alia insipida reperiuntur. De ceraso lege & Theop. 3. de hist. plant. cap. 13.

Lupinus, tertio nunc filiquas producit in quibus continentur.

Morus ex Diosc. lib. 1. cap. 143. arbor duplex est Nigra quae & celsi dicitur: & candida. Nigra rursus duplex, sylvestris arbor, quae batos, latinceo ple-
tinis rubus dicitur, de qua

Diosc. 4. ca. 33. cuius fructibus Iunio & Iulio mensibus vescimur, Ger: Bramber vocat, Domestica arbor Mora in fine aetatis p̄fert, Germanis Maulber.

Rubus Idaeus, graecis *Ἰδαίος* fortassis ab Ida monte de nominationem cepit, quod ibi copiosissimus habeatur, nascitur & nostris regionibus, breues spinas habet et tenellas ipsa arbuscula, tenella etiam & flexili existente, fructus Hindber/ vocatur a Germanis, extrema aetate, maturi decerpuntur. Sic de ijs Horatius, 2. sermo num Satyra. 4. illa salubres. Aetate peraget: qui nigris prandia moris Finiet, ante grauem quae legerit arbore tolem.

Alba siue candida antiquorum, nemo recordatus est solo excepto Ouidio: de qua infra dicemus.

Ribes ex Serapione, auctore Isach, est planta, proferens capreolos, recentes rubeos ad viridem inclinantes, grauis praedita dulcacido gustu, Germani Johannes berle/ vocant, Iulio mense potissimum leguntur.

O 2

AV-

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA.

AVGVSTO,

Solin Virgine.

Primo
virides,
deinde
ruffesce-
tes & ro-
tunda.
Flaua,
plani in-
regri nō
erosa le-
ues, intus
cādidis-
simē.
Rotunda,
magna
aureo co-
lori.

A Sparagi altis siue hor-
tensis, baccas cum se-
mine legimus æstate.

Amygdalarum dulcium
fructus vulgo vbique noti,
sunt verò German. Mandel-
fern.

Amygdularum amararū,
Germ: Butter mandel fern.

Aurantiarum mala, fulgo-
ris auri æmula, ideo aurea dis-
ta sunt, quibusdam auran-
tiæ, quod in eum inclinent
colorem, qui vulgo ranzo
dicitur, aut verius ab Aran-
tia oppido Achaia, ut ex Her-
molao, 5. sui corollarij cap.
422. videre licet, Germani
vocant Pommeranzē öpfel.

Pregnan-
diamala,
instar me-
lonum,
herba-
ceo virē-
tia colo-
re.

Adami poma, Germani
Adams öpfel.

Fructum
extube-
rante pō-
deroso
herbaceo
colore
maculo-

Anguriarum, Germani
vocant Gurken / viridis aut
verius, ex viridi & subpallio
do interstinctus fructus: ob-
longus insipidus cum lauo-
re, semine rubicundo,

FORMA.

AVGVSTO,

Solin Virgine.

so tamen
ea parte,
qua hu-
mi iacet
albicāte
carne in-
tus hu-
mida &
aquosa.
Calyce
fimbria-
to, rotun-
do, nu-
cleo mol-
li intesta
barba.

Vtriusq;
fructus
imaginē
longē py-
ri referūt
suntq; in
glandib;
lōgē mai-
ores: in
rotunda
vero ro-
tundio-
res, pau-
loq; mi-
nores spe-
ctantur.

Vesicam
hali caca-
bi veru-
cosam,

Auellana nux græcis pon-
tica, ut latinis pranestina, ex
Diosc. lib. 1. cap. 161. ut etiam
Avellanae atque edomita,
Germ. Haselnuß / quædam
sunt sylvestres, & hoc mense
maturescunt.

Aristolochia rotunda.

Aristolochia longa.

Aristolochia clematidis,
hæc rara admodum & pau-
cis nota est, duz priores sunt
notissimæ.

Balsamina siue Viticella
mas, Germani Balsam fraut/
planta, visu pulcherrima,
hortorū cameras fenestrasq;
per

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA.

AVGVSTO,

Sol in Virgine.

utrinque per cancellos tegit, fructum
turbina- maturat & perficit, Augusto
tā, in qua & Septembri mensibus, quē
semē ma & Hierosolimitanum po-
tunitate mum vocant.

dissilit,
inanitate
confras-
tum ap-
paret,
nūc can-
didū nūc
rubrū &
rotundū,
vna ex
parte co-
loris ni-
gri, cor-
dis effi-
giem ex-
primēs.

Fructu
oblongo
& macu-
loso.

Oblongus
non ma-
culosus,
sed flauus,
semina
intus ha-
bet lata
& alba.

Cucumer sativus latinē,
σίχυς ἡμερῶν & artice, communis
multis generibus dictio,
de quo Theophrastus 7. histo-
plant. cap. 4. primo intelli-
gimus genus, quod vulgo
cucumer vocant.

Cucumis sativus, Turcicus
sive peregrinus, priori multo
maior ac procerior, Germa-
ni Citrulen appellant, quasi
citrinum,

FORMA.

AVGVSTO,

Sol in Virgine.

Fructus
rotundus
semina
minora
habet, quā
priores
cucume-
res.

Fructum
rotundū
herbacei
coloris,
semina
in rufo
atra.

Baccas
oblongas
olivæ mo-
do fert
primò vi-
rides tan-
dem per-
maturita-
tem ru-
bescunt.
Racemosus
rubescens.

Colore
primum
herbaceo
et cum e-
maturuit
croceo.

Cucumis Marinus, Ger-
mani Meer cucumer / officii-
nis incognitus.

Cucumis citrulus dictus,
Germanicè Citrulen.

Cornus, vulgò cornalo ex
Theoph. 3. de hist. plant. du-
plex, quaedam mascula, quæ
dam foemina, Mas per alta-
tem, foemina autumnò fru-
ctum perficit.

Dracunculi maioris fru-
ctus, in summo caule, colo-
ris primum cineritij, mox
per maturitatem in crocum
& purpuram vergens.

Dracunculi minoris fru-
ctus, summo caule racema-
tim cohæret.

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA.

AVGVSTO,

Sol in Virgine.

Rotundas
baccas.

Effigie
humani

unguis
colore

nō simi-

plici, sed

aut ful-

uo, aut

nigro,

aut her-

baceo,

aut coc-

cino.

Molli

pulpa

granis in

numeris

referta.

Velicas

perferens

colore

primum

herbaceo

mox pau-

latim ru-

bescen-

turbinat-

tas, semē

Erica baccifera, Germanis
Scyden / arbor fruticosa, ex
Diosc. lib. 1. cap. 100. descri-
bitur Myrica similis.

Fabarum, in siliqua ple-
rumq; semipedali, contine-
tur intus fructus.

Ficus maturescunt Iulio
Augusto & Septembri men-
sibus. Sicca officinis carica
appellatur, ē Mafsilia & Pi-
ceno aduecta sunt, ceteris
prastatiores: parua quidem,
sed gustu suauiores.

Halicacabi velicarij fru-
ctus, officinis Alkekengi A-
rabum exemplo, Germanis
Judendocfle vocatur, qui nō
nisi autumnō maturescunt,
sæpe etiam (pro clementia
cœli et soli) in fine Augusti.

magnit:

assimile.

FORMA.

AVGVSTO,

Sol in Virgine.

Hali cacabum peregrinū,
qd̄ describit Matthiolus lib.
4. comment. supra Diosc. cap.
69. profert velicas virides, tes-
mine intus pullo erui ma-
gnitudine aut paulo maiore,
in cuius latere veluti huma-
ni cordis effigies visitur.

Hippoglossum Matthioli,
quod Fuchsius pro Daphni-
de Alexandrina posuit, pro-
ducit.

Rotundū
fructum
pediculo
longo ap-
penitum
in medijs
folijs.

Grana ex
albo fla-
uescētia
et amara.

Poma
oblonga
cute non
crassa,
ceucitre
flauo cor-
tice con-
tecta suc-
co præg-
nantia,

Lupinorum in siliquis.

Limoniæ pomum,
Germani Lemonen / et si Li-
monia tum facie tum facul-
tate citria referant, attamen
citrijs sunt minores.

Melones, qui & pepones,
& Melo pepones, confusane
proferuntur, ex Gal. 2. alim.
facul: cap. 4. & 5. & Paulo
Ægineta lib. 1. cap. 80. inter
se differunt figura & quanti-
tate, ut quum quantitate ex-
cellerint pepones dicantur,

Germa.

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA.	AVGVSTO,	FORMA.	AVGVSTO,
	Sol in Virgine.		Sol in Virgine.
Rotundi mali co- tonei for- mam fe- re refe- runt.	<p>Germani Pseben, Cum verò rotundam formam mali effigie adepti sunt Melo pepones. Germ. Melaon.</p> <p>Mora batti, Germani Hindber.</p> <p>Mala mustea. Germ: vocant Honig apffel.</p> <p>Cæterum hoc loco de pomis, quæ & mala vocantur obiter notandum est. siquidem de ijs mentio frequenter incidet. Mala siue poma quæ nos appellamus, græci μήλα, Germ: Apffel / diuersarum sunt specierum, quæ vix explicari & pernotari possunt, aut enim nominantur à colore & odore ut Rosea. Serica aurea apud græcos χρυσόμυλα, aut à sapore ut acido, acidula, dulci, dulcia, græci μελίμυλα, Honig opffel / Aut à primo insitore qui eorum fructuum coloniam alio deduxerat: ut à Martio Mariana, quibus contentus erat Domitianus in cena teste Suetonio cap. 21. Ab Appio Claudio Claudiana, à Manlio Manliana, à Quirio Quiriana: Aut à figura ut rotunda, orbiculata, Germani scheubapffel / ab effigie mæmæ Germ: düttels opffel. Aut ab esu, veluti quæ statim in-</p>	<p>ter edendum liquefcunt, instar farinæ, farinaria dicuntur, Meling opffel / oder Meling birn. Aut à tempore, sic Germani vocant Haber birn & Haber opffel. Aut à patria veluti ex municipio deducta ut Persica à perside, apud latinos præcotia, Punica à poenis iuxta Carthaginem, vulgo Granata Granatopffel / Cydonia à cydone, creta opido latinè cotonea. Aut à mense ut Augusto, Augusta Germ: Augst opffel / & sic de alijs innumeris pene appellationibus, lectorem admonemus in præsentia, ut quisque pro suo more imponat nomina quibus populus vitur: & licet singulis agris ferè mutationes occurrunt, in tres tamen quatuorue, præcipuas reduci possunt, ut Gal. scribit lib. 2. aliment: facult: cap. 21. Alia enim acida, quædam acido dulcia et dulcia, alia insipida, aliqua austera reperiri, quæ in Medico usu intelligenda sunt.</p> <p>Nux iuglans, id est Iouis-glans, siue Regia ex Dios. lib. 1. cap. 142. à nonnullis Persica vocata, tam nota est, quam notissima.</p>	
			Pyra

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA.

AVGVSTO,

Sol in Virgine.

In vni-
uersum
omnibus
commu-
ne est py-
ris ut in
turbinē
desinant.

Pyra præcocia, Germ: Has-
ber biern/ à tempore maturi-
tatis.

Pyra mustea, in principio
mensis Augusti, Germ: Most
biern.

Pyra mellina, Germ: Ho-
nig biern.

Pyra Turbinata, Germ:
Rappen biern vocant.

Pyrorum multa & alia
sunt genera, quæ distinguit
Dioscorides lib. 1. cap. 132.

in ea quæ adstringunt, quæ
acida aut dulcia, & quæ ex ho-
rum mixtione composita
sunt: alia odora ut Apiana,
alijs Moschatula siue Mo-
schata vel Chia, Germani
Moscateller biern/ omnium
minima sunt, quæ nos vidi-
mus.

Pruna ex Dioscoride lib.
1. cap. 137. Syriaca & Da-
mascena tantum enumeran-
tur. Plinius & Theophrastus
etsi prunorum differentias
longius tractant, quædam e-
nim alba, nigra, rubra, ce-
reola, purpurea, viridia, ver-
sicolora sunt, quædam cras-
sa, parua, mediocria, longa,
rotunda, ovalia, quædam
dura friabilia, quædam dul-
cia, & acida, inter hæc medi-
gustus, etsi inquam innume-
re sint differentie, in duo ta-

FORMA.

AVGVSTO,

Sol in Virgine.

men præcipua genera redu-
cuntur, satius nempè & syl-
uestria. Nostri itaq; pharma-
copolæ Damascena quædam
vocata, perfectè nōdum ma-
tura exsiccant, ijs in omnib⁹
tum decoctis, tum Antido-
tis confusane utuntur, sed
hæc alijs discutienda relin-
quimus. nos hic prunorum
quorundam nomina dun-
taxat, quæ hoc mense matu-
rescunt significabimus. nem-
pè pruna sebellina, græcis
Myxa & Myssaria, fructus in
racemis prædulcis, viscida
pulpa, vnde Myxarum ap-
pellatio.

Pruna Damascena, quæ in
Damasco vrbe Syriæ nascun-
tur.

Pruna Asinina, Ros pflau-
men.

Pruna Onichiana, kleine
braune pfeumle.

Rubia satius, fructus ubi
maturuerint apparent.

Ruscus, officinae Brusum
appellant: isti ein stecher fraut/
hat mitten rotte berle / matu-
rus fructus in fine mensis,
aut principio Septembris.

Rosmarini fructiferi, ca-
chrys fructus vocatur.

Sam-

In glâdis
magnitu-
dine pau-
lò minor
quā ple-
raq; pru-
na sunt,
ubi ma-
turuerit
glauescit

Nigri &
rotundi.
Baccas,
rubeas et
rotundas,
intus nu-
cleo os-
seo.

Candid⁹
scaber &
oblong⁹.

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA.	AVGVSTO,	FORMA.	AVGVSTO,
	Sol in Virgine.		Sol in Virgine.
Racemo- si in ni- gro pur- purei. Rubex et rotunde.	Sambuci vrbanae fructus, Holderber / in umbella co- hærent.	Oblongū et orbicu- latū mag- nitudine fabæ simi- lis hede- ræ acino quis an- gulis ve- luti ner- uis emi- nentibus in que a- curum.	Tilia fœmina in fine men- sis fructum maturat, mas au- tem, nec flore, nec fructu exhilaratur.
Rubêtes oxy acâ- thæ ma- gnitudi- ne vino- so succo refertæ, q̃ deuora- tæ vomiti- ones ci- ent.	Sambuci Montanæ siue sylvestris. Baccæ non in um- bella sicuti in vrbana co- hærent, sed in racemis uix modo dependēt.		
Ruffum purpure- um & a- cinosum	Sambucus palustris virgis sambuci, æmulis geniculatis alba intus medulla, sed ca- duca & fragili materie: flore albo sambuci modo, à quo Baccæ prodeunt augusto mense.		
	Terebinthina mas, quibus- dam granum viride, eo qd fructus suos in viridi palli- dior ferat, mēsis tēpore. Plin- ius lib. 16. cap. 26. postea ruffum tingit, cum vite ma- turefcit; nigrum nouissimè facit.		

P

SEP-

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA.	SEPTEMBRI,	FORMA.	SEPTEMBRI,
	Sol in Libra.		Sol in Libra.
	<p>Acatia quæ in Ægypto nascitur, semen in foliiculis lupino simile profert, ex quo succus expressus siccatur in ymbra, niger & maturo semine, sub rufus ex viridi eligatur, modo dice rufus & odoratus succus.</p>	<p>Baccas rubentes oblōgas, et semini bus, seu granulis intus numero sis.</p>	<p>Cynorrhoda, Cerm. <i>Has genbotten oder hipffen vocant.</i></p>
	<p>Acacia altera, quæ in Capadotia Pontoq; prouenit Ægyptiæ spinæ similitudine longior minor & tenerior, folia habens rutæ simillima, semen lenticula minus fert Autumno, quo tempore colligendum, antea enim collectum nimis validum fiat.</p>	<p>Fructus paruus oblōgus asper, a maroq; succople nus.</p>	<p>Cucumer sylvestris, vulgo cucumer Asininus quibusdā anguinus ex Dios. lib. 4. cap. 136. fructu solo distat à satiuo cucumere, maturicum virides esse desinant, & pallidifiant, ex quibus fit Elaterium, id est agitatorium.</p>
In loculis cōne xis seme profert.	<p>Cupressus vel Cyparissus, tertio nūc fructum maturat, profertq; conos.</p>		<p>Chamaeleam & thymeleam Arabes, ut ex Serapione videre licet, confusè satis ac perplexe Mezereon appellant, cum quibus etiam Daphnoidem siue Laureolam commiscant & confundunt, cum appareat esse diuersa.</p>
Nuce. solidæ & albae cortice puniceo obduæ.	<p>Castanæ quæ & Sardiæ glandes, aut Lopima, siue glandes Iouis appellantur, quædam sylvestres, quædam hortenses sunt, Germana appellatione omnes Kesten vocamus.</p>	<p>Rotundum nigri Myrti baccarum instar.</p>	<p>Chamaelea Arabibus Mezereon, fructum fert Myrtibaccis similem: Germani <i>Thylandt.</i></p>
Baccas oblōgas rubeas nucleo oliuæ simili q. p. maturitate fuluescit et flocculis intus cōtinet.	<p>Cynosbata, id est Rubini nicade quo Dios. lib. 1. cap. 106, Cerm. <i>Hasendo: n berle.</i></p>		<p>Thymelea autem, ex qua granum Gnidium, fructum quadantenus oblōgum, qui primo virescit, tandem rubescit. deniq; exiccatus niger conspicitur.</p>
			Cor.

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA.

SEPTEMBRI,

Sol in libra.

Oblongas
oliue mo
do, rus
bras acer
bas ingu
stabiles
cunctis
animan-
tibus.
Rubeum
oblongu
racemo
penden-
tem vix
modo.
Malu est
oblongu
& rugo-
sum cor-
loreaurū
imitas cū
grauitate
odoratū,
semē ha-
bet pyri.
Fructus
pmo her-
hacei cor-
loris. tan-
dem flauū
pyri for-
ma tur-
binati.

Coruus femina, Germani
furperbaum / fructum seu
baccas fert, Septembri & O-
ctobri mensibus.

Crespini fructum, Mat-
thiolus ostendit eum, quem
Germani saurach siue erbseln
vocant: maturescit Septem-
& Octob. illius opinionem
Fuchsius & Vercellenis re-
ferunt in historia Oxyacan-
thæ.

Citria, latinæ medica mala
perficauē, aut cedro mela au-
rea, nemini non cognita, ex
arbore omnibus anni tempo-
ribus pomifera, alijs decidu-
is, alijs subnascentibus, alijs
maturantibus, ut ex Theop.
4. de historia plant. cap. 5.

Cucurbitarum satiuarum,
fructus varia sortiuntur no-
mina ab ipsa forma desum-
pta. Sic quædam cucurbitæ
sunt gibbosæ, ventricosæ a-
liæ, aut in orbem collectæ,
longæ aliæ lagenosæ dictæ,
quæ omnes, viribus & na-
tura non repugnant: decer-

FORMA.

SEPTEMBRI,

Sol in libra.

puntur autumnō, & asser-
uantur hyeme tota in culi-
nis.

Fructum
oleæ simi-
lem pro-
dit, qui
cum de-
hiscit pā-
ditur.

Baccas
nigrascū
ematur-
rit myrti
similes.
Semen
rotundū
rubens,
annexū
folijs.

Fructus
cū puta-
mine fili-
quæ sēsa-
ma pro-
ximus,
præterq̃
quod in
versus di-
uiditur
quater-
nos.

Capparum fructus, autum-
no maturi, ex Alexandria &
Apulia præstantiores asse-
runtur.

Dactylorum fructus, vide
palmam Daphnoides, lati-
nis laureola, Germani Bey-
land oder feydelbast / fructum
maturat Septembri.

Chamedaphne, quam qui-
dam Laureolam marem no-
minant, folijs & fructu à
daphnoide, non longè dif-
fert, verum hæc tantum in-
tercedit differentia, quoad
fructum, quem is profert.

Euonymus arbor, Germ:
Spindelbaum / fructum pro-
fert, quem Germ. Hancenbōd-
le vocant.

Ebulus qui herbaceo ge-
neri assignatur fructum pro-
fert, ceu sambucus acinolum
& nigricantem.

P 2 Ficus

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA.

SEPTEMBRI,

Sol in Libra.

Fructus:
flau^o pin-
guis gra-
nis intus
innume-
ris.

In filijs
lentium
modo
ruffis &
paruis.

Galla du-
plex per-
forata, &
non per-
forata.

Ficus multæ sunt species, omnibus omnes notissimæ, sicca officinis Caricæ appellatur, præstantiores cæteris sunt, quæ è Massilia & Pice no corbiculis turbinatis cō-pactis, inter stratis lauri fo- lijs, aduehuntur.

Glyzerica siue radicis dul- cis fructus, pillularum pla- tani magnitudine, asperio- res modo, maturi sunt au- tumno.

Galla ex Diosc. lib. 1. cap. 123. fructus est glandi fera- rum arborum, rustica & vr- bana plebi notissimus, Ger- mani Aich apffel siue gall ap- fel / nascuntur Sole de ge- minis exeunte, & hæstuni- mio excipiuntur arescunt pro- tinus nec amplius adolefcunt: ad maturitatem perueniunt in fine Septembris siue Octo- bris principio. Est verò Gal- la alia leuis plana perforata, fungosa, flaua, quæ & minus efficax ad coriarios vsus, alia solida nullo foramine per- uia, quæ Omphacitis appel- latur, efficacissima in altrin- gendo, quæ & efficacior est.

Iuglandes, id est, Iouis glæs siue Regia à nonnullis perfi- ca vocata, Germani Welsch- nuß.

FORMA.

SEPTEMBRI,

Sol in Libra.

Fructus
rotundus
locula-
mentis
distin-
ctus, in q̄ ter-
na sunt
semina.

Racema-
tim co-
hærent.

Rubi grā-
diorē, &
oblōgio-
rem tan-
guineo
succoma-
dentem.

Primo
virides
aut sub-
virides.
quaratio-
ne auste-
riusculi
sapore
percipi-
untur, v-
bi uero
matura,
resipiunt
melleam
dulcedi-
nem.

Lathyrus, alij Ricinum paruum, Germani treybfor- ner oder spring forner vocant, alij cataputiam minorem.

Ligustri bacca nigra au- tumno maturi.

Morus nigra, Germani schwarz Maulber / fructum fert.

Morus alba, Germ: weiß Maulber: bacca minores habentur quam in nigris, quorum facultas minime conuenit cum nigris, sunt.

Alba antiquorum nemo recordatus, quantum ipse memini aut legi, excepto Os- uidio in Thisbes fabula, hæc ad sericeos bombyces agni- tissima, nullius in re medica vsus.

Oxyacantha græcè, acuta spina, latinè, & officinarum Berberis, idem à Fuchfio & Apollonario, viris doctissi- mis esse creditur, Germani Saurach siue Erbseln / qui- bus

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA.

SEPTEMBRI,

FORMA.

SEPTEMBRI,

Sol in Libra.

Sol in Libra.

Rotunda
carnosa
& succo
lenta.

bus repugnat Matthiolus, qui Oxya cantham eam putat esse, quam Germani haggendoim appellant.

Orthomastica mala, Germanis schewbapffel.

Perficæ mali genera non pauca, quædam enim Rhodacina putantur, Græcis recentioribus nuncupata, alijs duratina sanguinolenta, sanè, & nucleo tenacissimè adhærentia, quædam tota pulpa sanguineum colorem præferentia, quædam nucleum deserunt, alia bipartitum habent, nonnulla sicciora, alia friabili & solidiori carne consistunt quotquot igitur sunt species, communi hæc omnes appellatione Germani Pfirsing vocant.

Poma acida, Germani Weinling/quæ distinguuntur in maiora & minora.

Poma hyberna, Winter spffel.

Poma Turbinata, à Turbinæ Germani spizige spffel.

Poma rotunda, Germani schewbapffel.

Pyra Dobelliana, à Dობella sic dicta, Germani Keszgelbirn.

Pyra Falerna, Germani Spectbirn.

Fructus
suavis
dulcis ac
suluus,
nucleo
intus ob-
longo ac
durissim-
mo, fru-
ctu hunc
Germani
vocant
Dattel-
fern.

Pyra volema Vergilio, à Catone sementina et mustea, Germani Psaltzgressere / in volema porro sunt dicta à vola, quod sua magnitudine totam volam implere possunt.

Pyra syluestria, Germani Holzbirn/ oder feldbirn vocant, quæ dura autumno plerumq; fructificant.

Palma arbor est insignis, caudice squamoso, Germani Dattelbaum vocant, flores profert numerosos, albos ij antequam emergant, magno quodam inuolucro concluduntur, quod palmâ daten vocant, quo tandem dehiscente, emergunt ac panduntur, hinc subinde datyli prodeunt, qui per Autumnum cum ficibus maturescunt.

Populus, quibusdam arbor tremula, quia tremulis & inter se crepitantibus folijs constat, est verò duplex alba & nigra de sententia, Plin. lib. 16. cap. 24. & Diosc. lib. 1. cap. 92. ex Theophrasto autem triplex. 3. de historia plant. cap. 14. Alba populus

P 3 est.

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA.

SEPTEMBRI,
Sol in Libra.

Baccis o-
robi ma-
gnitudi-
ne in qui-
bus lanu-
go albi-
cans cō-
cluditur,
que vbi
maturus
erint in
pappos
abeat vel
euolāt.

Bacca, he-
derę simi-
les, qui-
b^o semen
durum,
qd diffi-
cile euel-
litur.

Fructus
asper qui
si cortice
nudetur,
semē re-
peritur
ricino
animali
simile.

Paliurns, Germani Waldr
disteln / frutex aculeatus &
durus: vtrum verò sit Agri
folium, discrepant doctores,
fructum profert autumnò.

Peryclimenon, vulgo ma-
ter sylua, quibusdam capri-
foliū, siue vincibosco, aut li-
lium inter spinas, Germani
Wald lilien / cuius fructus po-
ma equina vocantur.

Ricinus latinis, cici aut
Croton Græc, vulgo cata-
putia maior: Germani Wun-
derbaum oder Kreuzbaum /
Septembri fructus maturus.

FORMA.

SEPTEMBRI,
Sol in Libra.

Colore
fructus
rutil^o est,
nucleos
binos cō-
tinens,
quan-
quā gran-
diori ter-
nos, &
paruulus
vnū nu-
cleus du-
rus est, &
forinse-
cus nig-
ger.

Baccas
edit ro-
tundas,
primo vi-
rides quę
post mas-
turita-
tem ni-
gricant
aut fulue-
scunt, iu-
niperinis
baccis
non mi-
nores.

Smilax aspera, alijs rubus
ceruinus, German: Scharpff
winden nominatur, cuius
historiam persequutus est.
Theoph. lib. 4. cap. vltimo,
fructus proximus solano, at-
que melothro, & maximē v-
ux labruscæ vocitata.

Solani hortensis, siue escu-
lētī, græcis σπυγρος κνπαις,
Germani, nachtschatten.

Sola,

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA.

Colore primū virides mox rubreas & turbينات, semē intra se claudentes rufum acino vix affimile.

Baccæ figura in folliculis hirsutis delitescētem.

Fructus racemosus, niger & rotundus.

Solanum Halicacabon, id est, vesicaria, Germ: Luden oder Juden firschen. officina Alkakengi, Arabum exemplo vocant, Septembri mense vesicas profert maturas.

Solanum, somniferū primum, quod Matthiolus lib. 4. cap. 69. describit, fruticatus numerosis ramis, densis surculosisq; fractu contumacibus, folijs multis & subpinguibus, cotoneæ mali nō absimilibus, floribus subrubentibus, fructum ostendit Septembri.

Solanum somniferum secundum, fructum gignit mense Iunio, de quo vide supra.

Solatrium mortale, Stramonium Fuchsio dicta, Germani Stenchende oder rauch opffel.

FORMA.

Baccæ oblonga oliuarum modò, primum virides, deinde subalbican-tes, posthæc aureo colore, vltimo rufescentes.

Luteum colorem referunt, priusquam mature- scunt.

Matura autē colore pallido & in latere rufescente.

SEPTEMBRI,
Sol in Libra.

Serica zezipha officinis iuiuba dicta, Dioscoridi in- tacta aut non cognita, Arbor pruno paulò humilior, spinis vbiq; horret, ac riget flores pallidi, ac muscosi à quibus Baccæ oriuntur.

Sorba: fructus vulgares, quos Germ. Speyerling ap- pellant, decerpuntur imma- tura ad sistendam aluum, hoc mense Septembri: ad laxan- dam verò aut subducendam aluum, cum probè matura fuerint, nempe Octobri. Sunt verò duorum generum, do- mestica & syluestria. Ex do- mesticis est mas & fœmina, quæ pomorum diuersitate noscuntur, alia rotunda qua magis grata, alia oblonga & velut ouī figura. Syluestriū iterum duorum generum. unum syluestre simpliciter appellatur, alterum à Plinio Forminale, quæ Octobri ma- turescunt, & cibus turdis gratissimus.

Sumach

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA.

SEPTEMBRI,

Sol in Libra.

Racemo-
sum fru-
ctum o-
stendit,
ex rubeo
purpura-
scentem,
cū is im-
maturus
fuerit.
Vbi verò
maturus
acini
huius fru-
ctus ni-
gricant.
Gal. au-
tore lib.
8. simpl.
medic.
facul.

Siliquæ
latæ &
cōpressæ
in quib⁹
nuclei in-
tus flau-
seu sub-
ruffi ap-
parent.

Sumach Barbari vocant
Rhu, aliquibus Erithros ap-
pellata, semen est Coriarij,
fructus lenti similis, ob id à
Germanis Gerberbaum vo-
catur. Galeno lib. 6. com-
pos. loc. cap. 1. duplex est,
vnum tinctoribus coriorum
expetitur, alterum obsonijs
inpergitur à quibusdā Rhu
obsoniorum, siue culinariū
dictum est.

Siliquæ, quæ græcis Cera-
tia, quibusdā Xylocrata,
Germani S. Johannes brot/
fructificant in fine æstatis &
principio autumnī. Siliquæ
recenter ab arbore decerptæ
ingrato displicent sapore,
sed tractu temporis in crati-
bus expansæ & siccate mi-
tescunt, & dulces euadunt.

FORMA.

SEPTEMBRI,

Sol in Libra.

Fructus
subruber
medulla
excrocea
subnigra
& acido
dulci.

Fructus
profert
rubentes
racema-
timq; co-
hærentes
vuarum
modo,
iuniperi
baccarū
magnitu-
dine, re-
sinosi du-
riq;.

Fructus
racemo-
sus pri-
mo viri-
dis, per
maturi-
tatem
ruffescēs

Tamarindi: offi: & Bar-
baris, quasi palmula Indicæ,
Græcis οφύρα, latinis
acida palmula, alijs sylue-
stris palmæ fructus.

Thymelææ fructum, supra
in Chamælea ostendimus.

Terebinthus quibusdā
granum viride, quod fructus
iuos in viridi pallidos ferat,
vel quia viridem editum,
ruffum post modò tingit, cū
vite maturescit, nigrum no-
uissimè facit, ex Theoph. 3.
hist. plant. cap. 15. duplex
est. Mascula quæ est sterilis.
Femina fructifera, & hæc
duplex, alia fructum proxi-
mus. ruffum promit magni-
tudine, lentis qui concoqui
nequit, Alia viridem editum
post modum ruffum turgit
& cum vna maturescit, ni-
grum nouissimè, ut iam di-
ximus, facit.

Vitis alba latinè, Bryonia
& Ampello leuco Græcè.

Vacci-

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA.

SEPTEMBRI,
Sol in Libra.

Baccæ in
cacumi-
ne arbor-
is siue
fruticis
apparent
nigræ, ra-
cematim
pyrami-
dis mo-
do cohæ-
rentes.

Acini ni-
gri com-
pressi lés-
tium mo-
do.

Vaccinia nigra, baccæ sunt
hederaceis minores, ex arbo-
re ligustro, Germani arbo-
rem Beinholdzlein vocant,
oriuntur Septembri mense,
& perdurant tota ferè hye-
me, quibus aues, præsertim
merulæ ac turdi vescuntur.

Viburni fructus, Germani
schlingenbaum frucht.

Vindemiam antiqui nun-
quam existimauere maturâ
antè æquinoctium, iam pas-
sim rapicerno. Quamobrem
& huius tempora notis ar-
gumentisq; signantur. Vuam
calidam ne legito, hoc est in
eius siccitate, ac nisi imber in-
teruenerit, hanc ne legito ros-
rulentam, hoc est, si ros no-
cturnus fuerit, nec prius quâ
sole discutiatur. Vindemiare
incipito, cum ad palmitem
pampinus procumbere ce-
perit. aut cum ex densitate
exempto acino interuallum,
nō compleri apparuerit, aci-
num non augeri.

FORMA.

OCTOBRI, SOL
in Scorpione.

Viridis
oblongus.

Baccas
aliquan-
tuli ob-
longas et
rotundas,
Myrto
grandio-
res, pri-
mo viri-
des, tan-
dem ni-
gras, se-
men &
granum
Plinius
Carthe-
gon vo-
cat.

Fœmina.
Rotunda
forma
mediocri
pilæ simi-
lis fungo-
sa, alba
leuis &
q̄ leuior,
eo me-
lior.

Alnus, Germani Erles-
baum/fructus maturus
autumno, forma mo-
ris similis, quam plurimis
squamis compactis.

Buxus arbor folia fert, myr-
ti breuiora, floribus herba-
ceis, Germani Buxbaum/
fructum Octobri, mense ma-
tutum vidimus, in horto illu-
strissimi Comitis, Ludouici
Casimiri pij defuncti, de Ho-
henloe.

Colocynthis: vulgaris nos-
titia, officinis coloquintida,
aliq̄ cucurbitam syluestrem
appellant. Menses in marem
& fœminam distinguit: fœ-
mina præstantior, præsertim
si ex agro laxo arenoso libe-
ro & autumno lecta fuerit,
quàm languescente virore
ceperit in colorem luteum
mutari, immatura & his no-
tis, destituta pessima ac vena-
nosa,

Q

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA.

OCTOBRI, SOL
in Scorpione.

Mas.
Lanugi-
nosus, ni-
gricans
sub asper-
durus
grauis.

1.
Præssa
lanugis
nosa co-
lore au-
reo.

2.
Forma
magis py-
ri quam
mali sit.

3.
Forma
ac facul-
tate me-
dia inter
vtraq.

Baccæ ob-
longe ru-
ber acer-
bæ & in-
gustabi-
les cūctis
ferè ani-
mantib.

Nuces
sunt so-
lidæ.

nosa, præsertim etiam si vni-
cam duntaxat, tota planta
colocynthidam produxerit,
& in loco vliginoso, vbi ser-
pentes, vel alia insecta ani-
malia, abundant.

Cydoniorum quorum tria
genera.

Cydonea aurea, Bömisch
Füsten.

Cydonea Struthia dicta,
Fleine Füsten.

Cydonea mustea, mellea
sunt & dulcedine grata.

Cornus fœmina baccas
Octobri producit, quas Ger-
mani vocant Welsch Firschen.

Castaneæ syluestres, Germi-
Holz oder feldt kessen / qua-
rum multa reperiuntur ge-
nera, de quibus Plin, lib. 14.
cap. 23.

FORMA.

OCTOBRI, SOL
in Scorpione.

Fructus
oleæ simi-
lis, q cū
dehiscit
pādatur.

Calycu-
lo echi-
nato &
dammo-
do hispi-
do sca-
bro ac ro-
tundo

Nuclei
triangu-
lari for-
ma inclu-
dūtur, ac
tenui cu-
te obte-
guntur.

Glandes
oblongæ
in caly-
culis q̄s
cupulas
vocant.

Fructus
racemo-
sus folli-
culis in-
clusus.

Cappares ubiq; gentium
notæ, in acetarijs quotidia-
nus vsus frequens.

Fagi fructus, Germani vo-
cant Buchern / qui communis
nomine glans appellatur.

Glans : fructum omnium
glandiferarum arborum cō-
prehendit, id est ouercus &
roboris, æsculi, cerri, ilicis,
fagi, suberis, castanearum,
quæ & Sardinia glandes ap-
pellantur, & si quæ sunt si-
miles, licet itaq; omnes com-
muni nomine appellentur,
figura tamen atq; forma, plu-
rimum inter se differunt.
Proprie glandem nunc in-
telligimus, quæ in Quercu
arbore nascitur, qua saginan-
tur porcorum greges. Ger-
mani Eychel vnd stech eichel.

Lentiscus, triseræ cum sit
arbor, ultimo nunc fructifi-
cat.

Mespi-

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA.	OCTOBRI, SOL	FORMA.	OCTOBRI, SOL
	in Scorpione.		in Scorpione.
Pomum fert sua-ue exiguomalo nō dissimile tribus intus nucleis, qua de causa id nonnulli Tricoccon appellant.	Mespilorum, quorum tres nouimus species Seranium, groß Mespeln/ Avblosay Flein Mespeln Avblwosadins. Anthedoni similis, Plinius hanc Gallicam vocat. de quibus consule etiam Theoph. lib. 3 de hist. plant. cap. 12.	Russa exterius tunica & odorata, albo sunt putamine, internus nucleus cuncticula cōtegitur russa, medulla viridis, sapor pinenutius proximus.	Staphylodendri fructus siue nuces, Germani Bimperz nüggle / racematim prodeunt e ramorum extremitatibus, arbor hac quotannis, frugifera conspicitur in Monasterio Murhart, quod situm est in Ducatu wirttembergensi. Sorba tam domestica quam syluestria hoc mense matura sunt.
Corea ceo legum turcorum ex extrinsecis, rufescente intrinsecus flavescente, innume- ris granulis angulosis & rubentibus.	Malā punica, siue Granata, cuius tres sunt species. Germani vocant Granat spffel. Acidā. Dulciā, & Austerā. Prunus syluestris, Germani Schleben / ex quibus succus exprimitur, quo officina loco Acaciae utuntur, quod videlicet refrigerat, siccā & adstringit.		
	Pyra serotina hortensia, Germanis Winter oder dolbirn.		

Q 2 NO

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA.

NOVEMBRI,

FORMA.

NOVEMBRI,

Sol in Sagitario.

Sol in Sagitario.

Cum ma-
turū est
pomum
ruber, a-
spero ta-
tu, nul-
lo intus
ossiculo.

Baccæ ob
longæ &
rotundæ
minores
quàm sa-
tiuæ.

Baccæ ob
longæ &
rotundæ
maiores,
quæ syl-
uestres,
primo
pdeunt
virides,
appin-
quante
maturita-
te palle-
scunt, tā-

dem pur-
pureæ
prius fa-
ctæ satu-
ratæ ni-
grescūt.

ARbutus arbor, fructum
maturat hyeme, quo
& turdi & merula ma-
ximè delectantur.

Olea, Germani Oliuen/
duplex, quædam syluestris,
quam aliqui cotinon, id est,
oleastrum appellant, alijs Æ-
thiopiam oliuam.

Quædam sativa, cuius de-
cem antiqui genera notaue-
runt: videlicet

Pansias.
Algianas.
Lucianas.
Sergianas.
Neuianas.
Culminas.
Orchites.
Regias.
Circites.
Murteas.

Decerpuntur omnes No-
uembri & Decembri, antea
enim non maturescunt, ster-
nuntur deinde pauimentis,
donec rugosæ fiant, moleq;
sub ponuntur, & torculari
premuntur affusa feruente a-
qua: ita enim oleum reddūt.
Plinius lib. 18. cap. 31. oli-
uas capiendas esse scribit fa-

Baccæ ni-
græ ro-
tundæ.

Muscosu
qualem
amygda-
la, in fili-
quis mi-
nutum,
gustu
lubama-
rum.

Et vindemia, et quæ ad oleū
pertinent, quæq; ad Vergilia-
rum occasum agi debent.

Iuniperus, duum est gene-
rum, maius & minus, vtrum
autem legatur non refert,
Autumno baccæ decerpen-
dæ, per maturitatem nigra,
bimatu videlicet, ita enim
fructum suorum maturita-
tem prorogat. fructu in ea
terno, eodem tempore, nigro
ad maturitatē producto viri-
di maturescente & nouo ir-
rumpente.

Fraxinus, Germani Stain
eschern / fructum fert mense
Novembri & Decembri,
maiori porro copia non vi-
dimus, quàm circa arcem
Walderstain / milliare distans,
à Schoendoiff.

DECEM.

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA. DECEMBER,

Sol in Capricorno.

Baccæ oleis similes colore primū viridi, & p̄ maturitate nigro, crasso intus nucleo, ut in Rusci bacinis: Hederæ arboreæ, hyeme racemosi aduntur corymbis ligustinis grandiores, quæ ante maturitatem virescunt, mense deinde Ianuario, nigrum contrahunt colorem.

Fructum Prunæ Ægyptiacæ, de qua Theoph. est autor lib. 4. cap. 3. historia plant. arbor insignis magnitudinis. florere incipit mense Iulio, fructum circa Brumam perficit, nec folia dimittit. Rotunda per maturitatem aureo colore nitentia.

FORMA.

ARBORES

quæ per integrum annum fructiferæ sunt.

Arbutus per hyemem perpetuis virescit frondibus, fructus anno integro maturefcit, ut simul hūc haberi, atq; alterum flore sponderi contingat. Theophr. lib. 3. cap. 16. de hist. plant. autore.

Fructus rotundi sorborū ferè magnitudinis, q̄ p̄mo exortu virer, deinde flauescunt maturi verò rubent, aspero tactu nullo intus ossiculo fragorū modo. Rotunda per maturitatem aureo colore nitentia.

Aurantiarum, Germani Bomeranzen/ Arbor semper pomifera est, & eadem ferè quæ citria præstat.

Cedrus arbor magna, ex qua picem colligunt, quæ cedria vocatur. Est autem cedrus alia maior, Καρπὸν δὲ ἔχει ὠσπερ κυπρίσος μακροτέρου μὲν παρὰ πολὺ λεγέσθαι δὲ. Alia cedrus est Phœnicia iuniperi modo baccas parit. baccarū Myrti magnitudine rotundas. Tertia est Cedrus

Q 3 drus

QVO TEMPORE FRUCTVS COLLIGENDI.

FORMA. drus Lycia, quæ iuniperum paruum quadantenus refert, Dux posteriores omni tempore fructum gerunt.

Citria mala aut Cedromela, Germanis Citrinat dñpsel/ ex Theoph. lib. 4. hist. plant. cap. 5. arbor toto anno pomifera describitur.

Iuniperus fructum per biennium prorogat, antequam bacca nigra maturefcunt, Autumno bacca decerpens dñ.

Pinus latine, πινυς Græcè, Harzbaum / fichtebaum vñd Bünholz Germanicè, ex Theophrasto lib. 3. cap. 10. hist. plant: duo genera pini describuntur, Domestica & syluestris. Domestica pinu in Germania caremus, fructum profert, quem Græci σπείλαιον vocant, Gal: libro 2. aliment: facult: Nux pinea boni & crassi est succi, habetur copiosa hæc domestica, pinus iuxta littora Adriatici maris, & quibusdam Italix locis arborefcit.

Syluestris pinus plura habet genera, quæ in Alpina siue montana & maritima diuiduntur. Montanorum tria genera, è quibus syluani homines parant picem, Germani Harz / vocant, & lig: na pinea quæ nos Germani

Magna cōpacta solida nux, in qua concluditur nucleus oblong⁹ putami- ne duro cōcluso, interior nucleus tenui tunica circum tegitur flauo colore, fa- por nuci- cis ac iucundus, substantia pinguis.

FORMA. Bünholz vocamus. Nuces minores, hæc omnes quam domesticæ sunt cupreissinis paulo maiores, longiores tamen, ac compactiores. Squamis compactæ, resinosa ac odorata. Mariorum verò duo genera, quæ tantum magnitudine & paruitate differunt. Omnia in vniuersum genera resinam albam & odoratam mittunt, in tadam vertuntur, & picem nigram fundunt. Estq; præterea pinus toto anno pomifera, quo enim mense ex ea nux decerpitur, eodem maturefcit, alia & sic dispensatur, ut nullo non mense maturefcit.

Abies latine, ἰλᾶκη græcè, Tannen siue Tannenbaum Germani vocant, ex Theophrasto lib 3. cap. 20. hist. plant in masculum & feminam distinguitur, à Mathiolo sterilis in Ananienfibus & Tridentinis montibus notatur, à Plinio verò fructifera, conis oblongis, in quibus semen sub album, nulla intus medulla.

Hedera minor Helix vocata, sterilis est, raro hæc arborescendit, sed aut humi repit, aut saxa, macerias sepēs & aggeres occupat, folio trique-

QVAE FRUCTVM ARBORES NON FERVNT.

FORMA. triquetro, maculoso, perpetua fronde viret.

Populus alba sterilis est, flore & fructu Matthiolo. Galeno autem fructifera, lib. 2. comp. pharm. part. cap. 1. populi albae (inquit) fructus cum aceto, tritus discus foris facultatis est.

Rosmarinus mas sterilis est, Theop. lib. 9. cap. 12.

Tilia mas sterilis est, flore & fructu.

Terebinthus mascula sterilis est, Theoph. lib. 3. cap. 5. autore.

Novellae arbores carent fructu quam diu crescunt, aut si fructiferae, facillime tamen perdunt ante maturitatem.

Perdunt & facillime ante maturitatem fructus.

Palma siue phoenix.

Ficus.

Malus.

Pyrus.

Punica.

Perfica: quae etiam roribus nimis & pruinis florem amittunt.

Magna inter doctos de radicibus effodiendis controversia est, non enim desunt qui eruendas semper autumno esse censent, ut Dioscorides, cui in quibusdam Galenus, Auicenna & Me-

FORMA. sues contentiunt, alij vero ineunte vere, eo quod plantae nondum caules, folia neque flores emiserint, à quibus omnibus radicem succus exhauritur.

Plinius lib. 28. cap. 13. effodit antequam fructus, aut semina maturescant, quod diuersis temporibus accidere videmus.

Quantum rationi consentaneum videtur, autumnales radices omnes paucioris esse succi, quam vernaes, quod videlicet paucio ante tempore, & caules, & folia, & fructus emiserint, ob eamque causam putrefactioni minus sint subiectae, longiusque asservari possunt, attamen cum eo tempore defluere incipiant folia, stipitesque tabescant eas radices nunc foetis animalibus dico esse similes, hoc est semi animas ac multum imbecillas, tristesque incipiunt fieri cum sensim deficiat humor, nisi, si quae tantum habebant virium, ut etiam earum satis retineant, arefacto caule, ut Scylla, cetera animalia valida, etiam foeta adhuc robusta permanent, veluti & in herbis aut arboribus, quibus folia nunquam decident.

Econtra

QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA.

Econtra, quæ veris tempo-
re radices erodiuntur, licet
humore copiosiore abundât
qui paulò post in folia, flores
& semina abeît, attamen cû
longè minus sint concoctæ,
his quæ autumnò leguntur,
corruptioni ideoq; magis e-
runt obnoxia, præsertim si
quæ longo tempore conser-
uari debeant.

Cum igitur nec nimis hu-
mida, siue recentia satis fir-
ma sunt, præsertim quæ ni-
mio humore turgent, nec ni-
mis vetusta commoda. Re-
stat igitur, ut cum Plinio eo
tempore radices effodiamus
antequam in semina aut fru-
ctus transferint, hoc est ex
adultis tum vigentibus, non-
dum lignosis aut tabescenti-
bus, quo tempore enim me-
dicamentosa sunt, maximæ
& validæ, veluti ea omnia
quæ augescunt, & robur ac-
cipiunt, calidiora & fortiora
sunt. Hippocrate in libro de
natura humana, autore, se-
rius enim aut tardius si eru-
antur radices, quando iam
matura semina, aut iam de-
fluere incipiunt folia incre-
mentum omne absumitur,
summæq; vires deficiunt, fœ-
tis et infœcundis animalibus
similes, quæ sunt exangues
& frigida, non amplius sen-
tiunt gaudium annorum, li-

FORMA.

et putredini minus sint ob-
noxia, seu ossa & dura cor-
pora ob siccitatem, imbecil-
itati tamen non vacant,
nisi si quæ sunt bisera, aut tri-
sera quæ repullulant saluam
vitalem, quod in herbis ses-
getum accidere videmus, aut
quæ nec semen aut fructum
generant, hæ omnes effodi-
endæ antequam folia inci-
piant marcescere: hac ratio-
ne itaq; singulis mensibus, et
temporibus diuersis, cum ad
huc sint succolentæ & vali-
dæ, euellendas esse statuimus,
serena præsertim cœli consti-
tutione, nō squaloribus im-
bribus sit infesta, ne extranea
humiditate persusa aut im-
buta corrumpantur, vel ex
succæ & humido nativo ca-
rentes exarescant. Integræ
itaque ac abunde nutritæ, ut
ex Galeno libro 1. de antid:
cap. 12. elici debent, quæ
conuenientem magnitudi-
nem, non excefferint: aliter
enim nimia succi copia tur-
gent, peioresq; ijs sunt, quæ
benè quidem nutritæ, mino-
rem sunt naturæ corpulentiæ,
virtus siquidem naturalis
radicibus, ab initio à cœlesti
influentia infusa in ea quæ
vulgaris amplitudini debet-
ur proportionem, postea in
vastæ corporis mole dispersa,
æquali

QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA. aequali potentia sui opus
robur nequit ostendere, quē
admodum in corpore me-
diocri. Maior in exiguo re-
gnat, nam corpore virtus.
Virtus enim (ut Philosophi
loquuntur) coacta seu unita
fortior est seipsa dispersa.

FORMA. IANVARIO,
Sol in Aquario.

R FEB.

QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA. FEBRVARIO,
Sol in Piscibus.

FORMA. MARTIO, SOL
in Ariete.

Bulbosi.

Bulbi radices effodienda
ante Ver, aut deteriores
illico fiunt, signum ma-
tutatis folia in arescentia,
ab imo vetustiores impro-
bant item paruos & longos.
Plinio autore lib. 19. cap. 16.

Sit musc
câdidus,
& odor
ratus o-
ptimus
in cedri-
na arbo-
re, proxi-
mus po-
pulnea,
nigricâs
improba-
tur.

Lanugines arborum, quas
Germ: Mōfig/ Galli/ Mar-
chant/ officinæ Arabas secu-
ta vsneam, siue Bryon aut
Muscum vocant, medio mē-
se Martij colliguntur, mace-
ranturq; in aceto siccantur,
& vsui adseruantur.

QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA.

APRILI, SOL
in Tauro.

Bulbosa
radix plu-
ribus cō-
tecta tu-
nicis ip-
sisq; sub-
flauescen-
tibus gla-
dioli mo-
do.

Corpu-
lētā, ple-
nā, à ca-
pitulo ce-
pā simili
coharēt
radices
tenues &
confi-
bratā.

C Roti bulbi, eruuntur
quarto quouis anno,
verno tempore, seru-
antur tota æstate in horreis &
seruntur, florem ante folium
redit per autumnum in Ver-
giliartum occasu, non ultra
mensē, quibus decidenti-
bus folia angusta, penē ca-
pillamenti exilitate tota hye-
me virent.

Ellebori nigri, vere &
messis tempore erui debent,
celeriter autem effodiendā,
quoniam halitu aggrauant
caput, quā propter ad id ar-
cendum, foliū allium præ-
sumere, & bibere vinum de-
bent.

Fungus, Germ: Schwam-
men oder psserling / quem
Calenus lib. 8. simpl. med.
facul: plantam appellat: sin-
gulis annis primis imbribus
erumpit, Vergilio lib. 1. Ge-
orgico: teste, qui porro inno-
cuius habetur inter omnes,
hunc nos Germana appella-
tione Nothfen nominamus.

Fungi verò porcini per-
nitiosi reperiuntur, ut testa-
tur Diosc. lib. 4. cap. 78.

Hyacinthi radices, tam
maximæ, quam maiores, ne-
dum minores, Aprili mense
effodiendæ.

FORMA.

APRILI, SOL
in Tauro.

Scyllæ radicem, maximè
effodimus in ipsa prima fo-
liorum germinatione, simul
& caulium arefactione, quod
ter in anno accidit, eo quod
ter floreat, triaq; tempora sa-
tionum ostendat, primo fit
in Aprili & Maio, secundo
Iunio, tertio Septembri, aut
principio Octobris. Galenus
1. de antidotis cap. vltimo,
de vsu Theriacis ad Pam-
philianum messis tempore,
quo præcipuè uigeat colli-
gendam inuere videtur. Hæc
scilla ex Varrone tam alba
quàm rubra: est & fœmina
nigris folijs ex Plinio lib. 20.
cap. 9. Candida Scilla utilis-
sima est.

Int^o mul-
tum alba
& extra
magna,
medio-
criter du-
ra: Rara
verò la-
xa & te-
nuis, est
imbecil-
lior, ru-
bra au-
tem &
nigra
mala est.

Hermodyli radix, vere
legenda est, & per sex mens-
es sicca ante vltimū seru-
anda. Cæterum hoc loco admo-
nendum, quod officinarum
Hermodylus, qui duplex
est, reuera sit Colchicum, &
sanè venenum, quantumuis
peregrino vtantur. Alter ca-
staneæ effigie orientalis di-
ctus, intus & extra candidus,
alter cortice foris è nigro
ruffescente. Colchicum est
Græcorum, ab vtrisque igitur
post hac se caueat pharmaco-
pai, tanquā à præsentissimo

R 2 vene-

QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA	APRILI, SOL	FORMA	MAIO, SOL
	in Tauro.		in Geminis.
& q̄ in lo co pin gui pue nit quæ autem Scyllæ aut Ras phano proxima creuit, præstan tior.	veneno, de quibus plura lege apud Vercellensem medicu virum doctissimum, Radio primo, folio 103.	Tenuēs & obli quas. Rad: mul tas & te nues. Radix circa cau lem spō giosa, à qua nu merosa oriuntur fibræ el lebori modo al bicâtes.	A Sarii radices, Germani Baselwurtz. Allij vrsini, Germa ni Wald knobloch / quod in nemoribus prouenit.
Recens subnigrū & in ru brum in clinans, rarū gra ue, si fra ctum ex rubro & glaucō alternat, si mansu vel aliq̄ liquore, solutum croci mo do tingit	Rhabarbarum, radix illa illustris ex Mesue quoddam est Indicum, qd & sinicum, alterum Barbarum generis nomine appellatum, tertium Turcicum omnium ignobi lissimum, ut Indicum est præ stantissimum, effodiuntur radices in ipsa prima folio rum germinatione, vere ine unte, quo tempore succosa sunt maximè, radices repur gantur & secantur in partes, a sectione, quas seruare so lent, non statim filo suspen dunt, ne succus guttatim stil lans deperdatur. Imo asseri bus collocant, vertuntq; ac inuertunt quotidie, pluries hoc enim modo incrassatus, succus in radice seruatur.	In globū extubes rat. Digitali crassitu dine in curuata genicula ta caudā scorpio nis amu lans.	Asparagus syluestris & al tilis, qui in hortis passim se ritur, Germani spargen vo cant, officinæ sparagum, id est, tenerem cauliculum, vere ineunte prima germinatione prodiens in fasciculos dige tus, quo aqua aut iure elixo postea aceto intincto pipere asperso vti magnæ gulæ de lectamento cōuenimus, no tior est quam ut multis de monstrari debeat: Syluestris distinguitur ut in palustrem montanum, & petreum quē Dioscorides propriè corru dam vocat, Radices Maio effodiendæ. Apij vomitorij, Germani Erdnuß / exterius nigra, in terius candida, pyri effigie. Aconitum pardalianches Dioscoridis.
			Aconitum

QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA.	MAIO, SOL in Geminis.	FORMA.	MAIO, SOL in Geminis.
Brachia- ta supe- rius, & genicula- ta est.	Aconitum pardalianches, Plinij qd ima parte caudam scorpionis refert.	Supreme singula- ris, infer- ne in multa	Chelidoniij maioris siue hirundinariz radix.
Fibrosa, genicula- ta, grami- nis mo- do, ex qua folia et germi- na erum- punt.	Aconitum pardalianches Theophrasti, radicem effigie scorpionis integram haber.	crocea ca- pillamé- ta fibrans tur.	Chelidonium minus, qd triticum sylvestre quidam nuncuparunt.
Radix ra- mis mul- tifida & flexuosa.	Aconitum pardalianches minus, quod aliud non esse, nisi Doronicum officinaru, Matthiolus putat.	Radices habet ex eodé cal- lo cōplu- res, pulil- las in gra- minu, norū tri- tici, mo- dū acer- uatim cō- gestas,	
Longa et subflava.	Boni Heinrichi radix.	quarum tres aut quatuor in longi- tudinem exeunt.	
Tenuis ut ellebori.	Betonice radix.		
Alba & crassa.	Chamedrys vulgaris, mas- & femina.		
Capillo- sa & fi- brosa.	Caryophyllata sylvestris.		
Nume- rosa ra- dices.	Consolida maioris.	Dulces genicula- tasque radices spargit.	Gramen siue Agrestis Dio- scoridis multiplex et si sit, il- lud tamen eligimus, quod geniculatos per terram ser- pit ramulos, & ab his.
Radix la- teo suc- co plena,	Consolida medix.	Sublutea	Geneste Maio & Iunio mensibus effodienda.
Cicho- rio pxi- ma, sed longe a- marior.	Dens Leonis, quibusdam caput Monachi, Germ: rōrle fraut. Plinio Cichorium ip- sum appellatur.	Oblon- ga & sub lutea.	Genestella. Geranium primum cum floribus purpureis, radix.

R 3 Cera-

QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA.	MAIO, SOL in Geminis.	FORMA.	MAIO, SOL in Geminis.
Tenuis longa.	Geranium 2. cum floribus subpurpureis, radix.	Radix tenuis li-	res. Altera folijs gladioli longioribus, folijs constat
Radix in tus viri- dis.	Geranium 3. tenui folium & floribus purpureis.	gnosa ge niculata subrufa,	nouem purpureis, quorum extima superiori tantum parte aureis pinguntur lineis.
Intus cā- dida, ex- trinsecus sublutea.	Geranium quartum, cum floribus purpureis, ex quibus capitella rostrata gruni ca- pitis instar prodeunt.	in odo- rag.	Germ: vocant, Blaw Schwer- tel wurz/ Blaw gilgen/ Veyel wurz/ Radices Mesues colli- git vere. Dioscorides incipi- ente foliorum defluuio, qui- bus sese interponit Plinius, qui effodit, dum est in suo vigore vel flore.
Tenuis capillo- sa.	Gnaphalum tormentosa, planta & incana, quibusdam herba Sancti Christophori, vel filius ante patrem, folijs albis, radix.	Longas	Lilij conuallij, radices demittit.
Radix ge- niculata dura ali- às solida odorata, melior est illyri- ca, quæ pumila, densa fra- ctuq; cō- tumax est sub- rufa co- lore gi- stu ama- ro.	Iris Domestica, officinis Ireos ex Dioscoride lib. 1. cap. 1. à celestis arcus simili- tudine cauo cauliculi sinu nomen accepit, flores in su- mitate cuiusq; caulis varij, siquidem candidi, pallentes, lutei, purpurei & cerulei cō- spiciuntur.	laxas fi- bris ca- pillamē- tisq; re- fertur. Radix al- ba oblō- ga, mol- lis rotun- da odo- rata cibo non in- suauis. Radix bulbosa rotunda odorata dulcis. Duplex bulbosa, longa, & rugosa.	Myrrhis simillima est ci- cutæ, ideoq; Germanis Wils- derforffel appellatur, passim apud nos in hortis proue- nit. Ornithogalum, Maio mense cum terra vomere ab agricolis proscinditur, inue- nitur. Orchis mas, radix. Orchis femina, radix. Oro-
	Iris vel Ireos sylvestris, quæ duum est generum, vna, satiæ per omnia similis, ni- si quod radices graciliores		

QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA.	MAIO, SOL in Geminis.	FORMA.	MAIO, SOL in Geminis.
Radix digiti crassitudine.	Orobanchis cauleculus, est sesquipedalis, & interdum maior subruher hirsutus.	Multis capillamentis tenuis.	Prunellæ radix.
Radix amara & crocea.	Oxylapathum, officinis lapacium acutum, vulgo rumex ex Diosf. lib. 2. cap. 105. quadrifariam distribuitur, Galeno trifariam. primum palustre Dioscoridi Oxylapathum vocatur, quod folia in acutum desinant.	Crassa longa calida odorata. Parua alba exigua multis capillamentis.	Petasites Fuchsi in principio mensis colligenda, hæc plantam Matthiolum pro Tussilagine maiori pingit.
Radix longa insignis amaritudinis coloris ex rubro et croceo diluti, Rhabarbaro affinis.	Secundum satium, folijs minoribus pluribusq; cauliculis, plebi lingua Hippolapathum, nunc ubiq; Rhabarbarum monachorum, alij pro Rapontica habitum.	Oblonga nodosa, exuberat. Bifurcata ramulis referta.	Ranunculi lutei hortensis.
Capillosa multifida.	Tertium genus sylvestre, paruum plantagini proximum humile & molle.	Digitum crassitudine longa alba.	Ranunculi lactei floris.
Longa et subflava.	Quartum oxalis siue Accetosa, quia gratum saporem palato representat.	Geniculum atata radix graminis similis.	Ranunculi lutei sylvestris.
Longa digiti crassitudine alba.	Paeonia mas.	Intorta uel obliqua adnatis floris.	Rapunculi, Rapsinzel Ger. radice in acetarijs vimur, Sunt qui pro Rapo sylvestri Dioscoridis pingunt, à quibus Matthiolum dissentit.
Balani circiter 6. aut 8. adheret.	Paeonia foemina, utraq; de crescente luna, effodienda contra epilepsiam.		Rusci germina aspargi modo veris tempore colligenda, quæ elixa manduntur ex oleo, sale & aceto, radix acerba & subamara.
			Sparti siue Spartij radix.
			Sani

FORMA.	MATIO, SOL	FORMA.	MATIO, SOL
	in Geminis.		in Geminis.
Radix rubris surculis ac capillis. Capillo sa ac furculosā. Multis fibris capillata, eiq; multa Coriari dri quantitatē referētia grana adhaerent. Radix bulbosa mali magnitudine, fulva intus, ut ouum cādida gustati dulcis & origrata. Cortex radicis gracilis, rufus, intus autē albū includitur.	Sanicula maris, quæ à Matthiolo pro quarta specie pentaphylli ponitur, quibusdam Diapensia vocata. Sanicula foeminae. Saxi fragi albi radix, officina non sine magno stupore grana adnata huic radici, pro semine vtuntur, cum semen in caulium cacumine proferatur. Satyrii radix vera, officinis, testis vulpinus, desideratur. Satyrium, Erithonion siue Erithracion, id est rubrū, semine lini maiore, duro, leui, splendente. huius cum dux sint species, prima accipienda erit Serapioni testiculus vulpinus, Galen. 9. de simpl. triphyllon appellata, eius ra-	Radice bulbosa oblonga oliuē modo angusta duplici ordine: superiore quę plenior est, inferiore, quę mollior ac rugosior. Radice bulbosa 5. aut 6. interdū 7. dependet. Maris radix flauescit, citra albedinem foeminae verò flauescit cū albedine. Radice per omnia rotunda.	dices nuperrimè defossæ, aut saltem recentiores immittendæ, confectioni nimirum. Est & Testiculus caninus, graecis Cynosorchis, in pralis nostris assatim luxurians, hanc supra orchim appellauimus, Germani Znachenzfrauz/ qui testiculus caoinus, Satyrii inopia, sub duplo satisfacere poterit, vegetiore et maiore testiculo accepto, floccido autē & rugoso abiecto. Calidus enim & siccus est, qui venerem coercit & reprimat. Satyrium Basilicum, rahi humanæ manus similitudinem refert, vulgo palma Christi, Germani Kretzblumen / à radice appellationem sumpserunt, quæ interdum 5. aut 6. profert radices, instar manus ramosæ. Et hæc planta duplex mas & foemina, siue maior & minor. Est & Testiculus qui Serapias Andreæ dicitur, portaceis folijs caule palmeo, liliaceis floribus purpureisq; respon-

QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA.

MAIO, SOL
in Geminis.

respondentibus, seminibus rotundis miranda serie in globos duplici, triplici; cornu digestis, pro Satyrio substituendus, Germani vocant Ragwurz / & huius duo genera mas videlicet & femina.

Urtica nulli non cognita, cuius ex Dioscoride duo genera statuuntur, vnum sylvestre quod est asperius, nigrioribus foliis, semine lini, sed minore, alterum non aque asperum, minuto semine, vtriusque radix Maio & Iunio effodienda.

Thlaspi radix, ex Diosco. lib. 2. cap. 150.

Oblonga
radix &
fibrosa.

Magna
utilis in
Ischia
morbis.

FORMA.

IUNIO, SOL
in Cancro.

A Canthus sativus verus, Germani Welsch bernfle.

Acanthus sylvestris, longè distans à Sphodilio sylvestri, radix ad eadem, ad quam superior efficacior est. planta Scolymo similis, brevior quam sativa.

Aquilegia radix.

Acorus verus, cuius radicem quidam Galangam esse putant, ut Braslauolus Mauritianos secutus, quidam ut Manardus & Matthiolus Calamum aromaticum, quorum sententia magis mihi placet, quod & Aquarius in sua compositione Theriacis confirmat.

Acori palustris, alio nomine pseudacorus, Germani Gelbwasser liliën.

Aconitum, Lycostonum, Seplasi, Lupariam hodie appellare solent, Germ: Wollswurz / Matthiolo Aconitum secundum in ordine erit.

Crassa.
Radix densa, candida, plena, carie non exesa, odorata, quæ ex Galatia & Colchide affertur. Densa, candida & geniculata.

S Aspho-

QVO TEMPORE RADICES COLLIGENDAE.

FORMA.	IVNIO, SOL in Cancro.	FORMA.	IVNIO, SOL in Cancro.
Bulbosa radices, oblonga rotunda, glandib' similes quæ in- terdum 80. exce- dunt Pli- nio au- tore lib. 21. cap. 17.	Asphodelus vel hastula Regia, ex Diosco. lib. 2. cap. 164. hac officina in Ger- mania omnes carent. nam q hactenus usurparunt, duntaxat Lilij genus.	Cōtorta oblonga & inuo- luta.	Bistorta mas. Bistorta fœmina, Germa- ni vocant, <i>Watter wurz</i> / v- tramq; Scplasiarij radicem, falso serpentariam nomina- runt, Radices.
Rotunda radix in orbem conglo- bata rapi- modo.	Aristolochia, tria sunt ge- nera, ex Diosc. lib. 3. cap. 4. Rotunda fœmina vocatur.	Oblonga densa, tra- ctu con- tumax radix est.	Cyper, Germani wilder Galgan / Et si vnus tantum meminit Diosc. generis plu- res tamen hodie reperiuntur Cyper.
Longa verò di- gitis cra- ssitudine & longi- tudinem implet. nonnun- quam paulo maiorē.	Longa, mascula, nonnul- lis Dactylitis, longiore, quā rotunda folio.	Simplex radix, sed fibrosa.	Curcuma, quæ & inter Cyper radices, odoris gra- tia reperitur. Chamamilla, Græcis An- themis, radix quoq; siccari debet, dumq; ingruit neces- sitas, autore Diosc. cap. 137. lib. 3.
Longio- res tenu- es crasso cortice, odorato- q; vestis- tas.	Est etiam tertia Aristolo- chia longa, quæ Clematidis vocatur folijs subrotundis, minori semperuino similis floribus rubeis, Radices.	Radice longa fa- porea ma- nuculo, limul & acri. Radix oblonga paucis fibris. Intorta candida.	Carum officinis, vulgo ca- rui planta in pratis omnibus notissima, Germanis. <i>Wasser sumich</i> . Cynoglossi vulgaris floris- di, Germ: <i>Hundezungen</i> . Campanula. Chamedrys siue Trifago, Germani Chamederle & Bat- tengel duplex, vnam quā describit Theoph. lib. 9. cap. 10. cuius radices pars supe- rior, p superiora, hoc est, per vemis

QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA.	IVNIO, SOL in Cancro.	FORMA.	IVNIO, SOL in Cancro.
Radix multifida, & albicans.	vomitum, inferior pars per secessum siue inferiora, purgat.	Radix digitali crassitudine, & dodrantalis longitudine adole-	Daucus primus, quem Diosc. lib. 3. cap. 69. creticum appellat, Germ: Bermurz/ nascitur & probatissimus in sylua Turingiz, non procul à Sula oppido in monte excelso, & syluis Martianis, vulgo Schwartzwald.
Crassa in latis colibus.	Chamedrys altera ex Dioscoride lib. 3. cap. 96. folijs est quernis, flore purpureo.	Radix oblōga, extrinsecus nigra, intrinsecus alba, superius fibrosa seu capillosa.	Daucus secundus, folijs laeseritijs Germ: Weiß hirtz wurtz / hic reperitur in monte non procul à Tubinga, dicto Spitzberg.
Gracilis in montosis, in profundo alba, aliquatenus aromatica, grani odore, dulcis, Germani Eberwurtz.	Chamæleon albus, ex Diosco. lib. 3. cap. 8. quibusdam Ixia vocatur, quod circa radices in locis quibusdā viscum inueniatur, quo pro Mastiche vtuntur mulieres, flores habet purpureos, veluti papporū, lanugines emitit, semen Chico simile, radix pro ratione loci diuersa.	Radix nigra digito tenuiore.	Daucus tertius, qui pallinacæ syluestri similis est. Germani schwarz Hirtzwurtz.
Radix crassa, nigra, densa, interdum exesa, quæ dissecta flauescit, & commandata mordet.	Chamæleon niger, Germ: schwarz Garten distel / folijs scolymo similis, in umbella flores spinosi, tenues hyacinthi æmulos, versicolores.	Oblongam digiti crassitudine.	Ebulus radix longa, huius interdum vtimur, ut sambuci, cortice medio flore & folijs.
			Echium, Germ: Wildt ochsenzungen / alio nomine Alciabiaceum appellatum ab inuentore, author est Nicander, Echion autem dictum, quod resistat veneno.
			Eringij radicem, effodimus in monte Lympurg, prope Halam Sueuorum.
			S 2 Erucæ

QVOTEMPORE RADICES COLLIGENDAE.

FORMA	IVNIO, SOL in Cancro.	FORMA.	IVNIO, SOL in Cancro.
Candida capitulata.	Eruca sylvestris.	Radix longa, mediocriter crassa & rugosa, dura lignosa, que foris nigra, intus subviridis.	Imperatoria folijs sphondylis minoribus, solo acubantibus, robustis, hirsutis, ac asperis, in cacumine umbella floribus candidis.
Radix magna, in multa capitula extuberans.	Filipendula, Dioscoride Oenanthe dicta, folia pastinaca similia habet.	Longa et fibrosa.	Intybus sylvestris duplex, prima picris, quæ & Cichorion vocatur, German: Wegwartten.
Radix longa crassa amara.	Gentiana maior, copiosa nascitur in monte Hewberg/ qua itur à Balinga, oppido ducatus wirttembergensis Duttlingam.	Longa et fibrosa.	Altera, folio latiore lactuca similis, solo strato.
Graminis modo obrepit ex albo, qua erumpit sub rubra.	Gratiola radix, vehementer amara. quibusdam gratia Dei nominata.	Multi-fida crassa longa, digiti crassitudine.	Limoniij veri, Germani Holz mangolt wurzel / hanc radicem officina falso pro Ben rubro usurpant.
Radix magna, alba non strumosa ut scrophularia.	Galiopsis latinè, item Galiopsis, siue vrtica labeo, & vrtica foetida. longè à scrophularia distans, Galeopsis officinis incognita.	Radicem longam & simplicem.	Limoniū secundū, folia pauciora habet, quam Theophrastus lib. 6. histor. plant. cap. 3. inter beram sylvestrem numerat, Plinius lib. 20. cap. 8. Limonium vocat.
Intorta punicea.	Hepthaphylli radix.	Oblonga crocei intus coloris radice.	Lalerpitij, officinis Magistrantia, Ostrutij vel Astrutij Germani Meisterwurzel nominatur.

Lilij

67
QVO TEMPORE RADICES COLLIGENDAE.

FORMA.	IVNIO, SOL in Cancro.	FORMA.	IVNIO, SOL in Cancro.
Radici- bus ni- tuntur bulbosis, albican- tibus cōs- pactili se- rie squa- marum sursum spectan- tibus.	Lilij albi. Lilij crocei.	Obliqua & capil- losam. Subalbi- cans.	sis, aut apij, de qua re latius cōsule Vercellensem, virum apprime doctissimum. Ra- dio primo. Pes anserinus, radicem habet.
Radix blanda ca- pillosa, seu fi- brosa.	Marrubij ex Theoph. lib. 6. cap. 2. hist. plant. duo genera. primum, Marrubiū album, Germanis weiß an- dom/ folio est herbido. alte- rum Marrubium nigrum, Diosc. lib. 3. cap. 100. βαλ- λων διδύμ, Germ: schwarz ger andom.	Radix candida, arundis nacea te- nera, sū- ma tellus re vagā- te crebris articulis genicula- ta, densa & odore gravi.	Pyrolæ radix non alte de- scendit in terram, errant qui hanc plantam, quam Ger- mani vocant Winter grūn/ Limonium genuinum fa- ciunt, differuit de hac re Mat- thiolus. Polygonati, Seplasijs si- gilla Salomonis dicta, vel S. Mariæ, Germani weißwurz.
Radix vna sed fibrosa.	Parmica, latinis Sternu- tamentaria, ob saporem a- crem quem habet, quidam pyrethrum vocant. Pes Leonis Fuchsi, Mat- thiolo stellaria dicta.	Radix mollis & lenta.	Sphondilij sylvestris, plan- ta & radix frequentissima in pratis vliginolis, & quā quidam pro Acantho Ger- manico olim depinxerant, Scrophulariæ maioris ra- dix.
Obliqua fibrosa.		Magna & stru- mosa.	
Longa subrube- scens.	Pentaphylli latini, quin- que folij Dioscoridis, hodie autores adhuc tres species obseruant, prima prior non ablimilis, verum hirsutior folijs, flore candicantibus. Secunda pumila; sub albida ad terram, ut plurimum re- pens, quarta folijs vitigino-		
Subru- bra ob- longa & fibrosa, veratro nigro crassio- re,			S 3 Spinam

QVO TEMPORE RADICES COLLIGENDAE.

FORMA.	IUNIO, SOL in Cancro.	FORMA.	IUNIO, SOL in Cancro.
	Spinam albam, quam quidam Carduum benedictum putant esse alij Carlinam imperatoriam, id est, album chamæleonem, Fuchsius p Spina alba Carduum Diuæ Mariæ pingit, Germani <i>Sedstet</i> / Matthiolus aliam ab his longè diuersam ostendit, folio chamæleonti similis, spinis rigentibus, caule bicubitali, in cacumine echinus subalbidus, intus flos purpureus, semine Cnico simili, in montibus vbi piceæ syluæ, Iulio mense conspicitur, pro inopia huius radices vti licet ea, quæ Carduus Mariæ dicitur, donec altera sese ostendit.		gitimæ adeo persimilis, & iisdem locis agnascens, ut primo intuitu peritissimos, etiâ herbarios fallat. verum crassior tota est, nec amarescit, nec adeo hirsuta.
Radix cardui Mariæ dura & amara.	Saxifragæ luteæ.	Radix foetidis nigra, intus subalbida, succosa, odorata fauces mordicans.	Smyrniū Fuchsi, quod Germani <i>Libsticket</i> vocant, Mathioli Hipposelinum est, ut & supra monuimus.
Subcandida.	Sanguisorba maior.	Magnâ oblongâ quæ ad purgandas lanas conciditur.	Smyrniū Mathioli exterius nigricat, interius ex albo virescit, succosa & odorata.
Radices crassæ, & longæ.	Sanguisorba minor, quam sunt qui has plantas, & pimpinellas vocant, attamen cum viribus inter se plurimum dissent, ratio nominis diuersa imponere iussit.	Radix tenuis obliqua.	Struthium, vulgo Lanaria Germani <i>seyffenfraut</i> / radicem habet.
Crassa.	Scabiosa, quæ cum Maio & Iunio ad Octobrem vsque florescit, per totum hoc tempus valida erit radix, sicuti et reliquæ omnes plantæ, quam diu florent.	Radix crassa & nigra, effoditur secundo aut tertio anno à satione.	Staphisagria, vulgo strusaria siue herba pedicularis, in Germania nobis frequentissima.
	Est & pseudo scabiosa le-	Obliqua & fibrosa.	Strobilus siue Carduus aut cinaria latinis, Scolimos grecis, Germanis autem <i>Strobildorn</i> / Dioscorides licet vnius tantum lib. 3. cap. 4. meminit. Theophrastus tamen et Plinius plura tradunt genera.
			Si siue Laueris, Germanis <i>Bachmünz</i> .
			Sola-

QVO TEMPORE RADICES COLLIGENDAE.

FORMA.	IVNIO, SOL in Cancro.	FORMA	IVLIO, SOL in Leone.
Radice gradi sub rubeo cortice vestita.	Solanum somniferum, qd alij etiam Halicacabum vo- cāt, folijs piuguib ⁹ , flore grā- di, rubeo, fructu in folliculis crocato. Scylla hoc mense, quo se- cundo floreat colligenda, quanquam Gal. libro 1. de Antid: cap. 9. mēsis tempo- re colligere videtur.	Diuisa firma & lignosa. Candida & fibro- sa.	A bsinthij pontici radix. Aron, apud Siros Lupa, Germanis hien Natterwurz/ folia emittit dracunculi, sed longiora & paucioribus di- stincta maculis, radix. Anchusæ species, Germ: wildt Ochsenzungen / effoci- untur omnes ætate.
Radix gustu dul- cis, iucū- daq; & longa.	Tragopon Gracis, Barba hirci latinis, Bochebart Ger- manis, hæc radix longè dis- fert à Tragopogo altero, qd purpureis floribus constat, hæc enim longior, grādi- or, robustior & durior est. Præ- terea amara & adstringente facultate est prædita.	Crassitu- dine di- gitali, bi- fida. Crassa ni- gra & ra- mosa, gu- stu acris & odori rata.	Angelicæ sativæ radix eruitur tertio anno à sara, mense Iulio & Augusto.
Tenues q in plures diuaria- tur par- tes.	Veronica mas. Veronica foemina.	Pollicis crassitu- dine & sæpe mai- ore.	Angelicæ sylvestris radix.
Digiti crassitu- dine om- nes fibro- sa & ob- liqua.	Vrtica Romana. Vrtica maior. Vrtica minor.	Pyri mo- do extu- berat & fibrosa.	Androseni radix.
		Radix crassa ma- gna siue prægran- dis & candida.	Bryonia siue vitis alba, weiß stückwurz / ea si in vm- bra sicatur per annum du- rat.
			Bugloss

QVO TEMPORE RADICES COLLIGENDAE.

FORMA.	IULIO, SOL in Leone.	FORMA.	IULIO, SOL in Leone.
Albam teneram pollicari crassitudine. Radix in rubro pallida, radiculis referta.	Buglossum magnum siue Borago, radicem ostendit.	Candida & amara.	Dictamni albi, radix aestate & autumnno, Dioscoride autore, effoditur, Germani Diptam vocant, officinae vero Diptamno (ut deprauata voce scribunt) carent. vtuntur Pseudodictamni radice, quae est inutilis, hoc est, non adeo efficax ad ea, ut vera dictamni radix.
Crassa grauis, solida tripedatis radix.	Centaurij maioris, Germani non sine errore Rbaponticam vocant, radix est succo praegnans, cum adstrictione aliqua & dulcedine acris & rubescens.	Crassa radix & bifida.	Dipsaci siue Labri veneris syluestris Germ: wild weber farten/ officinis, virga pastoris nominatur.
Radix rotunda, aliquid bulbosa aro non ab simili, tenui obducta cortice.	Dracunculi minoris, radix messis tempore effoditur, lotaq; frustratim conciditur, & lino traiecto siccat in umbra, & ita reconditur, Germani vocant Blatterwurz.	Magna subalbida.	Elenij radix. Germ: Altmurz/ aestate effoditur. particulatim dissecta siccat.
Radix grandis candida rotunda, tenui vestitur cortice inferius fibrosa, instar cepae.	Dracunculi maioris radix, Germ: groß Blatterwurz/ messis tempore colligenda, siccanda in umbra.	Candida, crassa & numerosis capillamentis, carnosa & friabilis.	Elleborus albus, latinis veratrum album, Germani weisß niesßwurz/ radix messis tempore colligenda.
		Numero sa cum longis fibris.	Ellebori nigri, cum floribus purpureis.
		Crassa cum numerosis & longis fibris.	Elleboris nigri, cum floribus candidis, estq; potius consiliginis species.
			Ellebo-

QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA.	IVLIO, SOL in Leone.	FORMA.	IVLIO, SOL in Leone.
Palmarilongitudine, cū numero sis capillametis.	Ellebori nigri, cum floribus herbaceis, radices omnes messis tempore colligendæ, quoniam halitu caput aggrauant, qua propter ad id arcendum fossuri, aliū præsumere & vinum bibere iubent.	Radix brevis, folio Lactucæ amara, cōstat, ied scabriori cādidiōriq;.	Libanotidis seu Roris marini sterilis radix colligitur per messem tritici, de qua Theoph. lib. 9. cap. 12. Radix hæc partim superius, partim inferius purgat, quod enim germen verius consistit, superius purgat, quod terram altius descendit, inferius.
Radice longa, & capillosa.	Eleoselinum, Germani Epffich / latini Apium palustre & rusticum.	Longa flexiles & lentæ.	Maluæ sylvestris, Germani Bess pappeln wurzel.
Radix alba, gustu amarissima.	Gentiana minor, alio nomine Cruciata, Germani Creutzwurz / eo quod pluribus locis ab utroq; latere crucis instar perforata est.	Radix ruffa.	Meliloti, Germani vnser frawen schulein.
Radix longa foris nigra, intus lutea, Plinius lib. 22. cap. 9 carpit radice Vergiliarum occasu.	Glyzericæ radices, Germani Süßholz / nusquam maiori copia plantari vidi, quam in agro Bambergensi, vbi sedes est Episcopalis.	Radix candida & lignosa.	Ononis græcæ, Restæ bouis latinæ, Germanis Stalfraut.
Rad: syluestris, Myrto similis, maiore molliore et odorata.	Laurus Alexandrina, ab Hippoglossio diuersa, ut ex Dioscoride apparet, fructum fert rubrum ciceris magnitudine inter folia, non autem in medijs folijs, ut Hippoglossum & Ruscus.	Radix nigra, crassa, graui odore succosa.	Personata, græcis ἀρκεύς, officinis lappa maior, Germani groß fletten wurzel.
		Radix multifida.	Peucedanum, quod alij fœniculum porcinum vocant, gignitur in montibus opacis, nos vidimus & in pratis humidis magna copia florere, non procul à Rottenburg iuxta Tubarim, quo itur versus winshemiam oppidum imperij.
			Portulaca hortensis, Græcis Αρσάχνη, Germani Burszel fraut.
			T Portu-

QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA.	IVLIO, SOL in Leone.	FORMA.	IVLIO, SOL in Leone.
Radix multifi- da, cras- sior q̄ in dome- stica.	Portulaca sylvestris, fo- lia gerit priori similia, sed multo minora, & oblongio- ra, cetera consimilia sunt.	Digit. crassitu- dine ex obliquo villosa gravi o- dore.	Phu magnum, officinis Valeriana, Germ: Baldrian. Phu paruum.
Radices crassę, ob- longę, & subru- brę.	Pimpenella maioris. Pimpenella minoris.	Parma albicās.	Phu minimum radix.
Extrin- secus pur- purea, in erinfecus alba.	Potentilla, agrimonie nō dissimilis, nisi quod folia hirsutiora habet, supernē vi- rentia, infernē albicantia	Palmar longitu- dine, & digit crassitu- dine, cā- didā.	Petroselinum hortense, si- ue Apium, Germani Peters- lig wurzel/ quo crebrō in iu- sculis vtimur.
Radices tenerę, hirsutę, candidę, digitali crassitu- dine.	Radix. Plantago maior. Plantago minor. Plantago longa.	Radix palmar longitu- dine & digit crassitu- dine.	Petroselinum Macedoni- cum, latini idem quod græci vocant folijs apio Aquatico simile, sed minoribus, caule crasso, ramoso, floribus al- bis, semine hortensi, petrose- lino non absimile.
Digit crassitu- dine lon- gę, albę.	Pastinaca sylvestris, græcē σαφύλιν & ἀγρία, Germanicē pastinachen / licet radix passi- nacę, satius multo efficacior sit, inutilior tamen cibo est.	Radices habet py- ri figura- ternas aut qua- ternas, ni- gra exte- rius cutē, alba int ^o pulpa.	Pseudapios siue Rapha- nus sylvestris, Germani Erd- nuß oder Erd mandel / radix eū nulla vi purgatoria, præ- dita sit, pro Apio verō Dio- scoridis, non habenda erit.
Longa pollicari crassitu- dine gu- stu fer- uentissi- mo & i- gneo.	Pyrethrum, quidam sali- uarem vocant, radix offic- inis omnibus nota, Germani Bertram.	alba int ^o pulpa. Nigra & crassa. Magna crassa & candida.	Papaueris corniculati, ra- dix per summa cespitum.
			Rosmarini fructiferi. Seseli

QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA.	IVLIO, SOL in Leone.	FORMA.	AVGVTSO, Solin Virgine.
Radices sunt longæ & odoratæ, hoc est, iucundi odoris. Supina, q̄ & sacra herba dicitur, cum floribus purpureis radice constat longa & tenui. Recta, q̄ <i>περιστερη</i> dicitur, radice constat sola. Gradior, longior, robustior, durior, et laeteo succo referta quam Tragopon, prius mum luteis floribus.	Seseli, Arabibus <i>fiseli</i> os, officinis Siler montanum dicitur, ex Diosco: multiplex est, Massiliense, Creticum & Æthiopicum. Seseli Germani <i>seffel</i> & <i>Stainbrech</i> vocant. Verbenaca, græce <i>περιστερη</i> dicitur, diuiditur in Rectam & Supinam, & marem & foeminam, quæ inter se confunduntur. Fuchsius mari tribuit luteos flores, foeminæ purpureos, Plinius lib. 25. cap. 9. foliosam foeminam, marem rarioribus folijs constare scribit. Tragopogi, alteris quod purpureis floribus constat, radix potius Iulio effodienda, radice nititur adstringente & amara, præterea radix est.	Radices numero- sas tes- nues & odoratas Lenta in- tus alba. Candida fibrosa. Radicis bulbus tenuis ve- latur mē- branis, mox plu- ribus co- agmen- tatur, nu- cleis & ijs sepa- ratim ve- stitis, in cuius ver- tice com- plures fi- bræ cir- corū ex- emplo- crispan- tur, radi- oso ha- bitu & a- spero sa- pore.	A Selepias, Germani <i>Schwalbenwurz</i> . Altheæ siue Ibisci radix. Ammi, Germani: <i>Ammei</i> , cuius genituo ammeos vr- tuntur officinæ, ex Dioscori- de lib. 3. cap. 59. Æthiopi- cum cuminum appellant. Allium vulgaris notitiæ, Germani <i>Knoblauch</i> vocant, Est verò unum hortense, de quo meminit Theophrastus lib. 7. cap. 4. histo. plant. Al- lium ante solstitia feritur, aut paulo post nucleatim diui- sum. Discrimen eorū quod aliud præcox, aliud serotinum: est enim genus quod- dam eiusmodi, ut sexaginta diebus perfici possit. Diffe- runt præterea magnitudine singulari. Cyprium voca- tum maxime tale est, quod non decoquunt, sed in myr- totis vtuntur: & cum tundi- tur, mirum quam spuma in- creseat. Quin & illud diffe- rentiam facit, quod quædam non nucleis coagmentatur. Dulcedo autem & odor, & crassitudo, eorumq̄ causâ tē- pore, cultuq̄: pene videtur cō- tingere, ut etiā aliorū, perfici- T 2 etiam

QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA.

AVGVSTO,

FORMA.

AVGVSTO,

Sol in Virgine.

Sol in Virgine.

etiam semine potest, sed tarde: primo enim anno caput accipit porri, sequenti discerni in nucleos incipit, tertio redditur perfectum, nequicquam deterius, sed etiam quidam vel deposito melius id existimant. Radicis autem allij, aut cepæ, haud similis ortus fieri solet, de quibus idem autor scribit.

Radix bulbosa & capitata nuscis, spicatum copacilibus intumescente, summo vertice capillamentis fibrato. Radix longa & fibrosa. Radix longa & fibrosa. Foris atram, intus candidam.

Alterum sylvestre Allium, quod græci ἀσκόρδον, latini anguinum allium appellant, satiuo longè minus, sed odore & sapore persimile: Germani wilder knoblauch. Est & allium sylvestre, quod nos Germani feld knoblauch vocamus, longè distans ab allio ursino, Germ: Wald knoblauch.

Cichorium satiuum, folio est lato.

Cichorium sylvestre, Germani Wegwarten wurzel volio est angustiore.

Fragariae, Germ: Erdbeerradicem habet.

Radicibus albis graminis modo serpentibus.

Radix solidolida nodosa, foliis ex nigro rubescens, colore intus heribaceo, ut pistaceum, sapore dulci, austero tandem subamaro non nihil aromatico.

Vnicam radicem habet, superuacua ex qua fruticat.

Lepidium, quod aliqui gingidium vocant, ab Iberide Diosc. in calce primi libri diuersum, quod Aëtius Tetrab. 4. serm. 2. cap. 133. describit, olus esse in Syria, folia habens seridis angustifolia, foliolis oblongis, & crenatis flore lacteo, & chamamelæmulo, minore tamen: Et si Matthiolus secus sentiat.

Polypodium, siue filicula ob similitudinem foliorum cum filice, quibusdam etiam glyzerica sylvestris dicitur, ex Mesue præstantius est, quod arboribus præsertim glandiferis innascitur.

Peplus latinis, officinis & vulgo.

Esula rotunda, frutex est albo liquore plena, folijs paruis ut rutæ, latioribus tamen rotunda coma, ferè dodrans tali humi respersa. radix colligitur mensibus, siccatur in umbra & continuè versatur.

Pityusa

QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA.	AVGVSTO,	FORMA.	AVGVSTO,
	Sol in Virgine.		Sol in Virgine.
Radix crassa, cãdida, succo referata rustico rum purgatoriũ, cortice denso & graui, hæc radix magna impostura per turpeto venditatur, quẽadmodum & Tapfig radices.	Pityusa Dioscoridis, idem est, quod Scebra Serapionis, officinis Esula, ut etiam thymalorum omne genus indifferenter usurpatur, herba est lactaria & hortensis hirsuta, à Cyparissia differt, folijs picez, acutis, exilibus flore paruo ueluti, purpureo semine instar lenticulæ, lato, quæ omnia conueniunt descriptioni Mesues in Esula maiore.	Radix lōga, subrusta, digitali crassitudine.	Symphytum petrcum, nascitur in petris, ramis tenuibus paruis, origano similibus, capitulis & folijs thymi.
Radix ex ignis, cortice tenui, parua hæc præstator est priori.	Esulam minorem describit idem Mesues: quæ maiori sit præstantior, præsertim cortice, & eo quidem tenuiore, leuiore, fractu facili, cassiæ modo subrubente, senis nõdum mensibus transactis collecto, nam recens quo mense legitur mala est, uti & nigra, orta aliquo loco propè thermas.	Radices raphani variaz, alia longæ, alia breues, alia crassæ, alia fragiles.	Raphanus, radix latinis dicitur, cuius genera multa notauit, Theoph. 7. de historia plant. cap. 4. vulgo nostro duplex, alter satius, Germani Reddich vocant.
Radix mollis lēta, & viscosa int⁹ exterius nigra ras mofa.	Symphylum maius, siue consolidida maior, Germani groß waltwurz / quod aliqui pecton vocant, cuius est visus.	Radix dura, lōga, crassa acris.	Raphanus syluestris, Germani Bren vocant, quo utimur ad carniū intinctus, vere ineunte, ceu altero hie me potissimum.
		Hortēsis radix tenuis rubra, capillosa seu fibrosa. Syluestris lōga bifida & capillosa	Rubia tinctorum officinis, Græcè Erithrodanum, ex Dios. lib. 3. cap. 137. radix rubra est, quæ tinguntur lanna. vna est hortensis, altera syluestris. Germani serberrot vocant.
		Radix lōga, geniculata ruffa.	Spatula fœtida, Germanis Wandtleuß, Græcis Xyris.
			T 3 Succisa

FORMA.	AVGVSTO, Sol in Virgine.	FORMA.	SEPTEMBRI, Sol in Libra.
Multifidas habet radices nigricantes, succitās & circūfōiās.	Succisa, quā vulgò Morsum Diaboli vocamus, nomen superstitiosum a radice inuenit.	Radix bifida, crassa, fibrosa.	A Brotani maris planta, vulgaris notitia.
Fœminæ radix lōga gustu amara, sicuti de diuersis generis radicibus.	Verbascum vulgò Tapsus barbatus ex Diosc. lib. 4. cap. 89. differentias summas duas habet, hoc nigrum, illud album, in quo mas & fœmina. Mas nigrum, fœmina candidum intelligitur.	Crassa lōga & fibrosa.	Abrotani fœminæ, planta arboris specie fruticat, quā alij Cypressum, alij Santolinam vulgo appellant.
Radix foetida nigra, intus buxo colore reniter.	Viris nigra, quā aliqui nigram Bryoniam vocant, græce ἀμπέλου μελαινα.	Radice fibrosa.	Brassica satiuæ, Græcis κράμβη ex Theophrasto multa genera recensentur, id qd & horti nostri in germania attestantur, nempe
Radix psumma cespitū nigra, oblōga, filices multas fundēs.	Filix mas, folia sine fructu & flore, Germani waldfarren.	Radice capillōsa.	Brassica lauis folijs grandibus latisq.
Radiceb lōgis plurib oblōquis, q ex nigro in luteū flauescunt.	Filix fœmina, folijs est filicis furculosis altioribusque, & quæ non singulari, ut illa pediculo sulciuntur.	Radix ramosa & fibrosa.	Brassica crispa.
		Graminis modo serpit & fibrosa.	Brassica capitata.
		Radix superius crassa, inferius ramosa.	Brassica Marina radix.
		Radix bifida.	Beta alba Germanicè weisfer mangolt.
		Radices oblongæ et rotundæ.	Beta nigra.
			Beta rubra, quæ non modo folijs, sed etiam radice colore rubeo nitet, Germani vocāt roet ruben / hanc infusilibus uasis, preparant cū aceto

72
QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA.	SEPTEMBRI, Sol in Libra.	FORMA.	SEPTEMBRI, Sol in Libra.
	aceto, feminibus anisi, fœniculi, coriandro, & raphano rusticano, ad esum.		re, quo fructum gerūt, quod Septembri menie fit, sine omni periculo vitæ.
Radice nigra, & aliquantulu lata ut rapū videri possit.	Cyclaminus, vulgò panis porcinus, Germani Schweinbröt / Erdtappfel / planta vulgaris notitiæ radix, scillæ modo concisa reponitur.	Radix bulbosa, intus alba, rotunda.	Narcissum, quidam liliū, uel liriū appellant, Germani zeylosen & Homungsbliemen.
Radice candida magnâ.	Cucumis sylvestris, siue cucumis auguinus, Germani wilder Cucumer / fructu solo distat, à satiuo cucumere, quē longē minorem parit.	Radices nigre, scabra, claua similes.	Nymphaea, vtraq; tam alba quā lutea Seplaharijs nomine Mauritano Nenuphar appellatur, ex Dioscoride, autumno radices secandæ sunt.
Fœmina radicibus inhæret benè magnis, binis ternis inter se cōuolutis, nigris foris, intus albis, crassocortice vestitis caulem non fert.	Mandragora, aliqui antimelum, alij circæum vocant, quoniam videtur radix ad amatoria conducere. Duo eius sunt genera, vnum nigrum, quod fœmina existimatur, tridatias appellatum.	Radice alba, scabra.	Nymphaea parua, cuius flos blephara dicitur, flore lacteo nitente, rosæ simili.
Radix crassa magna bifida orbiculata, seu rotunda.	Alterum candidum, quod mas dicitur, nonnullis morion vocitatur, radix alterius similis maior & candidior, effodiendæ radices eo tempo	Radix ruffa.	Pastinacæ satiuæ, Germanicè pastiney & pastinachen / radix in ciborum usum recipitur, vnde nomen à pascendo inuenit. Est vero duplex pastinaca satiuæ, vnam vulgò carotas, Germanicè zamrotuben / vocamus, à radice Betæ rubæ distans, feritur & in horto Decani Coburgensis, vbi & alix multæ plantæ singulari cultura fouentur.
		Radix flaua, crassa et oblonga.	alteram pastinacam, Germanicè Gelb ruben appellamus.
		Crassa capillosa odorata.	Rhodix radix, Germani Rosenwurz / quam sapissimè cultam vidi in horto domini Fuchsj pij defuncti.
			Viscum

QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.

FORMA.	SEPTEMBRI,	FORMA.	OCTOBRI, SOL
	Sol in Libra.		in Scorpione.
	<p>Viscum cum acinis etsi in robore, malo, pyro, & plerisque alijs arboribus reperitur, attamen quod in radicibus quercinis, aliarumq; arborum glandiferarum nascitur, ceteris longè magis excellit, autumnii initio cum suis acinis decerpitur.</p>		<p>Napus in raporum genere recensetur, cuius duo genera tantum, nouimus hoc tempore albū & flauum. Flauī tametsi albas crassitudine superent, magisq; colore placeāt, sunt tamen inspidiores, ob id gustui minus grati, Germani Gelb vnd weiß steckruben vocant.</p>
		Rotundū	<p>Rapum satium, vulgo notissimum, Germani weiß ruben / Octobri mense, cum ad summum extuberauerit, radix è terra eruitur. Est verò triplici genere.</p>
		Longū.	
		Sesile.	

73

OL
m ge-
cuius
ntum,
re albi
rectal-
perent,
at, sunt
bid ge-
german
oben vor

vulgi
ni trop
se, an
tracul-
Eli te

in Scorpione.

Sol in Sagitario.

V

DE.

QVO TEMPORE RADICES SINT COLLIGENDAE.			
FORMA.	DECEMBER,	FORMA.	IANVARIO,
	Sol in Capricorno.		
	Eryngij, radix quibus- dam, Decembri mente legi- tur, locis præsertim meridio- nalibus, vbi clementior aër est.		

74
QVO TEMPORE SVCCI SINT COLLIGENDI.

FORMA.

FEBRVARIO,

FORMA.

MARTIO,

Colore
ruffo, pu-
rum pel-
lucidum
tenue o-
dore exi-
guo, sed
grato sa-
pore, dul-
ci & sub-
acri.

Oleum commodissime
circa 6. Idus Februarij
ex oliuis exprimitur:
non enim statim postquam
Nouembri aut Decembri
collectæ fuerint, exprimen-
dum erit, nisi in pauimentis
& tabulatis, donec rugosæ
fiant prius seruentur, & non
nisi priusquam sudent præ-
mendi, postea affusa seruen-
ti, aqua torculari supposita,
præmuntur ut oleum sequa-
tur.

Salicis succus, triplex, Pli-
nio lib. 24. cap. 9. autore,
primum succum arbor
spontè exudat. Secundus ma-
nat in plaga, cum floret exci-
so cortice trium digitorum
magnitudine. Tertius appa-
ret detruncatione ramorum,
autumni tempore destillans
à falce. Est & albicans spu-
ma, quæ in Salice reperitur
statim post delapsos flores,
quæ spuma è ramusculis vix
modo dependet, donec ven-
tis abrepta, huc & illuc plu-
mæ modo impellitur. Dio-
scorides vnius tantum succi
meminit, qui manat mense
Martio cum florent salices,
qui ad purganda quæ ob-
stant, oculis vim suam præ-
bet.

V 2

Vio-

QVO TEMPORE SVCCI SINT COLLIGENDI.

FORMA.

MARTIO.

FORMA.

APRILI.

Violarum succus, vere adueniente è floribus purpureis, per infusionem aquæ elicitur, infunditur & aceto, quod violatum acetum appellatur.

Cádidus est succus dum recens est: dū aruit colore foris croceo, aut subflauo intus. cádidus, odore grati, sapore amarissimus, lenis pinguis friabilis tener, facile in aqua liquefcens, niger impabatur ac mollis. Adulteratur Ammoniaco aut cera.

Pentaphylli siue quinq; folij succus, ex radice tenera exprimitur, contra locinocis pulmonisq; vitia, item aduersum venena.

Panacis succus, græcis Opopanax, liquor e panacis Heraclij radice incisa, recenti adhuc caulium pullatu effluit, folijs excauato solo stratis, quæ siccata tolluntur. Simili modo caule mensesibus inciso, profluentem succum eximunt.

QVO TEMPORE SVCCI SINT COLLIGENDI.

FORMA.

APRILI.

FORMA.

M A I O.

Recens
succus
croceus,
& ama-
rus adeo
est, ut vix
degusta-
ri possit.

Rhabarbari succus, ex ra-
dicibus ineunte vere, in ipsa
prima foliorum germina-
tione elicitur, aut infusione,
aut stillatione; vbi radices re-
centes particulatim dissec-
ta fuerint, aut verò expres-
sione, succo enim madent
copioso, tum croceo, tum
purpureo, qui suo colore fa-
cile manus implicat, & colo-
res inficit, dum radices re-
purgantur et secantur in par-
tes, vbi verò Æstate erutæ fue-
rint radices, foliosa exilente
planta, tanquam euanidæ
croceo illo succo carent, quo
fit ut viribus infirmiores ha-
beantur.

Vitis alba siue Bryonia,
succum vere ex radicibus
Dioscorides lib. 4. cap. 276.
exprimit, qui trahit pituita,
cum aqua mulsâ potus. Ad
pforas et lepras semen effica-
citer illinitur. Succus è con-
trita radice expressus, multis
morbis mirifice prodest, de
quibus cōsule Matthiolum.

A Nagallidis, tam maris
quam fœminæ, succus
veris tēpore, quo flo-
rent, ex tota planta exprimē-
dus, mirifice enim caput, pur-
gat si cum eo gargarisetur, &
dolores dentium lenit nari-
bus infusus: quæ Diosc: lib.
2. cap. 174.

Cyclaminis, siue panis por-
cini, succus vere & autumnō
ex radice tusa, & ad mellis
crassitudinem decocta, collis-
gitur. Diosc. lib. 2. cap. 158.

Chelidonij minoris, ex ra-
dicibus folijs, & caule ex-
pressus, succus ad purgandū
caput confert.

Eupatorij Dioscoridis, si-
ue Agrimonie succus, ex ra-
dicibus tenerioribus, expri-
mendus, vere desinente, con-
tra affectus iocinoris splenis,
aliarumq; partium obstru-
ctiones.

Dentis Leonis, siue Mona-
chi, Plinio Cichoriui appel-
latur, succus lacteus, expres-
sus & propinatus ijs, quibus
genitura effluit. Diosc.

Apij succus ex radice, quæ
veris tempore legitur, du-
plex est, in superiore radice
parte abundat, succus qui
confert ad purgandum cor-
pus per vomitum, in inferiori
autem parte, per aluum, de

V 3 qua

QVO TEMPORE SVCCI SINT COLLIGENDI.

FORMA.

MAIO.

FORMA.

MAIO.

qua Theophrastus lib. 9. cap. 10. hiltoria plant. Tusa radice in fistili mergitur, & agitata aqua, quod super natat penna selectum exiccatur. Dosis eius sit sesquibulus.

Ireos satiuæ siue Domestice, succus ex radicibus medio vere, aut æstatis principio exprimitur, qui bilem flavam, pituitam & aquam inter cutem mirifice pellit, hæmoroidasq; fotu elicit, conficitur & electuarium ex succo radicum, quo maxime iuuantur, hi qui aqua intercute laborant.

Præfertur succus è Sardinia colore ruffo, odore graui feruens gustu.

Peucedani succum, Diosc. lib. 3. cap. 77. ex tenera radice cultello concisa colligit, qui cū profluat è plaga succus umbræ mandatur, in sole siquidem confestim euanesceat. Colligitur capite prius & naribus rosaceo perfusus, ne capitis dolor premat, & vertigo sentiatur. Assatione radix inutilis est. Tam lac q̃ succus, radice & caulibus extrahi solet, sicuti è mandragora, verum inefficacior succo lachrymæ habetur, & velotius expirat, interdum etiã concreta inuenitur, lachryma thuris similitudine, caulibus radicibusq; adhærens.

Pentaphylli succus ex tenera radice exprimitur contra lecoris pulmoniumq; vitia, item aduersum venena.

76
QVO TEMPORE SVCCI SINT COLLIGENDI.

FORMA.

IVNIO.

FORMA.

IVNIO.

CHelidonij maioris succus, ex radice folijs & caule exprimitur in eunte æstate, et siccat in vmbra digeritur in pastillos, Diosc. lib. 2. cap. 176.

Gentianæ maioris, succus extrahitur hoc modo. Contusa radice, quinq; diebus aqua maceratur, postea in eadem tantisper decoquitur, dum extent radices, & ubi refrixit aqua, linteo excollatur, mox discoquitur, dum mellis crassitudo fiat, fistiliq; reconditur.

Myrti succus, ex virentibus baccis exprimitur, contra Phalangiorum morsum, & scorpionis ictus in mero sumptus. Diosc. lib. 1. cap. 128.

Scordium, verum nostris montibus nõ procul ab Hala Suæuorum reperitur, ex quo succum exprimimus, æstatis initio.

Rosarum, è puniceis rosis optimus elicitur succus, similiter ex subrubescens, verum infirmior facultas. Albicantes rosæ non alium in medicina vsum sibi vendicant, quàm ut ex his aqua destilletur exceptis Dama-

scenis, quæ & deiectionem habent facultatem. Exprimitur autem recentibus folijs, de sectis forfice vnguib; (sic appellantur candidæ foliorum partes) reliquũ in pila premi & teri debet, in vmbra donec cogatur, & ita ad oculorum circum litio- nes recondi.

QVO TEMPORE SVCCI SINT COLLIGENDI.

FORMA.

I V L I O .

FORMA.

I V L I O .

Succi p-
batio est,
ut sit re-
cēs, vali-
di odoris
sincerus,
nō ad a-
corē ver-
gens, di-
lui faci-
lis, levis
adstrin-
gens, ac
modicē
mordēs
gust. hęc
Diosco-
rides.

Balsamum arbor, alba
violæ Litij, siue pyxa-
canthe magnitudine cō-
spicitur, folium rutæ, proxi-
mum longē candidius per-
petuo virens. in Iudæa solum
quadam valle nascitur. Æli-
uis sub ortu canis ardoribus,
arbor vnguibus ferreis inci-
ditur, manatq; è plaga li-
quor, quem opopaltamum
vocant, sed tam exiguo stil-
latu, ut annis singulis, ne
plures quidem quam seni,
septeniue congi cogantur,
quæpendent, 14. libras mē-
surales, & 28. vntias. Congi-
us enim sextarios, sex Roma-
nas continet, sextarius verò
sexta pars congi dictus, ca-
pit heminas duas, id est, octo
vntias, viginti mensurales,
non ponderatas. hic liquor
duplo rependitur argento:
officinæ vero opobalsamo
cum carent, factitium com-
parant.

Buglosi succus, Iulio mē-
se ex caule folijs & floribus
exprimitur.

Centaurij maioris succus
exprimitur, ex radice conci-
sa aut tusa, torculari uel ma-
nibus expressus. hoc succo
quidam vtuntur, non incō-
modè pro Lycij succo, qđ
testatur & Galenus libro 7.

simpl. medica. vbi de Cen-
taurij viribus disserit.

Dracunculi maioris, mes-
sis tempore radix colligitur,
vnā cum fructu & folijs, ex
quibus succus exprimitur,
siccaturq; in vmbra.

Dracunculi minoris, suc-
cus ex radice Iulio & Augu-
sto mente.

Ellebori albi.

Ellebori nigri, radices
mefsīs, tempore colligendæ,
ex quibus succus exprimi-
tur.

Eupatorij, Dioscoridis
succus, ex folijs floribus cau-
le & radice exprimitur, cuius
vsus maximus est in pastillis
de Rhabarbaro.

Fœniculi succus ex caule
& folijs exprimitur, & in so-
le siccatus, extrahitur & suc-
cus etiam semine viridi, ras-
mulisq; & radicibus, prima
germinatione incilis.

Dulciss.

mollis

purus te-

nax, & q

cōfract⁹

nigerrim⁹

& q

linguæ

subdir⁹

totus eli-

quescit.

Glyzericæ succus, Iulio
mense extrahitur ex radici-
bus, hoc modo, Rami cum ra-
diculis tusi, & ante per mul-
tos dies macerati coquun-
tur, tum abiectis lignis iti-
dem liquor, coquitur donec
mellis crassitudo fiat, qđ dein-
de in pastillos cogitur, & so-
le siccatur.

Hyo-

QVO TEMPORE SVCCISINT COLLIGENDI.

FORMA.

IVLIO.

FORMA.

IVLIO.

Hyosciami ex semine recenti, caulibus folijsq; tulis succus in sole exprimitur, & oxycrato humore usque ad annum usque prorogatur: nā facile corruptionem sentit, extrahitur etiam ex sicco semine separatim, in aqua calida tuso & expresso.

Maiozan succus, ex herba recenti exprimitur, pro incipientibus hydropicis, & ijs, quos vrinae difficultas, aut tormina excruciant, Dioscorides lib. 3: cap. 40.

Morum nigrorum sylvestrium, quae Germanice Bromber vocant, succus exprimitur, antequam perfectam maturitatem acceperint.

Opopanacis succus, ex herba siue planta panace, à nonnullis Heraclia dicta, colligitur messis tempore, inciso caule profluentem succum eximunt, similiter ex radice incisa recenti caulium pullulatu, ea candidum succum emittit, qui siccatus in summa cute croceum colorem contrahit.

Pimpenellae maioris, minoris succus expressus è radicibus, & cum vino haustus contra deleteria medicamenta, & venenosorum animalium morsus confert.

gravi odore, Nigri impabatur, ac mollis Adulteratur Ammoniaco aut cera.

Laudatur scammoniū leuenitidū, rarum & colore q̄ similiturino glutini, fungosū tenuibus fistulis, quale ex Mysia regione Asiae deporatatur, linguæ tactu albescat non solum verum et exurat.

Ribes ex baccis rubescentibus, dulcacidis Iulio potissimum mense exprimitur, decoquitur ad mellis spissitudinem.

Rutae hortenensis, succus ex herba recenti expressus, contra hebetudinem oculorum efficax, Diosc. lib. 3. cap. 45.

Scammoniae succus, legitur hoc modo, capite radicis exempto, radix in testudinis speciem cultro excauatur: quo fit, ut in cauum confluat succus, qui conchis demum excipitur. Alij serobe in terra concamerato sinum fodiunt, in quos subiectis iugladium, folijs profundunt, succum, siccatumq; extrahunt, adulteratur hodie lacte thyssalli. Ceterum hoc admoneadum, cum hic succus basis ferè sit omnibus purgantibus medicamentis, ut pharmacopaei diligenter inspiciant, an sincerum aut ad ulterius Scammonium habeant.

Taphiae succus, extrahendi ratio haec est, facta in ambitu serobe cortices inciduntur, aut radix in fornicis speciem in se excauata, cooperitur, quo merus succus confluat, oportet illuc sequenti die se

X con-

Succus
pbatur q̄
amarissimus, in-
terne albus, aut
subfulvus,
foris ad
croci colorē in-
clinans,
laevis pin-
guis, frias-
bilis, te-
ner, sta-
tim in a-
qua eli-
quesces,

FORMA.

I V L I O.

FORMA.

A V G V S T O.

conferre, & congestum succum extrahere. Tunditur etiam radix in pila, & succus organo per quallum expressus fictili vase insolatur: aliqui folium vna terunt, sed inualidior huiusmodi succus. Hoc autem interest, quoniam qui e radice manauit grauius olet, & humidior permanet, e folijs autem extractus exiccatur, atq; teredini iniuriam sentit. Qui succum colligit, stare debet non obuersus vento, aut potius cum dies apricus est, & a flatu silet, quoniam ob halitus, acrimoniam facies vehementer intumescit, nudaq; corpora inuadunt pustulae. ob id prius liquido cerato & adstringente, nudas partes illinunt, & ita muniti accedunt. Hae Diof. lib. 4. cap. 151.

A Bsinthij succus exprimitur, herba semine pragnans, maceratur diebus quinque aqua, decoquatur postea donec supereminet aqua, mox ubi refrixit linteolo exprimitur, & eiecta herba iterum decoquitur usq; ad mellis crassitudinem.

Artemisia succus, ex herba & floribus simul exprimitur, contra suppresos menies si cum Myrrha excipiat. Diof. cond. lib. 3. cap. 110.

Anguria, quam Dullaha appellat Serapio, nos Germani Gurken/ fructum profert mirum in modum extuberantem, ponderosum subrotundumq; carne intus humida aquosa, in quibusdam prae dulci, in nonnullis autem subacida, insipidaue sitiq; extinguenda per quam idonea. Decerpitur fructus, ex quo succus exprimitur, qui si decoctus fuerit, potus erit aptissimus febrientibus, & ijs qui temperamento sunt macri & exangues. alium praeterea ducit, sed non fortiter.

Anchusa, quam aliqui Alciadiadon, aut Onochiles appellant, ex radice huius mensis tem-

QVO TEMPORE SVCCISINT COLLIGENDI

FORMA.

AVGVSTO,

FORMA.

AVGVSTO,

sis tempore sanguineus succus funditur, qui contra vitilignes & lepras, similiter qui à viperis, aut serpentibus morfi sunt, confert.

Brassicæ sativæ, succus aluo idoneus est, si cum nitro & iri haultus fuerit, exprimitur ex caule folijs & florib⁹: cum vino quoq; epotus, viperarum morfib⁹ auxiliatur, de quibus consule Dios. lib. 2. cap. 113.

Cucumerum satiuorum, succus ex pulpa fructuum exprimitur, eo potissimum tempore, cum ultimam senserint maturitatem, quod fit Augusto mense. & ex his, qui ceteris odoratiores habentur, quibusq; crassior fuerit pediculus, quinetiam ponderositas præstantiæ argumentum est. De facultatibus cucumerum lege Gal. lib. 2. alimet. facul.

Cornorum, præsertim maris succus, ætatis tempore ex baccis rubescentibus exprimitur: ad eadem valet vti rob de agresta.

Ebuli succus è radicibus elicatur, soleq; subinde inspissatur, quem deinde in pastillos digerunt, ac pro vsu seruant.

Halicacabi vesicarij, alio nomine physalida, à Diosco-

ride lib. 4. cap. 67. appellatur, succus extrahitur ex herba, qui siccatus in vmbra reconditur, ad eadem valens, quæ ipsa planta.

Limoniorum succus, sicut citriorum fit, ad restinguendū bilis feruorem non inutilis, expetitur etiam à mulieribus pro fuco ad faciem expoliendam.

Mori arboris succus, ex radice circiter messem colligitur, radice nempe incisa, tacto in ambitu scrobe succum emittit, q postridie concretus inueniri solet. is in dolore dentiū efficax est, tubercula discutit, & aluum purgat.

Opij succus, ex incilis papauerū capitib⁹ manat. Iulio et principio Augusti. cuius ratio faciundi hæc est. Cū ros in eo exaruerit, cultro decussatim in stellas, nè penit⁹ adigatur, ex obliquo in rectū summam cutim incidere oportet lachrymā exeuntem digito in cōchā extergere, nec multo post redire, ut cōcreta inueniatur, etenim q tū, aut postero die etiā offenditur, in veteri pile teri debet, & in pastillos cogi, cū tamen inciditur retrocedendum est, ne vestib⁹ succus deradatur. Hæc Diosc. lib. 4. cap. 60.

X 2

Oci-

QVO TEMPORE SVCCI SINT COLLIGENDAE.

FORMA.

AVGVSTO,

FORMA.

AVGVSTO,

Ocimi succus odoratissimus, exprimitur è folijs, floribus, caule pro abstergenda caligine oculorum, & destillatione exiccanda: Diosc. lib. 2. cap. 135.

Omphacinum succum, ex omni immaturarum vuarum genere parat, hoc mense Italia.

Parietariae, ex herba cum floribus succus exprimitur, Diosc. lib. 4. cap. 81.

Pyrorum succus in Medicina non aspernandus, praeterim quae habent vim adstringendi, aut quae pyra sunt dulcia vel acida, & horum inmixtione composita, praeterea quae odora ut Apiana, Moschatula, siue Moschata vel Chia, expressus succus ad consilientiam mellis decoquitur.

Prunorum, maximè Damascenorum succus, expressus & decoctus, sicuti pyrorum aut pomorum, inflammationem extinguit, sitim sedat, ventremque subducit.

Rhois succus, officinis Rob. de Sumach. fit ex bacis seu seminibus recentibus Coriarij fruticis, quae maturitati iam propinqua sunt: & paratur licuti rob de Ribes, huius vsus est in Dysen-

tericis, coeliacis & alijs quam plurimis morbis, qui opus habent adstrictione.

Sambuci succus ex bacis recentibus, à cremore purgatis, cum melle optimo coquitur ad zupapij spissitudinem, qui dolores aurium tollit, ticalidus imponatur: ex quo succo etiam vnguentum praetantissimum paratur, contra ambustionem ignis, & erysipelata, uti nos experti sumus.

Solani semniferi succus, ex folijs caule & fructibus, exprimitur, qui in pastillis & medicamentis locum habet, quae doloris leuamentum praebent, potui data. ex Radice verò succus, cum melle illitus oculorum hebetudines tollit.

Succus est muscosus.

Scillae succus Galeno, messis tempore, quo praecipue vigeat, colligitur, lib. 1. de antid: cap. 9. & exprimitur ex laminis crudis in pila terrea, ligneo pistillo tritis. Bras-sauolus coquit, nec se appositè explicat quum in Galeni linctu, ex scilla cruda exprimitur.

Acatiae

79
QVO TEMPORE SVCCI SINT COLLIGENDI.

FORMA. SEPTEMBRI, FORMA. SEPTEMBRI,

Niger ex
maturo
semine,
subruffus
ex viridi
eligatur
modicè
rutilus &
odoratus.

Acatia succus quibusdam, ex folijs & semine simul exprimitur, quibusdam ex semine in folliculis tantum, succus expressus siccat in umbra. fit & ex folijs, verum minus efficax. Succus est recentis semine expressus, ac postea longa insolatione concretus, græcis nomine suæ arboris Acatia nuncupatur.

Berberorum succus, quem Sepalsarij sic vocant, græcis Oxyacantha, Germanis Erbsei exprimitur ex baccis rubentibus & maturis.

Betæ candidæ & nigre succus ex radicibus colligitur, qui cum uterque nitrosus & noxius sit, cum melle comparandi erant.

Centaurei minoris, cuius extrahendi succi ratio hæc est, Legitur herba semine prægnans, & diebus quinque madefacta decoquitur, donec superemineat aqua: mox ubi refrixit linteolo exprimitur, & eiecta herba iterum decoquitur, usque dum mellis crassitudinem habeat: Nonnulli herbam recentem gravidamque contundunt, atque succum fidei non picato exprimunt, & in sole lignea rude assidue

mouentes inspissant, quod mouentes inspissant, quod si concretum, quid faucibus vasis adhærescat, deradunt, reliquoque humori permiscunt, noctu diligenter operiunt, namque ros nocturnus, liquores coalescere non sinunt.

Cyclaminis succus, tusa radice exprimitur, ad mellis crassitudinem decoquitur. Succus is valenter purgat excrementa alui, si cum vellere sedi subiiciatur illito umbilico, & imo ventre coarum tenuis.

Cydoneorum, ex fructibus succus exprimitur, & ad mellis spissitudinem decoquitur.

Citriorum acidorum succus, coquitur lento igne ad tertie partis consumptionem, cola postea, & sublidere permitte, donec clarescat, clarum deinde igne clementi in vase vitreo percoquito, aut insolato ad iustam crassitatem, qua seruari possit.

Cucurbitarum succus est ramentis tussis, & cum rosaceo aurium doloribus infusus auxiliatur. adustiones cutis in ardenti febre illitu adiuuat.

X 3 Elate-

FORMA.

SEPTEMBRI,

FORMA.

SEPTEMBRI,

Elateriū optimū esse constat, laue non ponderolum cū cando re leniter humectū gultu a marisimū qd q; lucernarum lumina, mimibus, obiectū facile flagrat. Porraceum tamē scabrumq; si turbidum spectetur, atque erui cinerisq; plenū sit, graue & vitiosum esse solet. nec desunt qui cucūeris succo amyllum

Elaterium, succus ex fructibus cucumeris asinini syluestris, autumnō cum iam incipiunt pallescere, exprimitur, Plinio lib. 20. cap. 1. attestante. paratur verō in hunc modum: Decerpti cucumeres qui tactu protinus exiliunt, seruantur nocte vna, post die imposito supra crateram rariore cribro, vtriusque manibus prehensi sigillatim supino cultro, sursum versus aciem habente, finduntur, atq; per cribrum humor in subiectum vas exprimitur, simulq; carnosum, quod hæsit cribro, quo facilius excidat, eliditur, quod ita pressum relidere sinitur, atq; in vicinam peluim demittitur. Coaceruata autem in cribro, segmina dulci aqua perfunduntur, dumq; steterit, tota supernatans aqua cum humore concreto, effunditur. Hoc verō identidem fieri solet, donec exstēs, aqua liquecat: qua stillatim exhausta, sedimentum mortario excipitur, & conterendo cogitur in pastillos. Sunt qui ad hauriendam protinus succi abundantiam, cribratos cineres humi inspargant,

immisceant, ut cā dorem ipsū & leuitatē imitentur. A bi-matu ad decennium deiectionib; utile est.

& medium cauantes, triplicatum linteum obtendant, per quod elaterium, cum sua humiditate diffundunt. siccaturq; in pila, ut dictum est conterunt. aliqui pro dulci aqua marina perfundentes, ita eluunt.

Alij in nouissima lotionē mulsam aquam respergunt, hæc Dioscorides lib. 4. cap. 149.

Lathyris siue cataputiz maioris succus, cum vinetia incipit, ex ramulis dissectis, & vase conclusis exprimitur, expressus in pastillos digeritur, cum farina erui, hi pastilli magnitudinem erui implent, alij in aridas ficos ternas, quaternasq; guttas instillant, ut cum his inarescant, quas ad vsus recondunt.

Morus nigra Celsi, arbor nota est, ex fructibus illius hodie parant succum, qui si in æreo vase decoquitur, atq; insolatus adstringentior redditur. Ex folijs succus exprimitur, contra phalangiorum morsus.

Malo

QVO TEMPORE SVCCI SINT COLLIGENDI.

FORMA. SEPTEMBRI, FORMA. SEPTEMBRI,

Malorum vel pomorum, succus fit eodem modo, ut Rob de Ribes, aut rob berberorum, cor & stomachum roborant, syncopemq; sanant, prout ex præstantioribus pomis, exprimitur, ut sunt Aurantiarum, citrinorum & simulum.

Mandragoræ succus fit è cortice recentis radice tuso, & prælis subiecto: qui insolatus ubi concreuerit fictili reconditur. Malis quoque succus depromitur, sed aliquando ignauior.

Nucum succus, Græcis *Aluargus* dicitur, finita æstate ex corticibus recentibus exprimitur, coquitur vno feruore cum melle usq; ad mellis compagem, contra tenuium humorum, defluxionem à capite.

Omphacium succus est, officinis rob de agresta. ex uuis immaturis, hoc mense plerumq; in Germania exprimitur, lentoq; igne ad tertiarum partis consumptionem coquitur, coletur deinde & subsidere permittatur, donec clarescat, clarum deinde igne

Eligendum est Omphacinum, flauum, friabile, vehementer adstringens & linguam mordens.

clementi in vase vitreo percoquitur, aut insolatur ad iustam crassitiem, qua seruari possit. Dioscorides lib. 5. cap. 4. ante Canis ortum, media æstate è Thasia vite, aut Amynea succum ex uuis nondum maturescantibus colligit, expressam melligenem in rubro are linteo cooperto insolare solet, vsque dum cogatur, semperq; quod ceruici vasis concretum hæsit, reliquo humori permiscuit, noctuq; à subdialibus locis, in lectum referre, quandoquidem nocturni rores concrefcere non sinunt.

Tithymalorum succus, colligitur incipiente pomorum illorum lanugine, quod fit autumnino, appetente vindemiarum tempore. Congestis ramulis mox dissectis, & vase conclusis excipitur: aliqui adijciunt farinam erui & in pastillos digerunt, qui erui magnitudinem impleant. alij in aridas ficos ternas, quaternasq; guttas instillant, ut cum his in arefcant, quas ad vsus recondunt, per se etiam tusus in pila & in pastillos coactus reponitur, porro

QVO TEMPORE SVCCI SINT COLLIGENDI.

FORMA.

SEPTEMBRI,

FORMA.

SEPTEMBRI,

porro cum extrahitur lac,
neque quo ventus aspiret,
stare quenquam, neque ma-
nus oculis admovere conue-
nit, sed antequam colligas,
corpus, præsertim faciem,
collum scrotum quæ genita-
lis, adipe aut oleo cum vino
perungere. Hæc Dioscorides
lib. 4. cap. 159.

81
QVOTEMPORE SVCCI SINT COLLIGENDI.

FORMA.

OCTOBRI.

RFOMA.

OCTOBRI.

Granatorum succus, ex fructibus qui coriaceo leguntur cortice, exterius ruhescente, interius flavescente, exprimitur hoc modo. Acini diligenter à corijs & membranjs purgati, prælo committuntur, ac exprimuntur. mox vinum saccis ad id accommodatis percolatur, & in vasculis reponitur, affuso desuper oleo, ne corrumpatur vel acescat.

Prunorum sylvestrium succus, quo officina hodie pro Acacia uti, haud infelicitate solent, exprimitur ex baccis immaturis, una cum ipsorum pulpæ portionibus, ex quâ deinde placentulæ formantur, quæ liccatæ, pro acacia venduntur. quidam in vase aqua pauca, aliquot diebus macerant baccas, tessellatim cōsectas, postea lento igne coquunt, colant, ac recoquunt, donec is succus crassescat, quem deinde servant.

Vini succus olim non prius quàm coctis & benè maturis uvis exprimebatur, sed hodie rapi ex immaturis uvis cernimus, quod nimirum homines vexat auari-

tia. Triplex porro succus fuit ab uvis. primus est liquidus & aquosus. Secundus dulcis & calidus, ex musto austero, & dulcis vim mediam obtinet, qui habet vim mittigandi. Tertius à græcis *διαγλυκκως* appellatur, austerus est, ideoque vim habet reprimendi. Calcari multa, cum Luna est sub terra, optimum est.

Y

OCTO

QVO TEMPORE SYCCI SINT COLLIGENDI.

FORMA

OCTOBRI.

FORMA

NOVEMBRI.

Sit odoratum, mor-
tus ex ps
sapore
acribu.

Omphacinum oleum.
ex oliuarum cuiusque
generis baccis imma-
turis exprimitur, ob id omni-
tribus, id est acerbum viride,
& crudum appellatur.

82

I.
um.
que
ma-
mos
inde,

FORMA. *H. V. 2154*

FORMA.

11-11-1911

1. The first part of the book is a general introduction to the study of the history of the world, and is divided into two main parts, the first of which is a general introduction to the study of the history of the world, and the second of which is a general introduction to the study of the history of the world.

Y 2 IANV

Cochlex, terrestres præ-
fertim pomatix, stoma-
cho utiles sunt, & non
facile corrumpuntur. Poma-
tix, id est, operculares co-
chlex, plurimæ reperiuntur in
nostris montibus, iuxta Ha-
lam Sueuorû, vicinisq; alijs
locis. Eruuntur autem è ter-
ra hyeme in sepibus & frute-
tis, vncis quibusdam ferreis,
propè fruticum radices ter-
ra circumfossa, concludun-
tur hæ contra frigoris iniu-
riam, quodam albo operi-
mento duro gypsi speciem
referente, sicq; contextæ ter-
ra se condunt. pro cochl-
lex ad varia corporis in-
commoda.

PARTES COLLIGENDAE.

FEBRVARIO,

FEBRVARIO.

V
[Faint, mostly illegible text in a single column, possibly a calendar or list of events.]

Y 3 MAR

QVO TEMPORE ANIMALIA ET EORVM

MARTIO,

APRILI.

VIpera serpentium genus à recentioribus Tyrus, Græcis *ἐχιδνα* appellatur, Dipſas etiam, hoc est, faciens sitim. Eligendæ sunt ex Galeno in libro de Theri: ad pisonem cap. 13. potissimum circa veris initia. at. 2. de Antid. cap. 18. ut 1. de Antid. 8. vere quidem finiente, uti 1. simpl. med: ubi subijt, à ratione alienum illis adimere caudam, fuluæ parumper, & ad motum valdè pronæ, quæ collum præcipuè attollunt, & oculos aliquantulum rubros habent, & quæ audacter, ac toruæ conspiciunt, quæq; capite lato, ventre propenso, ac toto corpore sinuosa, meatum excrementis destinatum magis ad extremam caudam declinè gerunt, quam non conuolutam, sed modice flexam potius esse conuenit, gressu denique incedat quieto, hac ratione mas à fœmina discrepare debet.

PARTES COLLIGENDAE.

APRILI.

APRILI.

Seneſta anguim, græcè
ῥῆσας οφίς, nullis non co-
gnita, Germ: vocant Schlan-
gen balck / hæc in campeſtri-
bus inter ſaxa & ſturpes in-
ueniatur. de qua Ariſtoteles
ſcribit lib. 8. de hiſtoria ani-
malium cap. 17. Serpentes
ſeneſtam exuunt, tum vere
cum egrediuntur, tum etiam
autumno. Vipera etiam ex-
uit tam vere quàm autum-
no. Cum ſerpens exuere in-
cipit, ab oculis primùm de-
trahi aiunt, ita ut obſcari
videatur ijs, qui rem non in-
telligunt. colligitur ſeneſta
anguim Martio, vel circa
principium Aprilis.

Cantharides probantur in frumento inuentæ, versicolores, & quæ luteas in alis transuersas, habent lineas corpore longo, crasso, præpingues. Sed inertes ac imbecillæ, quæ vnius sunt coloris. Capiantur vere, & phiala feruentur, necentur autem ut Diosc. lib. 2. cap. 25. præcipit nempe super phialam rarum linteolum expansum, obligato ore & deorsum conuerso, suspenduntur super aceti feruentis quam acerrimi halitum, donec æstu exanimentur, postea lino transfixæ reponuntur.

Oesypus, id est, succidarum lanarum pinguitudo, ex ouibus integris non scabiosis paratur. Hyssopus humida ineptè vulgo dicitur. paratur autem hoc modo: Succidæ lanæ molles è collo fœminarum, radícula non curatæ calida, aqua lauantur, & quibuscunque sordibus expressis, & in labellum oris ampli coniectis aqua infunditur, magnoq; impetu ligula, vti respumet agitur, aut lignea rude validiuscule conturbatur, quo largius sordida spuma colligi possit, deinde marina reperi-

tur, & confidente pingui, quod super natabat, collectoq; in altero fictili vase, denovo aqua in labellum fusâ agitur, spuma iterum mari perfunditur, & demum eximitur, hoc tantisper fieri solet, dum consumpta pinguedine nihil prorsus spumæ extet. Collectum æsipum manibus emollitur, & si qua insedit spurcicia confestim demitur: exclusaq; sensim omni aqua, recentiq; affusa, manibus miscetur, donec admotum linguz æsypum adstringat leniter, nec mordeat, atq; pingue candidumq; spectetur: um in fictili vase conditur, verum omnia feruido sole fiant. Hæc Diosc. lib. 2. cap. 67.

85

MAIO.

IVNIO.

Z IVLIO

IULIO, SOL

in Leone.

IULIO.

Cancros fluuiales rabi-
entium, gratia venari
solebat Aëchion em-
piricus, quando Sol in Leo-
nem transisset, non nisi Lu-
na decima octaua à quo qui-
dem instituto Caelius libro
11. simpl. med: non videtur
abesse. vrebatur enim eos Aë-
schion in patella aris rubri
donec in cinerem redigeren-
tur, ut facile in leuorem re-
digi possent.

Fel latinis, *χολα* græcis,
Gall Germanis dicitur, suc-
cus est animalis calidissimus
qui cum ætate media cali-
dior et acrior fit, rectè hoc tẽ-
pore colligitur, præsertim ab
animali defatigato & vexa-
to, minimè autem quod in
pace & otio degerit.

Vnguis siue Onyx, con-
chylis tegumentum est, ei si-
mile, quo purpura integitur,
quod in India nardiferis pa-
ludibus inuenitur. Colligi-
tur ætate, tunc quando stan-
gnantes aquæ altius squa-
loribus inaruerunt. Lauda-
tissimus qui à mari rubro
defertur, candicans, pinguis.

AVGVSTO.

AVGVSTO,

Sanguis hirci quadrimi,
bene habiti, aliquandiu
nutriti vino albo, & her-
bis calculum frangentibus,
ut feniculo seseli lauro, Au-
gusto mense iugulari debet,
hoc modo. Cum vva matu-
rescere inceperit, olla recen-
ti aquam inijcito, eamq; de-
coquito, ut quod terrestre est
abijciat: ac hirco iugulato,
sauginis eius medium olla
excipito, ita ut neq; eum qui
primus effluxit neq; postre-
mum accipiat, ac ubi coale-
scere permiseris, minutim in
olla solum incidito, reticu-
lo autem tenui, aut raro lin-
teo contextum sub dio expo-
nito, ut à sole & luna illumi-
netur, ac siccescat, cura da-
hibita ne madesiat, leuiga-
tum diligenter in pyxide ad-
servato: Hæc Alexand: Trall.
lib 9. cap. 4.

SEPTEMBRI,

MEdulla, ut Adeps sumatur à fine æstatis ad hyemis initium; ex-florente animali, & reponatur loco sicco, & edito & septentrionem spectantè: reponatur cum folijs laurij ficcis ne putrescat, aut situm durcat. Recens etiam tenerorum animalium vsurpatur. Dioscor. lib. 2. cap. 70.

Cerebella passerum, autumno & vere captorum reponuntur, cum vitello oui, melle, vel sole, aut cinere siccata.

Vulpes animal vāfrum, nulli cedens sagacitate & astu, capitur & probatur autumno cum eo tempore vuarum esu pinguescat, eius pulmonem recentem eximunt, extracta arteria magna, diligenter mundant, postea reliqua s eius arterias ac venas secant, lauant sexties hora interposita, vino albo odoro tepido, lotum pulmonem vrnæ imponunt, siccant furno temperate calente, siccatum loco sicco reponunt, prius absinthio, & nardi spica inuolutum ad diurniorem tutelam. Sunt qui

SEPTEMBRI,

aqua ardente lauent, post saccharo aspersum siccant.

Echinus terrestris, Germanis Zgel aut Zechel dicitur, nocturno tempore à venatoribus plerumq; capiuntur, per ætatem & autumnum, vbi vuas, huc vineas petunt.

SEPTEMBRI,

OCTOBRI.

L Ac vacca, Capra, Asina,
iuuenis, aliquandiu post
partum exercita, & be-
ne pascit præsertim idoneis
sibi pascuis. Vnum largius,
sed humidius. Autumnale
parcius, siccus, & butyro
seruando aptius.

Adeps ex animali floren-
te autumno lectus, reponitur
vel incuratus, lotus, siccatus
in umbra, vel exemptis pel-
liculis fusus sole vel igni in
vase duplici. Alij tosto in ve-
ru animali cadentem exci-
piunt.

QVO TEMPORE ANIMALIA ET EORVM

OCTOBRI.

NOVEMBRI.


The first of these is the fact that the
 human mind is not a blank slate at birth.
 It is a complex of ideas and feelings
 which are inherited from our ancestors.
 These ideas and feelings are the result
 of the experiences of our ancestors.
 They are the result of the struggles
 of our ancestors for survival.
 They are the result of the triumphs
 of our ancestors over adversity.
 They are the result of the failures
 of our ancestors in the face of
 adversity.
 They are the result of the triumphs
 of our ancestors over adversity.
 They are the result of the failures
 of our ancestors in the face of
 adversity.

DECEMBRI.

A Prina caro, hyeme magis conuenit, vsui tum presenti, tum futuro.

Medulla optima semper ceruina, ad indurata & scirrhosa corpora emollienda, mox vitulina, post hanc taurina, dein caprina & ouilla. Diosc. lib. 2. cap. 70. colligit æstatis exitu, cum appetit autumnus: quippe aîijs anni temporibus concrementum sanguinis & veluti caro friabilis in ossibus inuenitur: nec facile cognosci potest, ni quis eam ossibus extrahat & recondat. Galenus libro 11. simpl. med. facul. hyeme primū capit veluti ad adipem, deinde in ædibus siccis, atq; æditis, planè humori exsertibus cum folijs lauri siccis reponit.

FINIS.



005644066

12